

COMMENTARII  
DE REBUS  
IN  
SCIENTIA NATVRALI  
ET  
MEDICINA  
GESTIS.



SECUNDAE DECADIS  
SUPPLEMENTVM II.

---

LIPSIAE MDCCLXXIII.  
APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud  
Briasson, Venetiis apud I. B. Pascali, Patavii apud Io. Manfrè,  
Holmiae apud L. Salvium.

CONSTITUTIONAL

DEBILITATING

SCIENTIFIC METHOD

MEDICINE



SECOND EDITION

SUPPLEMENT

BY J. H. M. M. M.

AND WITH A PREFACE BY THE AUTHOR

NEW YORK: PUBLISHED BY J. H. M. M. M. 1880





I.

Acta helvetica, physico mathematico anatomico botanico medica, figuris aeneis illustrata, et in usus publicos exarata. Volumen VI. Basileae, typis et sumptibus Ioh. Rudolphi Im Hof et filii. 1767. 4. Alph. 1. plag. 9. tab. aen. 1.

**R**ecensionem huius voluminis minime neglegendam esse putauimus, cum plurima ibi contineantur, quae et lectu suauissima, et scitu vtilissima sint, atque hoc volumen simili modo, vti priora, omni commendatione dignum reddant.

I) ALBERTI DE HALLER *emendationum et auctariorum ad enum: stirpium helveticarum Pars VI.* Vltimum hic tradit emendationum fasciculum, ex itineribus DICKII, THOMAE eiusque filii, RICOU, DE SAUSSURE, cet. ann. 1763 et 1764, per alpes institutis, desumptum, ac varias describit plantas recens detectas, alias accuratius definit iisque nomina aptiora imponit. p. 1.

2-4) EIUDEM *ad enumerationem stirpium helveticarum emendationes et auctaria. Pars I. II. et IV. \*)* p. 23  
N 2 quas

\*) Iam alias mentionem fecimus Partis III tiae, vid. Comment. nostr. Vol. XIII. pag. 99. et Part. V tae, vid. ibid. pag.

quas quidem partes, iam alias impressas, cum difficile habeantur, denuo reuisit, correxitque Ill. Auctor, atque nouis obseruationibus adauctas hic inseruit.

**P. 150.**     5) *Dubitatio medico semiotica paradoxa, de fluctuatione humoris, in aliquo corporis cauo stagnantis, anonymi.* Haec est moles liquidi clausi, vltro citroque agitati; quaeritur vero, vtrum in morbo fluctuatio locum habeat sanguinis, puris, vel feri effusi in pectore, pericardio, vel abdomine, ac signum pathognomonicum exhibeat, nec ne? In hominibus fauciatibus, eiusmodi fluctuationem interdum sentiri, et extravasationem prodi, plurimi quidem medici contendunt; Cum vero fluctuatio non nisi in vacuo locum habeat, et in cauo pectoris ac pericardio vel abdomine, excepto cauo intestinorum, nullum vacuum sit, et nullus percipiatur sonus, vbi desit aer elasticus: fluctuatio humoris stagnantis minime sentiri potest, vel saltem in diagnosi cruoris effusi, vt signum fallax, sumenda est, ac potius ad alia signa erit confugiendum.

**p. 160.**     6) *FR. THADDAEI BERGERI obseruatio I. de steatmate 13½ librarum, cum hydrope ascite.* Virgo 4onaria, diu laborans intumescencia abdominis et hydrope ascite, tandem periit diarrhoea colliquatiua. In eius sectione apparuit in regione peluis dextrilateris steatoma 13½ lb pondere, ac vnus pedis dia-

pag. 108. quarum vtraque inserta est act. heluetic. Vol. Vto. Partem VI tam itaque, supra indicatam, addidit. Nos vero de omnibus ad Lectores nostros nihil referimus, cum in Comment. nostr. Vol. XVI. Part. IV. p. 625. seq. Splendidum opus, Historiam stirpium indigenarum Heluetiae inchoatam ampla recensione proposuerimus.



d'ometro. Ouaria erant scirrhusa, intestinorum tractus, a mesenterio quasi auulsus et sphacelosus, sursum versus ventriculum fluctuabat: renes vlcerosi, lien insigni magnitudine, sanguine corrupto refertus, hepar pure repletum, glandulae pulmonum ex parte ossificatae, totumque corpus extenuatum, et pedes vsque ad genua oedematosi.

7) *EIUSDEM observatio II. de vulnere capitis* p. 163.  
*singulari funesto.* Puer 12. ann. tam vehementi vulnere capitis afficiebatur, vt statim in conuulsiones incideret. Et quamquam vulnus a chirurgo rite tractabatur, fungus tamen cerebri eiusque gangraena compesci non poterant, et aeger 20mo die moriebatur. Quo dissecto, detectae sunt fissurae duae longitudinales cranii, ab osse bregmatis sinistri vsque ad processum styloideum, ac dua fragmenta caluae, rursus coalita: praeterea nulla conspiciebatur futura cranii, vt fere ex vno osse compositum esse videretur.

8) *Horologii analemmatici noua et perspicua descriptio et demonstratio,* Auctore LUDOV. WENTZIO. p. 167.

9) D. C. E. BERDOT *observatio I. fetus biceps.* p. 179.  
Hunc fetum primiparae mortuum eduxit obstetrix pedibus, femoribus, et spina dorsi fractis, et lacerato matris perinaeo ac vesicae sphinctere. Erat fetus nonimestris femineus biceps, cum duobus collis, ac praeterea plane naturalis. Facies, vtriusque capiti similes, formosae erant atque colore naturali; auris sinistra dextri, et dextra sinistri capitis planiores; colla et capita antrorsum distincta, retrorsum tenui membrana coniuncta. In abdomine aderat hepar permagnum, quod degebat duos ventriculos aequales, extrorsum et  
N 3 fini-



sinistrorsum positos, qui descendendo, et pyloris ad se inuicem accedentibus, arcum formabant; sinistro ventriculo continuus erat intestinorum tubus, dextri pylorus duodeno inferebatur. Peluis continebat vterum vnum, et vnam vesicam vrinariam, pectus pulmonem vtrinque vnum, quadrilobum, atque, inflato ore capitis dextri, intumuit pulmo dexter, intacto altero, et vtrique collo erat sua trachea, in bronchia ad pulmonem vsque non diuisa, et capiti vtrique suus pulmo. Spinae dorsi binae sensim ad se inuicem propius accedebant, et truncum latiorrem reddebant, tandem in vnum os sacrum abibant. Vtrique capiti cerebrum erat naturale, et systema neruorum vsque ad os sacrum.

p. 186. 10) *EIUSDEM observatio II. hydrops peritonaei.* Virgo 16. ann. post varia molimina ad menses, oedemate pedum, et abdominis intumescencia afficiebatur, ac, neglectis remediis, tandem periit. In eius sectione 24 librae aquae paracenthesi abdominis educebantur; in abdomine haerebat tumor, a ventriculo vsque ad os sacrum, qui continebat mesenterium et intestina arcte inclusa, et hinc inde inflammata, atque coalita. Hic saccus sistebat quasi septum, ad sternum et costas desinens, quo quidem aperto, camera in conspectum venit, in qua haerebant scybalis duris plenus ventriculus, ac hepar; pericardium multum aquae continebat. Hinc patet, morbum fuisse hydropem telae cellulosae peritonaei.

p. 190. 11) *EIUSDEM observatio III. febris octana intermittens.* Puer 14. ann. hac febre laborauit, quae semper die octauo redibat; attamen post quinque paroxysmos ope emetici plane expulsa est.

p. 191. 12) *EIUSDEM observatio IV. haemorrhagia labii inferioris annua et spontanea.* Hac vexatur quadr-



dragenarius, inprimis vere, ac semper ad quindecim uncias sanguinis, amittit; si imminet hic fluxus, oritur tuberculum labii, quod in medio foramen ostendit, ac vtrumque, emissio sanguine, evanescit.

13) *EIUSDEM observatio V. hemiplegia dextri p. 191.*  
*lateris, redeunte motu, sensu autem abolito.* Sexagenarius ter passus est apoplexiam, ac semper motus in aliquo membro laesus est; cum vero quarto insultu afficiebatur, secuta est hemiplegia cum abolitione sensus et motus; rediit quidem postea motus, nunquam autem sensus.

14) *Observatio Auctore Cl. COUSIN. Miles p. 192.*  
 per vrethram eiecit vermem viuum teretem, octo pollicum longitudine, ac iam per plures annos copiosos vermes variae magnitudinis simili modo expellere solebat.

15) *I. I. D' APPLES diarium inoculationis variolarum, factum mense maio 1762, quo declaratur, in hac operatione incisionem utriusque brachii praefendam esse applicato vesicatorio crurum.* Puellae quadrienni, post aptam praeparationem, applicavit Cl. TISSOT vesicatoria in furis, et vulneri filum, pure varioloso imbutum, iam ante novem menses ab infante vnus anni sumpto, imposuit: idemque altero die, in crure dextro iterum fecit, attamen in decem dierum spatio vulnera cicatrice claudabantur, nec variolae erumpebant. Credit igitur Cl. Auctor, pus minus efficax fuisse, ob nimis parvam aetatem pueri, vnde profectum est, vesicatoria non satis penetrasse; et puellam forte telam cellulosam nimis densam habuisse, vt contagium non habuerit locum. Cl. LAVADE suscepit deinde inoculationem huius puellae in utroque brachio, cum pure varioloso vix



ultra mensem collecto, ac die octauo erupuerunt  
paucae variolae bonae indolis, quas puella breui  
tempore optime sustinuit.

- p. 200. 16) *EIUSDEM diarium secundum, de operatione  
cataraetae per extractionem.* Cl. Auctor hic pro-  
ponit tres obseruationes, vbi lens crySTALLINA mi-  
p. 204. nus felici cum successu extracta est. *Obs. 1)* Ope-  
rator enim in femina 55. ann. incidit corneam oculi  
sinistri in angulo paruo, aperuit capsulam, atque  
prodiit lens, sed aegra obiecta distinguere postea  
p. 205. non didicit. *Obs. 2)* Idem in 60nario subleuauit  
palpebram superiorem hamulo, incidit corneam  
iteratis incisionibus, atque ob capsulae spissitudinem  
et visciditatem humoris aegre lentem eximere po-  
terat, ac aeger deinde vidit obiecta, nube nigra  
p. 208. quasi obiecta. *Obs. 3)* Idem 70genariae incidit cor-  
neam deorsum, manu tremente, et iteratis incisioni-  
bus, ac magna opera et instrumentis lentem extra-  
xit, atque aegrae deinde videbantur obiecta rubra,  
quod visus vitium nullis remediis sublatum est.  
Nihilominus praefert Cl. Auctor extractionem len-  
tis ipsius depressioni, quacum vt plurimum ma-  
iora incommoda coniuncta sunt; attamen non nisi  
artis peritissimis haec operatio est committenda,  
qui ipsi interdum inopinata obstacula offendunt, v. c.  
guttam serenam, paralytin iridis, adhaerentiam cap-  
sulae lentis ad membranas, quibus vel optima ope-  
ratio frustranea redditur; caueatur vero, ne acies  
instrumenti in bulbum inducatur, eumque laedat: ac  
semper antea praeparetur aeger venaesectione, pur-  
gantibus, et diluentibus.

- p. 213. 17) *EIUSDEM obseruatio nosologica.* In regione,  
ad ripam lacus lemani sita, alias saluberrima, mense  
decembri 1764, vsque ad finem aprilis 1765, ob  
humi-



humidam tempestatem perpetuam, peculiaris epidemia faeuit; languebant enim corpora cuiusuis aetatis per aliquot dies cum fastidio ciborum, aderat interdum vomitus et diarrhoea, interdum alui obstipatio, vrina tenuis limpida, interdum viridis ac letalis, dolor punctorius pectoris; nonnulli iam 3tio vel 5to die moriebantur, alii vsque ad 20um diem aegrotabant; ad finem morbi se manifestabat intumescencia hepatis. Hic morbus tantopere se expansit, vt a Geneua vsque ad Solodurum grassaretur.

18) *Observatio therapeutica.* Femina 49 ann. p. 216. subito incidit in paroxysmum febrilem vehementem, cum virium prostratione, dyspnoea, et sensu doloris punctorii in latere dextro. Post venaesectionem et clysmā, accedebant menstrua, quibus cessantibus, sumsit emeticum, quod 25 deiectiones aluinas excitauit: sumta deinde mixtura confectionis de hyacintho cum tinctura anod. SYDENH. vltra quinque vlnas teniae eiecit; dyspnoea et lypothymia accedentes vsu vesicatoriorum soluebantur, et aegra 45to demum die morbi plane conualuit.

19) *Observationes medico obstetriciae quaedam* 10. p. 219. LUDOV. BUXTORFII; *Obs. 1) partus naturalis, mutatus in praeternaturalem, conuulsionibus praegressis et insequentibus, tandem letalibus.* Grauida 17 ann. dolores sensit ad partum, breui tempore cessantes; post aliquot horas vero incidit in vehementissimas conuulsiones, quibus mitigatis, obstetrix perforauit caput fetus mortui, ac eduxit infantem praegrandem, ac iam putrescentem, vna cum secundinis, sine magna haemorrhagia; aegra deinde incidit in sopores, et redientes conuulsiones hanc breui tempore vita priuarunt.

*Obser.*



p. 224. *Observ. 2) partus difficilis, convulsionibus hysteri-  
cis violentis stipatus, puerpera superstite.* Primipara,  
cui dolores ad partum subito cessabant, paulo post  
afflicta est convulsionibus ac sopore, quibus ope re-  
mediorum mitigatis, Cl. Auctor partum aptis in-  
strumentis acceleravit, et aegra sensim plane  
convaleuit.

p. 227. *Obs. 3) partus praeternaturalis, agripparum di-  
ctus, et prolis strangulatio.* Reduxit Cl. Auctor hunc  
fetum, ex utero usque ad collum dependentem, et  
ab orificii contractione iam strangulatum, in axin,  
indicem dextrum ori immisit, manum sinistram hu-  
meris applicavit, et, cauta attractione, partum per-  
fecit, aegramque saluam reddidit.

p. 229. *Obs. 4) extractio puellae vivae, cum hamulo obtuso,  
propter pariendi dolores cessantes, et versionem impos-  
sibilem.* Primiparae cessabant dolores ad partum, et,  
ob situm lateralem capitis, ac pelvis angustiam, fetus  
verti non poterat. Cum forceps Levretiana nihil  
efficeret, infixit Cl. Auctor orbitae oculi dextri fetus  
hamulum sine obtuso, orique immisit indicem, at-  
que sic feliciter extraxit ex utero puellam vivam.

p. 230. 20) *EIUSDEM observationes medico practicae.*  
*Hydrophobia.* Miles, qui post animi pathemata sum-  
serat vinum, incidit in hydrophobiam letalem. In  
cadauere dissecto apparuit tumor subdurus genae  
dextrae, qui suspicionem morsus canis rabidi prae-  
buit, inprimis cum nulla adessent signa veneni in  
intestinis.

p. 232. 21) *EIUSDEM dolor intestini, s. colica singularis  
spasmodica, cum febricula lenta; quam utramque Cl.*  
Auctor, mero usu pulveris corticis Peruviani, sustulit.

22) *EIUS-*



22) EIUSDEM *scabies retropulsa*, cuius quidem p. 234.  
 symptomata aptis remediis leniebantur, attamen paulo post grauior pfora erumpebat; hinc praescrip-  
 sit Cl. Auctor, praeter balnea, remedium heroicum,  
 ex granis duobus mercurii sublimati, et aquae sca-  
 biosae vnciiis quatuor, spiritus matricalis vncia semi,  
 cuius cochlear vnum ter de die dedit, vna cum de-  
 cocto hordei et lacte, ac sensim hoc malum plane  
 superatum est.

23) EIUSDEM *inedia decem dierum in melancho-* p. 236.  
*lico.* Hic, vt supplicium fugeret, fame perire me-  
 ditabatur, ac vndecimo demum die exhortationibus  
 adductus est, ad alimenta capienda, sensimque plane  
 conualuit.

24) EIUSDEM *observatio, conuulsiones hysteri-* p. 237.  
*cae partum praematurum praecedentes, atque post pro-*  
*lis mortuae spontaneam exclusionem perseverantes, tan-*  
*dem letales.* Femina 25. ann. saepius incidit in  
 conuulsiones hystericas vehementes, ac peperit fe-  
 tum mortuum octimestrem; continuantibus vero  
 conuulsionibus et lochiis inde suppressis, paulo post  
 periit.

25) *Observationes meteorologicae, factae Basileae* p. 241.  
*anno 1760. a IO. IAC. D'ANNONE.*

II.

FRIEDRICH CASIMIR MEDICUS *Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft. Erster Band. Zuerich bey Heidegger und Compagnie 1764. 8. Seiten 332. ohne Zueignungs-Schrift und Vorrede. Zweyter Band 1766. Seiten von 332 bis 882. mit einem dreyfachen Register ueber beyde Theile.*

i. e.

Collectio obseruationum medico practicarum.  
Auctore FRIDERICO CASIMIRO MEDICO. Tom. I. II.

In primo Tomo haec leguntur.

Tom. I. **E**pidemicorum morborum historiam quamquam Cl. MEDICUS cum aliis medicis inprimis necessariam, nec causas indicare opus esse iudicat, cur suam 1761 obseruatam epidemiam, quam in praesentis elegantis, ac profecto libri vtilissimi, cuius continuationem optamus, prima parte tradidit, vulgari; tamen duas potissimum commemorat, quae eum ad huius epidemiae historiam, cum viris eruditis communicandam, excitarint. Ac prima quidem causa cernitur in epidemiae huius grauitate: neminem enim scriptorum sibi notum esse asseruit Noster, qui tam malignam febrem intermittentem, tantisque grauioribus symptomatis stipatam, descripserit, quam haec est a Nostro proposita. Alteram quaerit Noster in loco, vbi eiusmodi morbi observantur. Atque optimus illi videtur nosocomium; Noster vero praest nosocomio, quod Mannhemii est constitutum.

Epidio-



Epidemia haec, a Nostro descripta, quae, iulio 1761. finito, grassari incipiebat, magnopere diuersa erat. In augusto enim, et maxima septembris parte alia erat species malignae febris intermittens, aegrique peius afficiebantur, quam octobri ac in nouembri; principes erant quartanae intermittentes. Propterea quoque earum descriptionem secundum menses adornauit Cl. Auctor, et ita per singulum mensem tempestatis vicissitudo, quam obseruauit Ill. DE STENGEL, ac cum Nostro humanissime communicauit, morbi et mortis historia traditur. Morbus, uti obseruatus est, accurate describitur et numerus mortuorum, cum breui descriptione morbi, mortis, et cadaueris, si exploratum est, traditur.

Quotidianus horror et calor febrilis, interdum p. 14. sine, interdum largo cum sudore breuique intervallo, ita, ut continua videretur remittens, febrem hanc sistebant epidemicam, malignam et periculosam, quam accedentes tum spasmi ac conuulsiones periculosiorem reddebant, atque ita debilitabantur aegri, ut plerumque delirantes interirent. Interuallum breue malignitatem indicabat: longius aliquam spem vitae conseruandae quidem relinquebat; attamen symptomata erant eadem atque grauissima. Spasmus plerumque tenebat totum corpus, quod interdum quam crudeliter ac validissime conuellebatur, cum sensuum internorum et externorum priuatione, deglutitione penitus laesa, clausis quam firmissime ore et ani orificio. Pulsus erat diuersus, pro spasmodum atque conuulsionum vehementia, interdum durus ac plenus, summeque inflammatorius, interdum contractus, paruus, irregularis, admodum celer. Quibus symptomatibus, per duos ferme dies saeuientibus, in cute sicca, dura et aspera sudor viscidus  
erum-



erumpebāt, inprimis in occipite et omnino parte capitis capillata, ita copiosus, vt guttulae destillarent, quo praesente mors accelerabatur. Inter vndecim ita affectos, vnus solummodo vitae restitutus est, et quatuor bis illum spasmus passi sunt.

P. 45. Per septembrem tempestas erat mutabilis, recidivae frequentiores, vbi, frigida tempestate, et horror febrilis augebatur.

P. 55. Octobri mutabatur haec febris in tertianam et quartanam, duplicatam et irregularem. Horror febrilis maior diutius durabat, et aegri vires superare videbatur, symptomataque erant varia atque aucta, cum dysenteria maligna, scorbuto gingiviarum, et ptyalismo, nec non maculis petechizantibus; calor mitior ac breuior. Sudor viscidus per duodecim horas aegrum vexabat, male olens. In nonnullis incipiebat calor, et finiebat frigus febrem, eadem quidem vehementia, nullo tamen sudore.

P. 77. Nouembri hae febres continuabantur, mutatae tamen potissimum in quartanas. Ii, qui hac febre corripiebantur, antea iam fuerant in nosocomio eodem morbo affecti. Resistebant omnibus prope modum curandi methodis, aegrosque valde debilitabant. Alii plus frigoris, alii plus caloris febrilis percipiebant, plerique sudore enormi defatigabantur, accedente dysenteria putrida. In hoc mense autem ita hae febres grassari desierunt, vt sequentes per menses rarius a Nostro potuerint observari. Quapropter etiam huius febris historiam hic finit, nonnullasque observationes, quas in sequentibus mensibus collegit, in altera harum observationum medicarum parte tradere pollicitus est Cl. Auctor. Caeterum centum quinquaginta et nouem sunt sanati, et vndecim mortui, quorum septem aliis morbis succubuerunt.



In cadauere quodam splen duarum librarum in-  
veniebatur, tribus paruulis lienibus, phalangae di-  
giti magnitudine, et cordis figura. Porro lien alius  
aegri, qui, quarto die, hac febre epidemica vitam  
cum morte commutabat, ita exsiccatus erat, vt fa-  
cile digitis teri posset. p. 80.

Haec erat summa primi libri huius primae par-  
tis, ad alterum librum iam nos accingemus.

Postquam Cl. MEDICUS in causas inquisiuit, cur  
plures aliis, ipso hoc morbo epidemico grassante, fue-  
rint mortui morbis, hanc epidemicam febrim cum  
duobus comitibus, spasmo nimirum vniuersali, ac dy-  
senteria, diiudicat. Spasnum hunc, pauci licet eo  
tenerentur, non esse symptoma inopinatum osten-  
dit Noster: ac dysenteriam necessario sequi debere  
ex cadauerum sectionibus, ad quam cum eo iam  
progredimur, monstrat. Abdomen spasmis erat con-  
tractum, cum omnibus partibus, in eo contentis. In  
ventriculo magna bilis copia, non deprauatae adeo  
deprehendebatur, pariterque in intestinis, in quibus  
hinc inde sphacelus sese prodebat. Omnes partes  
autem tinctae a bile erant. De splene iam dixi-  
mus; morbosae vero eius mutationes, non causa  
morbi, sed eiusdem effectus erant. Hepar erat  
sanum. In thorace pariter contracto, pulmones ac-  
creti plerumque, vbi diaphragmati incumbunt, gri-  
seo colore imbuti, exsiccati erant: hic dissecti nec  
sanguinem nec aliud fluidum habebant, iis vero pau-  
lo altius, consueto colore magis praeditis, discissis,  
emanabat sanguis spumescens. Vna pars itaque  
pulmonum exsiccationem, altera putredinem pro-  
debat. Pericardium sanum erat, praeter magnam  
aquae albae copiam, odore et acredine destitutae,  
quam in se continebat. Cor videbatur paruum  
esse, in quo externe nihil morbosum erat, etiam aqua  
hac



hoc circumdatum erat; interne vero polypi variae magnitudinis et multitudinis in ventriculis inueniebantur, quos saepe albos, tenaces et membranaceos, non rarius cruore impletos, continuatos vidit Cl. Auctor per vicinas arterias, saepius ad extremitatum superiorum et inferiorum arterias usque. Cerebrum omnino sanum spectabatur.

**P. 110.** Proximam huius febris epidemicae causam ponit in abundantia bilis Cl. Auctor, inde fetorem intolerabilem aegrorum in faucibus, quem et vesicatoria, his aegris applicata, habebant, deriuat, ac eorum leuamen, leuissimis vomitoriis datis, quibus immensa copia bilis semper euacuabatur, explicat, ac miratur, in cadaueribus tantam bilis adhuc multitudinem, multa licet per vomitoria eiecta, fuisse. Hoc fieri posse a bilis abundantia eiusque errore loci partim in primis, partim in secundis viis per experientiam aliorum, aequae ac Cl. Auctoris ulterius confirmatur, ac symptomata, huic febris communia, exponuntur.

**P. 117.** Vtrum bilis causa, an effectus sit huius morbi, a Nostro hic disquiritur, atque bilem febres quidem generare; attamen easdem quoque a bile vitiosa proficisci posse, cum HIPPOCRATE et HOFFMANNO arbitratur. Dein inter causas occasionales huius morbi potissimum a Nostro referuntur aestus, sub quo paludum stagnantes aquae corrumpuntur, hocque ex variis Auctoribus probat.

**P. 135.**

Haec ad febrem epidemicam, cum spasmo universali spectant, quae vnum genus harum febrium concernit: iam ad febrem epidemicam intermittentem cum dysenteria, quae alterum harum febrium genus efficit, cum Nostro accedimus. Ac primum quidem cadauerum dissectorum rationem habemus, quorum quinque sunt. Abdomine aperto, magna copia,



ecopia aquae foetidae, in eo vndique contentae, emanabat, ventriculus ac reliqua, praeter hepar, quod et in his cadaueribus cum reliquis partibus comparatum, maxime firmum ac sanum videbatur, viscera putredini ac resolutioni fuerant tradita, intestinaque erant alba, ac foetore insigni, sphacelo ac impuritatibus biliosis foetidissimis, magna cum flatulentia inquinata. Vesicula fellea alba conspiciebatur, crassa, mox viridi, mox lutosa, foetida ac deprauata bile impleta. Splen insignis magnitudinis, nec signis putredinis destitutus. Omentum ut plurimum putridum, ac maxima parte erat desumptum. Pulmones accreti, exsiccati, nullam putredinem prodebant. In pericardio parum aquae, et in ventriculis cordis teneri et pauci polypi. Ceterum vbique putredo mox post obitum sese manifestabat in internis et externis partibus corporis, ideoque caput non disquisiuit Cl. MEDICUS. Causa proxima huius febris cum dysenteria aequae cernitur in bile, multo maiori autem malignitate infecta. In febribus enim cum spasmo ea erat copiosa, et stimulo eius irritante excitabantur spasmi; in febribus autem cum dysenteria in summam abibat putredinem, quae et reliquas partes corporis corrumpibat. Causae occasionales aestus summus, cum subsequente humida tempestate, aere frigido ac calido, quae et ab aliis Auctoribus a Nostro commemoratis, inter eas causas eiusmodi morborum referuntur. De reliquis autem malignis febribus intermittentibus, quas inter hanc epidemiam obseruauit, et ad alteram harum obseruationum partem distulit, hic nihil a Nostro enarratur.

In tertio huius partis libro, ad methodum medendi his morbis Cl. MEDICUS venit, et in primis corticis Peruuiani usum definit, nonnullasque de eo  
*Secund. Decad. Suppl. II.* O p. 155  
ad-

addit cautiones. Id enim Noster semper vidit, ut inflammatio sanguinis primum domaretur: dein bilis ex primis ac secundis viis eliminaretur, et periodorum in his febribus intermittentium ratio haberetur. Quo facto ad febrium ipsas periodos, cortice tollendas, progreditur Noster, ad spasmos sopiendos, et ad symptomata reconualescentium coercenda. In his sex cautionibus tota harum febrium curatio, a Nostro hic proposita, cernitur.

**p. 158.** Iam de singulis videamus. Ac primum quidem quod venaesectionem attinet, eam Noster adhibuit. Quamquam enim Cl. Auctori constet ex recentiorum observationibus, in febribus biliosis venam non esse secandam; tamen cum fructu eam in hac epidemia esse adhibitam, experientia Nostrum docuit. Non adeo enim in omnibus febribus biliosis venae-sectionem intermittendam esse autumat. Est vero sedulo in effectus bilis inquirendum, et hi venae-sectionem vel suadent, vel dissuadent. Quod si enim bilis resolutionem ac putredinem sanguini inducit, venaesectio obest; si vero stagnationem inflammationemque sanguinis efficit, prodest ea. Id quod postquam et aliorum morborum, a bile ortorum, exemplis a Nostro probatum est, redit Cl. Auctor ad hanc epidemiam. Atque hic observavit, venae-sectionem non solum inflammationem coercuisse, sed et vomitum excitasse, cuius ope insignis bilis multitudo est euacuata, ac tandem spasmos supra descriptos arcuisse. Bilis enim acrimonia solidas partes irritat, easque ita rigidas reddit, ut spastice contrahantur. Venaesectio autem rigiditati solidorum officit, ergo ea spasmis auertendis pariter, ac coercendis, inseruit. Atque hoc ipsum iterationem venaesectionis definiuit.

**p. 187.** Pergit iam Cl. Auctor tradere effectus vomitorio-  
rum, digestiuorumque remediorum, inter quae sal am-  
monia-



moniacum optimum ad periodos harum febrium turbandas praedicat, emulsionum, nec non vesicatoriorum, quibus vim spasmorum leniendorum et inflammationis coercendae, atque inprimis acrimoniae partim a bile, in sanguinem translata, partim ab aestu ortae, eliminandae; id quod ex foetore atque erosione loci, ubi applicabantur, intelligi potest, adscribit. Quae omnia, et cum fructu, Noster adhibuit in hoc morbo, cum eodem corripiebatur.

Boni effectus huius methodi erant, paroxysmorum breuitas, et interuallorum longitudo, aestus imminutio, maior sensibilitas. In reconualescentibus capitis dolorem, adhuc relictum, si e ventriculo oriebatur, vomitu, praeterea plerumque vesicatorio, ceruici applicato, domuit. p. 197.

Laudato a Nostro cortice Peruuiano, in his febribus, cuius usum supra \*) iam iustis circumscripsit limitibus, atque hic exemplis nonnullorum Auctorum illustrat, in causam inquit, cur spasmus, cum hac febre interdum coniunctus, non potuerit semper auerti, ac multa medicamenta antispasmodica interna ac externa frustra propinata esse docet. Atque hanc ponit in bile stagnante et corrupta, quae nullo modo potuit euacuari. Vulsionem plantae pedis hic non ausus est Noster. p. 201.

Iam methodus medendi malignae huic febre intermittenti cum dysenteria a Nostro proponitur, quae cernitur in bile corrupta, euacuanda, in periodis huius febris tollendis, et in adhibendis optimis remediis, putredini resistentibus. Quapropter hic potissimum laudatipecacuahnam, quae bilem corruptam non solum eliminat ex ventriculo, sed eius fibras quoque roborat. Qua exhibita, corticem propinauit aegris, vel solum, vel cum tinctura rhei aquosa, ac nonnullis guttulis liquoris anodynii HOFF- p. 217.

\*) vid. p. 209.

MANNI, siue interdum laudani liquidi SYDENHAMI, pro symptomatum diuersitate coniunctum. Ad putredini resistendum eo fortius corticem dedit, cum succo citri, aceto aliisque : ad roborandum addidit confectionem alkermes. Quodsi vero haec remedia non sufficerent, mixturam, a Cl. IOANNE GRASHUIS in appendice de colica pictonum laudatam, \*) in auxilium vocauit, eique addidit corticis vnciam dimidiam, et crysalli montanae drachmam vnam. Insimulque versus vesperam, philonio vsus est. Aluminis, cum cortice commixti, virtute antiseptica ac antifebrili, ex optimis Auctoribus demonstrata, atque catechu, antiseptica vi, reliquorumque simplicium, ex quibus haec mixtura componitur, vsu declaratis, rationes reddidit, cur crysallum montanam praeterea huic mixturae addiderit, quam MERCATUS iam in dysenteriis laudauit. Vtilem enim eam in diuersis dysenteriis, 1760 grassatis, inuenit.

p. 233. Quartus liber continet recidiuas ac potissimum quartanarum, quae nullo modo a praecedentibus differebant, excepta curatione, quae difficilior erat, primis mensibus; vltimis autem, ii, qui propemodum continuas febres malignas antea habuerant, breuissimo cum interuallo, febre magis intermittente, cum molesta dysenteria corripiebantur, plerumque e rebus humanis eximebantur. Variis, recidiuas morborum omnino, atque in primis horum, a Nostro hucusque descriptorum, concernentibus, rebus pertractatis, ac ex Auctoribus illustratis, cum Nostro ad curam harum recidiuarum progredimur. Simulac per vomitoria fuerat euacuata bilis corrupta et per salia digestiua, corticem propinauit Noster, cum sale ammoniaco, cuius salis vsum praesertim

\*) vid. comm. nostr. Vol. IV. p. 633.



tim in quartanis febribus magni facit. Id quod Noster demonstrat ex effectibus, quos hoc sal praestat in sanguine, vasis adhuc contento, atque ex iis misso; porro, si ad carnem conseruandam additur, et tandem ex iis, quos Noster vidit in hac epidemia, omninoque assentitur Cl. VOGELIO, qui illi potentissimam resoluendi, et putredini resistendi vim adscribit, illudque cum nitro comparat. et in maiori dosi ad drachmam vnā usque duas de die suadet. Quapropter et vnciam huius salis vnā, cum sex aquae vnciis soluit, et in hac solutione corticem propinauit. Porro, si necessitas postulabat, coniunxit cum cortice succum citri, sal petrae, rheum, corticem cinnamomi, interdum confectionem alkermes, vel quoque mixturam Cl. GRASHUIS, supra \*) commemoratam, pro indicationum varietate. Quod si vero et haec methodus non satis erat, confugiebat Noster ad puluerem alterantem Cl. PLUMIERI, s. ad sulphur antimonii auratum, cum extracto et decocto millefolii. Nouembri vero mane, et versus vesperam, drachma vna salis ammoniaci vsus est, nocte appropinquante, drachmam vnā corticis, scrupulum dimidium salis millefolii, ac duo grana sulphuris antimonii aurati, simul in forma pulueris dedit aegris. Atque haec methodus, quamquam febres erant pertinacissimae, optima ac saluberrima Nostro videtur.

Rationibus, cur haec remedia elegerit, adiectis, p. 279. et effectibus eorum declaratis, atque ex Auctoribus illustratis, ad quintum et vltimum huius partis primae librum Cl. Auctor venit, in quo epidemiae omnino, et numerus mortuorum in iis considerantur. Praemissis nonnullis aliis rebus, ad humanam

\*) v. p. anteced.

societatem conseruandam, atque augendam, a multis excogitatis, potissimum ad id praestandum No-  
stro videntur requiri medici, chirurgi, et artis obste-  
triciae gnari, qui morbis non solum medeantur, sed  
eos quoque arceant. Dein ad morbos, qui incolis  
praesertim, qui Manhemii morantur, solemnes  
sunt, considerandos sese accingit. Atque sunt mor-  
bi biliosi, malignae febres intermittentes, quae ex  
humiditate domiciliorum, paludum foetore, nocti-  
bus frigidis, non fero superuenientibus, et ex situ  
vrbis proficiscebantur, et de quibus etiam alibi \*)  
Cl. Auctor iam disseruit: porro febres putridae, mor-  
bus miliaris, ossium caries et tabes. Purpuram s.  
morbum miliarem quod attinet, quem alia occasione  
pro morbo, variolis omnino simillimo, habet \*\*),  
hoc solum enarremus, se, per annos 1759, 1760, et  
1761 habuisse curam 5648 aegrorum, in nosoco-  
mio aequae, ac apud ciues, atque in tribus solum-  
modo purpuram vidisse. Multorum porro, phthisi seu  
tabe laborantium, pulmones sine vlla labe post mor-  
tem reperit, quamquam viui insignem puris copiam  
quotidie exspuebant. In cauitate autem abdominis  
liquidum pus conspiciebatur. Alii pulmones in-  
duratos ostendebant. Rarissime vlcera pulmonum  
cum pure vidit. Bonum effectum tandem exper-  
tus est in tabida annorum sexaginta, a tinctura fuli-  
ginis CLAUDERI, cum extracto corticis pro-  
pinata.

p. 320. Cl. Auctor numerat 1227, qui sanitati sunt re-  
stituti, ac 30 eorum, qui mortui sunt, vti ex addita  
tabu-

\*) V. EIUSDEM *Geschichte periodischer Kranckheiten*  
*zweyter Theil* p. 202. comm. nostr. decad. secund.  
Suppl. I. p. 92.

\*\*) V. EIUSDEM *Sendschreiben von der Ausrottung*  
*der Kinderblattern*, p. 87. vide comm. nostr. Volum.  
XIII. p. 53.



tabula aegrorum, reconualescentium et mortuorum, elucet. Ex comparatione mortuorum, ex aliis nosodochiis, suum numerum minorem intelligit. In nosodochio fratrum misericordiae, quod Mannheimii floret, moritur decimus quartus, pariter ac in Londinensi, s. THOMAE nomine insignito. Cl. STOERCK vero vidit vigesimum tertium mori.

In secundo tomo haec continentur.

Praemissis variis rebus, ad historiam corticis Tom. Peruvianam medicam, eiusque originem, notas bonitatis, mangonisationem, atque usum attinentibus, vti p. 336. II. ex praefatione huius tomi secundi intelleximus, in triplici morbo corticis usum Cl. Auctor perpendit, nimirum in febribus intermittentibus malignis, putridis, atque inflammatoriis. Febres hae intermittentes malignae grassabantur, mensibus augusto, septembri, octobri et nouembri 1759, ac primo quidem intuitu continuae acutae esse videbantur; venaesctione tamen ac medicamentis refrigerantibus, licet difficulter, in intermittentes mutabantur. Multae enim ita pertinaces erant, vt sexto septimoque die demum, Cl. Auctor hoc praestiterit. Inter has autem quandam febris, plane singulari malignitate stipatae, speciem, quam nos dicimus soporosam, Cl. Auctor autem *Todten-oder Schlagfluß oder auch Schlafieber*, obseruauit, cuius historia atque curatio hic enarratur.

Signa huius febris soporosae malignissimae, ac p. 350. profecto letalis, erant, ardor in vrinae viis, cum stranguria, sopor: sanguis, e vena missus, tenuis, aquae fluuiatili similis, colore mox florido, mox obscure viridi, lintea non adeo tingens, subruber, nec consistens, nec diu post in putredinem abiens. Ab initio aegri conquerebantur, de aestu insigni ac diu durante cum procliuitate in somnolentiam. Exper-

gefacti erant debilissimi, minori quidem aestu; vrinam tamen summis cum incommodis mittebant. Haec symptomata aderant ad summum usque ad tertium diem, quo paroxysmi intermittentes sese incipiebant. In duobus aegris autem totus morbus, ab initio usque ad finem febris, continua remittens esse videbatur. Primus paroxysmus, horrore insigni, aestu per totum corpus, et copiosissimo, saepe male olente sudore, cum sopore, rhoncho et anxiiis quaerelis aegrorum absoluebatur, quo intra decem octodecimue horas finito, sponte expergiscebantur aegri. In interuallo obtusus capitis dolor, totius corporis languor atque imbecillitas, cum anxietate aegros tenebat, videbantur tamen nihilominus refici. Alter paroxysmus priore erat fortior, ac potior. In sopore nullo propemodum modo poterant excitari; rhonchusque aderat, cum anxiiis quaerelis, atque deglutitione laesa, linguaque minus volubili. Erant aegri inquieti, cum subsultu tendinum, ac apoplexia tactis similes conspiciebantur, oculis apertis, toruis, ac fixis, totaque facies spastice distorquebatur. Interuallum videbatur mitior esse paroxysmus. Auctis vero symptomatibus, aliisque accedentibus, tertius apparebat paroxysmus, sopore, horrore insigni, rhoncho, quaerelis, ac deliriis, nec non spasmis, ac conuulsionibus stipatus, uti in epilepsia interdum. Vnum vidit Cl. Auctor aegrum, qui, uti in tetano fit, sine motu ac, cum respiratione sonora, iacebat. Tota facies, adipe quasi illita, videbatur, lingua fissa, et fusco foetidoque muco obfessa, deglutitioque ita laesa, ut vna guttula minaretur suffocationem. Symptomatis his aliisque auctis, apoplexia, quae aegros trucidabat, accedebat.

p. 359. Plurimi huic morbo obnoxii erant iuuenes, et quamquam periculosissimus hic morbus est iudicandus, tamen Cl. Auctori pauci sunt mortui, qui  
nisi



nisi altero paroxyfmo, tertio femper praeueniebat. Methodus medendi autem, a Noftro adhibita, hæc eft. Ab initio vena fecabatur, vt continua in intermittentem mutaretur febrem, dolor capitis atque aestus permagnus leniretur. Non multum poft vomitorium propinauit, cuius effectû absoluto, corticem ad quadraginta grana dedit. Quod fi vero caput nimium patiebatur, vesicatoria, aluo obstru-cta, enemata et id genus alia, adhibuit, prout fymptomata poftulabant. In paroxyfmis nulla medicina.

Antequam vero Cl. Auâtor in huius morbi ma-  
lignitatem inquirat, nonnulla alia exempla, ad ma-  
lignas febres intermittentes pertinentia, atque alio  
tempore obferuata, tradit. Ac primum quidem  
mentionem facit Nofter febris intermittentis, ac  
scabiei, alternatim praefentium, quem morbum, mul-  
tis aliis, frustra in auxilium vocatis, remediis, demum  
cortice Peruuiano cum mercurio dulci atque cam-  
phora exhibitis, eisque faluatione excitata, intra  
quatuordecim dies fanauit. Dein commemorat fe-  
bres intermittentes, cum visus obnubilatione noctur-  
na, faluatione, apoplexia, mentis alienatione. Porro  
et obferuauit epilepfiam periodicam, quae in febrem  
intermittentem transire videbatur. Nec minus vidit  
febrem intermittentem cum epilepfia letalem. Epi-  
lepfia nimirum sopita, vermibus duobus, cum mul-  
tis excrementis per clysmata euacuatis, aeger ita  
debilitatus conſpiciebatur, vt ne vocem quidem  
emittere poſſet. Tergum vbique vulneribus ob-  
ſeſſum conſpiciebatur, et totum corpus oedemate et  
anaſarca laborabat, ac quotidie copioſus ichor ema-  
nabat. Nec minus inflammatio quasdam partes  
occupabat, et in ſiniſtro femore ſeſe aperiebat vlcus,  
ex quo multum puris effluebat.

p. 362.

- p. 379.** Mortuo hoc aegro, aperiebatur cadauer, et in abdomine ichor flauus, maleque olens, ac omnia viscera absumta ac corrupta inueniebantur. Cerebrum sanum erat.
- p. 380.** Porro obseruauit Cl. Auctor quartanam et quotidianam febrem intermittentem, cum dysenteria, cum tussi et cum epilepsia. His itaque perpenfis, ac annotationibus practicis illustratis, ad soporosam febrem redit, illiusque malignitatem accuratius persequitur, et aliorum Auctorum exemplis illustrat.
- p. 395.** Inflammato sanguine, et ventriculo intestinisque cruditatibus impletis, corticis effectus valde cohibentur ac imminuuntur. De vsu mercurii dulcis in febribus intermittentibus, quem Cll. SCHULZIUS, VOGEL, BÜCHNER, LUDWIG alique suaferunt, agit Noster, atque arbitratur, tum illum optime in his febribus conducere, cum venerea labe humores scatent.
- p. 410.** Differuit iam Cl. Auctor de febribus intermittentibus, cum epilepsia alio libro, ab Eo conscripto, et a nobis iamiam supra notato \*) ibique varia exempla, ex Auctoribus collegit. Quapropter hic potissimum, de sede epilepsiae agitur, quam Noster non in capite, sed in abdomine quaerit, idque exemplis confirmat, in quibus cerebrum nullo modo laesum reperit. Ac si forte alii cerebri morbosas mutationes in cadaueribus inuenerunt, has, vt effectus epilepsiae, non autem, vt causas eiusdem assumit Noster. Ex eodem fonte putat quoque Cl. MEDICUS, epilepsiam, variolis superuenientem, oriri, quem alii miasmatis variolosi acrimoniae venenatae quasi, alii aliis causis adscribunt.
- p. 430.** Ex his omnibus autem Cl. Auctor demonstrat, corticem Peruvianum, iusta circumspectione datum, opti-

\*) v. p. 214.



optimum, celerrimum, ac tutissimum esse remedium,  
ad depellendas febres intermittentes malignas.

Iam in libro secundo vsum corticis, in febribus p. 431.  
putridis, Cl. Auctor expendit. Propinari potest cortex cum succo citri aut aceto, atque arbitratur Noster, eo posse purpuram arceri. Vesicatoriis et emeticis ut plurimum non opus erat in his febribus, atque vesicatoria, ob resoluendi vim et humores eliminandi, in his noxia iudicat. Opium prorsus in iis dissuadet, criticorumque dierum, a veteribus constitutorum, plane nullam Noster habet rationem. Duas febrium putridarum inprimis vidit species, nimirum cum insigni aestu, et minori aestu, maioreque delassatione. Hanc ipsam methodum febribus putridis medendi, tandem ex aliis Auctoribus probat.

Nec minorem utilitatem praestat cortex, in inflammatoriis febribus intermittentibus, etiam si Cl. Auctor ab initio his febribus corticem potius obesse, quam prodesse cum multis aliis Auctoribus putauerit. Cum vero febres, 1761 grassantes, inflammatoriae indolis essent, et sanguis, e vena tum missus, veram proderet inflammationem, quae nullo propemodum modo compesci posset, constituit secum Noster, has duas methodos medendi, febrim nimirum ac inflammationi, coniungere, ac propinauit corticem in parca dosi, cum sale petrae, et emulsiones ita feliciter, ne quidquam, praeter regulares paroxysmos febris intermittens, remaneret. Sed non solum in parca dosi, sed et in largiori exhibuit in his febribus intermittentibus, cum inflammatione coniunctis, corticem, addiditque interdum camphoram, felicemque huius methodi medendi successum suis observationibus confirmat, quae in catarrhales quoque cadit febres, ceterorum tamen symptomatum habi-

habita ratione. Vesicatorii effectum, ceruici applicati, non possumus hic reticere. Sedabantur enim deliria, quae, vulnere iterum exsiccato, ferocia apparebant. Attendit hunc effectum contrarium iam Cl. WHYTT \*) hac tamen differentia, vt ille in peripneumonia mixta vesicatoria laudauerit; Noster vero in vera inflammatione sanguinis et pulmonum. Ex iis vero, quae Cl. Auctor de vsu corticis in variis his febribus notauit, patere arbitratur, effectus egregios corticis in singulis quam maxime pendere a medicamentis, quae cum cortice combinantur.

**p. 469.** Tum vtilitatem hirudinum in phrenitide exponit Cl. MEDICUS. Pone aurem sex hirudines applicauit, antea tonso capite. Inter fugendum iam vox fiebat tranquillior, et reliqua symptomata paulo post quoque euanescebant. Vulnere itaque non statim obtegebantur, atque sex iterum post alteram aurem applicabantur hirudines, quibus quoque sanguine impletis, somno, qui huc vsque defecerat, iam diu exoptato, aeger fruebatur, ac ille penitus sanitati restituebatur. Ceterum euacuationem sanguinis per hirudines, in hoc morbo, omnibus reliquis sanguinis eliminandi modis praefert Cl. MEDICUS.

**p. 497.** De egregiis commodis vesicatoriorum, parti laesae applicatorum, haec habet Noster. Laudantur hic a Nostro, in angina inflammatoria, pleuritide et ischiade neruosa, in qua posteriori quidem, vltioni saepe vesicatoria eodem modo, vt vesicatoriis sinapismos postponit, in illis et eiusmodi morbis. Non omni auxilio destitutus, loco vesicatoriorum, vsus

\*) Philosophical transactions Vol. L. for the year 1758. Lond. 1759. 8. p. 568. vid. comm. nostr. Volum. X. p. 137.



usus est in teneris corporibus, oleo ex prouinciis Galliae, cum spiritu salis ammoniaci, interdum addito laudano liquido SYDENHAMI, infriſtum panno laneo, (*Flannel*) ceruici impoſito, in angina inflammatoria, ſecundum Cl. MEAD alioſque.

Huius methodi antiquitate, ex veteribus in pri- p. 532.  
mis demonſtrata, atque praeſtantia eorum aequae ac Noſtri obſervationibus confirmata, ad cantharidum effectus celeres aequae, ac ſalutares conſiderandos Cl. Auſtor ſeſe accingit. Ac hi cernuntur in ſpasmis ſopiendis, humoribus reſolvendis, et acrimonia eliminanda.

Commoda veſicatoriorum, parti laeſae applicato- p. 540.  
rum, ſunt haec: et primum quidem morbus quam celerrime curatur; dein acrimonia adhuc latens, antequam ſeſe euoluat, eliminatur, atque ita expectoratio ſ. ſputum arcetur atque ſupprimitur.

Porro variae hydropiſ ſpecies a Cl. Auſtore p. 563.  
conſiderantur; in quibus curandis vituperantur ut plurimum laxantia, reſoluentia, ac ſtimulantia, oſtenditurque, hunc morbum non raro per ſola roborantia poſſe curari. Ac primum quidem Noſter laudat oleum oliuarum per friſtiones adhibitum, a Cl. VOGELIO \*) iam commendatum in hoc morbo, inter cuius uſum, et cremorem tartari efficacem per urinam et aluum reperit. Oleo oliuarum adſcribit vim acrium in ſero extrauſato particularum inuoluendarum, atque ſpasmorum ſopiendorum, qua orificia vaſorum contracta relaxantur, et ad inhalandum ſerum extrauſatum prona redduntur. Interdum autem oleum nocuit.

Nec minus conducunt in hydrope venaeſectio- p. 578.  
nes ac antiſpasmodica. Nominat nimirum per ſuam

\*) vid. hiſt. mater. med. p. 258.

suam experientiam illam hydropis speciem, ubi hanc medendi methodum suadet, febrem hydropicam, ab extrauasato sero sanguinis profectam. Quod si enim serum sanguinis, sanguine inflammato, per poros arteriarum sudat, in tela cellulari illud stagnare oportet. Atque vnicum signum certum Nostro videtur, pulsus vere inflammatorius ac sanguis, qui quidem non crustam habet inflammatoriam, sed spissitudinem duplicem, rubrae nimirum sanguinis partis ac serosae.

**p. 696.** Clysmatum usu, in hydrope declarato, in squillae effectus in eodem morbo inquit. Quam minime pro specifico in hydrope habet, et tres illi solennes effectus euacuatorios, non negat quidem, quid quod vno exemplo probat, tamen alia medicamenta, nisi statim effectus suos edant, non spernenda esse putat, praesertim cum resectio virium, post squillae usum tardissime progrediatur. Tandem in anasarca potissimum commendat Noster usum cinerum tepidorum, ut in merfis, quippe quibus, frictione adhibita, et addito externe sale communi, et interne cremore tartari, serum extrauasatum, in vasis cutaneis stagnans, ad vias vrinarias eadem ratione hic deferri posse arbitratur, ac in merfis. Tepor enim serum stagnans mobile reddit, et salinae particulae resolutae, ac in vasa inhalantia in contextu celluloso translatae, leniter stimulando videntur Nostro serum ad vias vrinarias deriuare.

**p. 603.** Porro Cl. MEDICUS singularem effectum moschi in surditate hic enarrat, quae, epilepsia cessante, aderat, eaque saeuiente, aberat. Anglorum aequae ac Cl. GMELINI aduersus morsum canis rabidi experientia edoctus, moschi, in maiori dosi adhibiti, usum feliciter hic expextus est. Cautum tamen huius remedii usum commendat.

Iam



Iam a Cl. Auctore, in forma epistolari, variae ob- p. 621.  
 servationes practicae proponuntur, quarum pluri-  
 ma pars eradicandas variolas attinet, nos vero quas-  
 dam breuiter tradamus. Mercurii corrosiui subli-  
 mati solutionem non adeo magnis laudibus extollit.  
 Electricitatis usum in medicina non prorsus ne-  
 gat quidem, sed exemplo in inflammatione oculi,  
 ope electricitatis discussa, probat; ceterum tamen  
 non tanti facit. Alui obstipationem pertinacissimam,  
 multis antea laxantibus et purgantibus medicamentis  
 adhibitis sanauit Noster cremore tartari, ad duas  
 drachmas sexies dato, ac emulsione gummi ammo-  
 niaci, vicissim cum cremore propinata per omnes  
 horas. Nimius laxantium enim usus stimulando  
 Nostro spasmos excitasse, atque viam magis magis-  
 que occlusisse, videbatur.

In aegro, tabe consumpto, aperto, postquam ab- p. 648.  
 domen, praeter angustias quasdam intestinorum, sa-  
 num deprehensum fuerat, ex thorace magna puris  
 copia scaturiebat, quae totam hanc cauitatem occu-  
 pauerat, et partes, in ea contentas, compresserat, ac  
 cor innatabat puri, cuius pericardium totum in pus  
 mutatum fuerat. Cor vero inflammatum ac gan-  
 graenosum hinc inde erat.

In alius cadaueris diuersis partibus deprehen- p. 661.  
 debat Noster pus fusco viride, acidum odorem spi-  
 rans, ac satis tenue. In femina quadam vidit Noster p. 669.  
 magnam purulentae materiae atque sanguinolentae  
 copiam, per pudenda emanare, quam in tuba Fallo-  
 pianae latere putabat. Nimia autem copia huius ma-  
 teriae aegram, iam multis aegritudinibus vexatam, ita  
 debilitabat atque consumebat, ut viuere desierit. Ca-  
 daueris autem disquisitionem non permittebant eius  
 consanguinei.

In debilitate, a nimio veneris exercitio in vitro- p. 678.  
 que sexu relicta, imprimis laudat Cl. M E D I C U S  
 lima-

limatarum martis; qua autem adhibita, semper potulentorum usum commendat, quoniam cardialgiae, pectoris oppressiones, aliaque molesta symptomata oriri vidit in puella, quae usus aquarum Schwalbacensium, cum limatura martis, vna vice oblita erat.

**p. 689.** Exemplum hic enarrat Cl. Auctor, pleurae insensibilitatem declarans in inflammatione eius, post mortem detectae, cum viuo aegro, qui de doloribus in abdomine atrocissimis et pertinacissimis conquerebatur, ac omnino magnam habebat sensibilitatem, nec quidquam doloris in thorace perciperetur. Dolores abdominales, quae Nostro mortis causa videbantur, profecti erant ab extrauasato fero acri; mortis vero causa ab inflammatione pleurae pendebat.

**p. 695.** Haemorrhoides a Nostro iure inter morbos referuntur, ac, quoniam sunt atque fuerunt nonnulli medici, qui has ipsas medicamentis accelerarent, easque minime morbis adnumerarent, monstrat Noster earum morbosam indolem, quae cernitur in erroribus diaetae. Oriuntur enim eadem, vel ex vita sedentaria, vel abusu vini atque potus caffee, vel a venere. Quibus demonstratis, earum curam ponit optimam in diaeta seueriori, ab aegris strictissime seruanda.

**p. 711.** Fieri posse, ut variolae eradicentur, iam Cl. Auctor in libello quodam, a nobis non multo ante indicato, \*) declarauit. Quapropter hic partim quaedam ex eo repetit, partim remedium variolarum extirpandarum proponit. Variolas pro morbo naturali Noster habet, nec eas generari in corpore humano ab occulta causa, arbitratur. Quam ob causam

\*) v. supra p. 214.



sam suadet, vt feбри variolosae quam celerrime officiat medicus, nec solemnem morbi decursum permittat.

Antequam vero suam Noster medendi metho- p. 735.  
dum tradat, quasdam res, naturam ac indolem variolarum concernentes, praemittit. Quapropter quaerit Noster: an variolae propagari queant, et an summe necessarium sit, vt semen variolosum in hominibus sese euoluat? Id quod Noster pariter negat, ac ceteros omnino morbos haereditarios, suamque sententiam, de variolis multis argumentis stabilit, a generatione ac creatione primi hominis partim, partim a nutritione hominis in vtero, et extra eum, petit.

Comparat hic Cl. Auctor variolas cum scabie, et p. 761.  
contagii variolosi imbecillem vim, clare manifestat. Pertractat enim omnes modos contagii variolosi suscipiendi naturali aequae, ac artificiali ratione, per conuersationem nimirum cum hominibus, variolis laborantibus, per aerem, et id genus alia: nec non per ipsam earum implantationem, indeque contagium illud non adeo esse timendum probat.

Quemadmodum celeris humidae ac siccae, frigidae ac calidae tempestatis vicissitudo, praecipua omnium epidemicorum morborum causa Nostro videtur: sic et variolosam epidemiam eidem causae tribuit, ac ex hac parte aerem solummodo quid conferre posse, ad epidemiam variolosam excitandam, arbitratur. Postquam hoc declarauit, ad indolem variolarum disquirendam sese accingit. Atque eam vel benignam, vel malignam quidem esse docet, ita tamen, vt malignitas non cadat in ipsas variolas, sed in alias causas, vel in corpore humano latentes, vel ab atmosphaera pendentes. Variolas enim benignas esse, ex ipsa earum inoculatione patere, Noster putat. Variolis bis ac ter homines laborare posse, Noster credere videtur, ac inoculationem nihil iu-



vare posse putat, quam fortasse variolarum extinctionem, et alius morbi, loco earum, propagationem.

**p. 808.**

Cum itaque Cl. Auctor arbitretur, variolas pendere solummodo ab aere, variolosi morbi hucusque solemnem decursum non esse naturalem, sed artificialem, statuit, nec opus esse ad eum superandum quatuor stadiis. Nec vlla enim suppurationis, nec febris variolosae secundariae videtur necessitas Nostro, cum pus malignitatem variolarum saepe letalium afferre putet Noster, id quod probat cum febre variolosa sine variolis. Multo magis eo enitendum esse autumat Cl. Auctor, vt, cum variolarum epidemiam eidem causae pariter, ac alias epidemias debeamus, morbus variolosus non trahatur, sed quam celerime supprimatur.

**p. 822.**

Iam ad methodum variolis medendi Cl. Auctoris veniamus, quae in eo cernitur, vt febris variolosa mitigetur, nec ad suppurationem formandam excitetur. Atque hoc efficitur cortice Peruuiano, additis emulsionibus ac remediis refrigerantibus, ac antiphlogisticis, si opus est, adhibitis laxantibus ac emeticis, vel, si suppuratio imminet, applicatis vesicatoriis, et id genus alia. Probat Noster hanc suam methodum aliis exanthematicorum morborum, ac inflammatoriarum febrium exemplis; e. c. purpura, petechiis rubeolis, quae propemodum euauerunt, ac putat, eodem modo et variolarum extirpationem posse praestari.

**p. 842.**

Ad perscrutandam hanc, a Cl. MEDICO traditam, variolis medendi earumque extirpandarum methodum, proponit Noster insitionem variolarum. Qua, vti solet, curata, post viginti et quatuor horas cortex est propinandus, maiori in dosi, per quatuordecim dies, minori, per totidem, additisque iis remediis, quae supra nominauimus, ac symptomata postulant, ac tum corticis vim in  
resi-



resistendo puri, indubitato apparere commentus est Noster.

Finem huius tomi secundi facit triplex index, p. 855.  
cuius primus Auctorum, hinc inde in his duobus tomis laudatorum a Nostro, nomina complectitur; secundus contenta in his duobus tomis indicat, et tertius res, in iisdem propositas, continet.

### III.

FRIEDRICH CASIMIR MEDICUS *Pfaltz-Zweybrückischen Hofraths* Brief an den Herrn IOHANN GEORGE ZIMMERMANN über einige Erfahrungen aus der Arzney-Wissenschaft. Mannheim in der akademischen Buch-Handlung 1766. 8. Seit. 52.

#### i. e.

FRIDERICI CASIMIRI MEDICI epistola ad IOANNEM GEORGIUM ZIMMERMANN observationes nonnullas medico practicas complectens.

Subiungimus hanc epistolam ideo, quoniam Cl. Auctor hic duo exempla enarrat, quibus nouam medendi febribus intermittentibus spasmodicis \*) methodum declarat. Vfus nimirum est aqua frigida, p. 7.  
quam inter dentes subinde influere iubebat, et pone aures apposuit hirudines. Aqua frigida corruptam, et in fermentationem vergentem bilem, ventriculi spasmus excitantem, quo et caput cerebrumque ipsum male afficiebatur, diluit atque corrigit. Hirudines vero, copiose applicatae, spasticam fibrarum, et vasorum cerebralium affectionem leniunt. Al-

P 2

vus

\*) v. supra p. 205.

vus autem, antequam hirudines apponantur, esse aperienda, alias, vti Cl. MEDICUS expertus est, nihil iuuant.

p. 23. Aqua frigida dein adhibita, alia quoque remedia Noster in auxilium vocat, vt venaesectionem, emetica, ac potissimum tartarum emeticum, enemata, laxantia.

p. 42. Omnino autem in his febribus medicamenta calidiora ac regimen calidum Cl. MEDICUS reiicit, seduloque id vidit, vt bilis corrupta quam citissime expelleretur, ac vires vitae, imprimis per corticem Peruuianum sustentarentur. Hac methodo se effecisse arbitratur, vt in nosodochio ter solummodo purpuram obseruaret, quae olim valde grassabatur per urbem, et quam raro iudicat criticam.

p. 50. Finem huius epistolae facit obseruatio, de epilepsia periodica. Puella quindecim annorum, incidit inopinato in epilepsiam. Primis duobus diebus, non statotempore apparebat; tertio autem die et sequentibus, a hora septima vespertina, ad duodecimam paroxysmus semper aderat, quo finito, summa debilitas relinquebatur. Nihilominus autem, ob pulsum fortem, qui et, paroxysmo finito, summaque debilitate aegrae praesente, aderat, venam secavit, et sanguinis circulum nimium refrigerantibus sedauit. Postea, bile mota, emetica adhibuit, dein cortice Peruuiano cum sale ammoniaco propinato, epilepsia cessauit, et, denuo adhibito emetico, perque illud magna bilis copia eiecta, penitus aegrae sanitati restituebatur.



IV.

**A Treatise on the Hydrocele, or watry Rupture, and other Diseases of the Testicle, its Coats and Vessels; (Illustrated with Cases.)**  
By PERCIVALL POTT, F. R. S. and Surgeon to St. Bartholomew's Hospital. — The Second Edition, improved with very considerable Additions. London: Printed for L. Hawes, W. Clarke, and R. Collins. 1767.  
8. mai pag. 327. absque dedicatione et praefatione. Tab. aen. 2.

i. e.

**Tractatus de hydrocele, aliisque morbis testiculi, eius tunicarum et vasorum: exemplis illustratus. Auctore PERCIVALL POTT: Editio secunda multo auctior \*).**

**P**ostquam in prima sectione generalia quaedam de herniis praemiserat Cl. Auctor, in secunda de hydrocele in genere exponit, cuius sedes vel in membranis scroti est, vel in tunicis et vasis testiculi. Priorem speciem aliquando vidit, solummodo vnius lateris tunicam dartos occupasse, quod utique rarius accidit. Quam diuersae et falsae opiniones de vtriusque generis origine et sede animis scriptorum infederint, fuisse docet, ac denique merita virorum Cll. MONROI patris, et SAM. SCHARPII laudat, qui primi veram indolem ac theoriā horum morborum rite explicuerunt. Ad quam declarandam in

p. 5.  
49.

P 3                      sectio-

\*) Prioris titulus est: *Practical Remarks on the hydrocele or watry Rupture, and other diseases of the Testicles.* London 1762. 8.

- p. 12. sectione tertia structuram anatomicam funiculi spermatici, testiculi et integumentorum harum partium, exponit, praecipue chirurgos monens, vt in doctrina
- p. 15. de herniis ad iter funiculi sub musculo transuersali et obliquo interno, et per obliquum externum, probe attendant: docet porro, telam cellulofam, quae vasa spermatica in itinere suo cingat, pessime dici tunicam vaginalem huius funiculi, multosque inde errores enatos esse. Testiculorum descriptio cum ea
- p. 18. conuenit, quam alias exhibuit \*). Ex anatomica harum partium expositione confectaria quaedam elicit, et exempla aliquot testiculorum, in inguine relictorum, et mutationes morbosas efficientium, eodem in libro iam allata \*\*), repetit.
- p. 31. Sectio quarta de anasarca scroti agit, qui morbus, licet vi etymii ad hydrocelen referendus videatur, vere tamen ad eam non pertinet. Quamquam saepius cum ascite coniunctus deprehenditur, aquae tamen, in cauo abdominis stagnantes, in scrotum descendere nequeunt, quod nulla intercedit inter vtramque cauitatem communicatio; sed cellulae, exteriorem parietem peritonaei constituentes, si aqua repletae sunt, eidem transitum in tunicam dartos facile permittunt. Curatio fere a medicamentis internis expectanda est: chirurgica enim auxilia, per puncturas et incisiones scroti, palliatiuam tantum medelam afferunt, nec vnquam, nisi per accidens, malum ipsum tollunt. Punctura tamen incisioni semper praeferrri debet, quod vtraque idem finis intenditur, et posterior tristes vt plurimum effe-

\*) An Account of a particular kind of Rupture, frequently attendedt upon new-born Children; and sometimes met with in Adults. London 1757. 8. mai p. 7. vid. commentar. nostr. Vol. IX. p. 55.

\*\*) p. 28. comment. nostr. l. c. p. 56.



effectus post se trahat, emphysema nimirum, gangraenam, sphacelum, cet. Vera autem hydrocele triplicis generis est: siue cellularum tunicae communis, siue cystica in eadem tunica, siue tunicae vaginalis; quarum tamen interdum vna cum altera coniuncta esse potest.

Prior ergo in sectione quinta exponitur, eiusque origo, ex generali notione feri, extra vasa missi, declaratur. Si simplex fuerit morbus, neque multum incommodi, etsi insignem molem adeptus, adfert, neque adeo facile cognoscitur, nunc varicem funiculi, nunc detrusam omenti partem, quae, adhaesione facta, reduci nequeat, mentiens. Curatio rarissime locum habet, absque operatione chirurgica: neque haec, cum increuit malum, et tunica communis affecta est, omni periculo caret.

P. 52.

Hydrocele cystica tunicae eiusdem obiectum sectionis sextae sistit, morbus praecipue infantibus solemnis, veteribus iam optime notus, sed a recentioribus saepe minus recte cognitus, et frequenter pro pneumatocele, quae merum ens rationis est, habitus. Tumor est in medio funiculi inter testiculum et inguen, figurae oblongae, aequalis, nunc magis, nunc minus latus, semper admodum tensus, neque ergo fluctuationis signa prodens, neque impressionem a digito seruans, leuiter percussus sonitum edens, doloris expers, a mutato aegri situ non mutandus; neque cum cauo abdominis, neque tunicae vaginalis communicans, adeo, vt testis et epididymis libere tactui sese offerant, et saepe etiam tactus superiorem funiculi partem distinguat. Haec signa morbum simplicem declarant, qui, si quoque, vt interdum accidit, cum hernia vera, vel hydrocele tunicae vaginalis coniunctus sit, ea tamen attentum

p. 73.

chirurgum satis instruunt, quando cum symptomatibus horum morborum conferuntur. Recentior, in iunioribus, saepe fotu calido facile dissipatur, aut, aqua per puncturam lanceolae emissa, sanatur; in adultis vero, sacco iam callosiore reddito, opus est, ut is per omnem longitudinem aperiatur, quod plerumque facile et absque periculo fieri, adducta a Cl. Auctore curationis exempla demonstrant.

- p. 91. Duae subsequentes sectiones hydrocelen tunicae vaginalis pertractant. Num eius causa immediata
- p. 93. in vasis spermaticis varicosis, an in ipsarum affectarum partium mutata conditione ponenda sit, in suspenso relinquit Noster. Quod plerique scriptores pro signo huius morbi characteristico venditant,
- p. 95. nimirum transparentia tumoris, fallacissimum est et incertissimum. Cum hernia intestinali facillime confunditur; plerumque tamen ab hac discerni potest eo, quod funiculus spermaticus in inguine, ubi per musculos abdominis exit, libere tactu percipitur. Errant, qui in hoc morbo testiculum in fluido undiquaque libere suspensum haerere asserant,
- p. 96. quod anatomica disquisitio refutat: quare in praxi eo attendendum esse Noster praecipit, ne tumorem in posteriori ac superiori, aut media parte aperiamus. Ex hac connexionione etiam diversitas tumoris, quam tactus offert, apparet, quae etiam discrimen inter hunc morbum, et anasarcam scroti, atque hydrocelen cysticam funiculi constituit. Ab hernia intestinali, praeter iam allatum signum, differt, quod in hac testiculus, si distinguere potest, in inferiori parte totius tumoris percipitur. Testiculus induratus, licet etiam hydrosarcocoele adsit, tamen tactu diversus deprehenditur a sano, quamquam interdum maiori et laxiori, qui in morbo nostro adest: quae quidem diversitas cautissime attendenda est,
- ne



ne in curatione peccetur. Mercurius in testiculo p. 108.  
venereo adeo efficax, in scirrho eiusdem, ab aliis  
caussis profecto, aut euidenter nocet, aut saltem tem-  
pus curationis aptioris praecipit. Neque umquam,  
aut a cicuta, aut a belladonna effectus laudabiles vi-  
dit Cl. Auctor, sed imprimis has malum semper  
exasperasse perspexit. Cum in aegro debiliore mer- p. 114.  
curius inunctus motus sanguinis concitatiores effi-  
cit, vel versus fauces ruit, corticis chinae decoctum,  
bis vel ter de die, donec curatio finita fuerit, porri-  
git. Bis hydrocelem tunicae vaginalis, iam confir- p. 125.  
matam in hominibus adultis, absque educatione  
aquarum disparere vidit: prima vice, post insultum  
podagricum, per sex hebdomades durantem, altera,  
post vim externam, scroto illatam, quae ecchymosin  
effecerat, fomentationibus cet. resolutam, quae au-  
xilia etiam ipsam hydrocelem discutiebant.

Curatio hydroceles huius vel palliativa est, vel p. 129.  
radicalis. Prior punctura, vel ope lanceolae, vel  
acus triquetrae cum cannula peragitur, quarum vl-  
timam priori praefert Noster, quod ex vulnere aqua  
protinus effluat, neque compressione scroti opus sit,  
vnde aliquando totam tunicam dartos, eschara affe-  
ctam, vidit. De loco, in quo operatio instituenda  
est, iam vidimus. Discutientia et alia auxilia, ad futu-  
ram collectionem aquarum praecauendam, a veteri-  
bus proposita, vel minus necessaria vel inutilia sunt.  
Metus, in adultioribus facile vulnerari posse testicu-  
lum, ab operatione detertere non debet.

Radicalis curatio in eo posita est, vt, coalitione p. 144.  
vtriusque tunicae, testiculum ambientis, facta, col-  
lectio aquae, in cavitae ab iis interceptae, in  
futurum impediatur. Variis modis hunc finem at-  
tingere, veteres sunt annisi. Cauterium, ligatura, et  
iniectio plane, et quidem merito exoleuerunt: re-  
liqua vero auxilia vulnus vel angustius, vel largius



in vaginali tunica efficiunt. Ad priora pertinent  
 setaceum, cannulae, et turundae, quorum omnium  
 primarius quidem finis non, nisi palliativam curatio-  
 nem, respexit, saepe tamen vere radicalem praesti-  
 tit. Quum autem vix ac ne vix quidem, effectus  
 optatus semper ab iis exspectari queat, praestantius  
 p. 155. est, larga apertura aquae inclusae exitum parare,  
 quod vel causticis, vel incisione fit. Ultimam tamen  
 p. 156. ideo praefert Cl. Auctor, quod caustica raro usque  
 ad tunicam vaginalem penetrare queant, adeoque  
 saepius applicatio eorum irrita sit. Postquam igitur  
 edocuit, operationem istam non, nisi in sanis, ac  
 vegetis subiectis, et, ubi morbus nondum inuetera-  
 p. 162. uerit, suscipiendam esse, eandem describit, quae  
 satis simplex est, cum nempe, tumoris superiori  
 parte eleuata, in inferiori et anteriori parte scrotum,  
 et vaginalis tunica scalpello inciditur, vulneri apex  
 digiti indicis immittitur, et super hunc diuisio per  
 totam sacci longitudinem continuatur. Testiculus,  
 sub operatione nonnihil prorumpens, blandae repo-  
 sitioni cedit. Non conuenit, vulnus arcte linteis  
 replere, aut testiculum comprimere; sed minima  
 eorum portio immittenda, vulnus molliter deligan-  
 dum, et scrotum in suspensorio reponendum est.  
 Febris quoque iustam rationem haberi debere, per  
 se liquet. Callositas tunicae, labia vulneris crassiora  
 efficiens, solummodo digestiuis et emollientibus tra-  
 ctanda est, et abstinendum ab omnibus irritantibus  
 et erodentibus. Si, ob nimiam callositatem, pars  
 quaedam remouenda est, hoc sub ipsa operatione  
 fiat, et melius quidem scalpello, quam forficibus,  
 quas Cl. DOUGLASS eum in finem adhiberi iusse-  
 rat \*). Quum ingens copia fluidi scrotum et tuni-  
 p. 172. cam multum extendit, satius putat Noster, primum  
 pun-

\*) vid. comment. nostr. Vol. VI. p. 700.



puncturam tantum administrare, et curam radicalem differre, donec recens accumulatio partes has iterum moderate distendat, ne nimis subita mutatio symptomata periculosa excitet.

Ex aliis modis huic morbo medendi nullus Cl. p. 177. Auctori satisfecit, praeter setaceum, quod tunc utile censet, cum curatio per incisionem vel ab aegris reformidatur, vel minus idonea iudicatur. Tunica vaginalis, modice distenta, acu triquetra perforanda est; aquaeducta, ope cannulae ingeratur specillum, filis aliquot gossypinis obuolutum, idque, quam alte fieri potest, versus superiorem tunicae partem immittatur; postea, incisione minore ad eam partem, qua ingressum est specillum, facta, illud cum parte filorum educatur, eaque laxè colligentur, orificiumque linteis complicatis obtegatur. Fila relicta in vulnere arctae tunicae albugineae agglutinantur, et post 48 horas scrotum et testiculus intumescunt inflammanturque; haec vero symptomata venae-sectione, aluiductione, et applicato cataplasmate, suspensorioque mitigantur, et vulnus postea decenti modo tractandum est, donec, inflammatione ac tumore discussis, setaceum sua sponte secedat, et vulnus consolidetur.

In sectione nona haematocelen considerat Cl. p. 179. Auctor, eiusque quatuor species constituit, quarum primae et secundae sedes in tunica vaginali haeret, dum, vel sub ipsa eius perforatione vas sanguiferum laeditur, vel hac tunica vasis varicosis obsita, et post extensionem nunc subito collapsa, tale vas disrumpitur. In priore casu, aqua sanguine tincta, protinus exit, et post hanc euacuationem sincerus sanguis colligitur: in secundo, serum euacuatur limpidum, et tunc demum tumor sanguineus contrahitur. Neutra species aliquid periculi, aut molestiae in dis-

cutien-

cutiendo, vel educendo sanguine parit. **Gravior** autem res est, si sanguis intra tunicam albugineam effunditur, a compage vasculosa testiculi ipsius relaxata vel resoluta; qui morbus difficilius ab hydrocele tunicae vaginalis distinguitur, nec, nisi forte in diuersitate fluidorum, in utroque affectu stagnantium, maiori que profunditate ac distantia a superficie, discriminis aliquas notas offert. Hoc enim in casu, sola castratio conducit. Ultima species ea est, cum a vi externa ramus venae spermaticae in processu eiusdem dilaceratus fuit: unde, si sanguis discuti nequit, incidendus est tumor, videndumque, num vas laesum compressione, vel stypticis, vel ligatura ad consolidationem reduci queat: quae, si locum non habeat, itidem ad castrationem progrediendum.

**p. 210.** Sectio decima duo exempla hydroceles in sacco hernioso, nimirum tunica vaginali, refert, quarum utraque congenita erat, et aperto sacco, detrusaque intestini parte libera reddita, medelam admittebat.

**p. 218.** Posteriores duae sectiones de reliquis speciebus herniarum spuriarum agunt, et primo quidem falsam notionem pneumatocèles Cl. Auctor euoluit, de qua iam superius dictum fuit. Varicocele, seu distensio venosorum vasorum scroti, fere symptoma aliorum morborum est, neque inde facile peculia-

**p. 219.** rem attentionem exigit. Aliter comparatum est cum cirsocele, quae saepe cum hernia omentali confunditur. Ab externis remediis quibuscunque applicatis, nullum umquam fructum se percepisse, Cl. Auctor fatetur. Unica tantum vice malum hoc utrumque funiculum affecisse vidit, ita quidem, ut utrinque ne minimum quidem vestigium testiculi reperire posset, sed tantum compressa quaedam membra-



membrana, quam albugineam tunicam putabat, epididymidi adhaerere videretur.

Amplissima est sectio vltima de sarcocoele, tiam fere partem totius libri constituens. Varias p. 224.

eius species veteres distinxerunt; quas vero non, nisi diuersa stadia vnius eiusdemque morbi, aut varietates esse, Cl. Auctor demonstrat. In examine

causarum docet, saepe perperam accusari herniam p. 230.

humoralem, seu testiculum venereum, multoque minus hydrocelem tunicae vaginalis morbum no-

strum producere posse: hydrosarcocoele enim potius a scirrroso testiculo efficitur, quam testiculum scirrho-

sum efficit. Copiose etiam FABR. AB AQUAPEN-

DENTE refutat, qui falsae huic theoriae fundamenta curationis, per longam suppurationem excitandam,

superstruxit, quippe quem, hydrocelem simplicem pro hydrosarcocoele habuisse, vero simile est; simul

vero mirandum, recentioris aevi chirurgos, ex quibus TURNERUM et HEISTERUM

adducit, adeo aucta anatomica partium cognitione, p. 248.

suasisse in affecto testiculo, vt crudelissime sane fungosa caro ei adhaerens, imo epididymis aut pars

testiculi ipsius, vel causticis vel ferro remouerentur. p. 252.

Radicalis curatio sarcocoeles in sola castratione posita est, licet et ab hoc auxilio numquam summa

cum certitudine effectum speratum expectare possimus. Sed ea non, nisi tempestiue, in vitio tan-

tum locali, et corpore de reliquo sano vti oportet; e contrario vero abstinere ab eadem, cum vel vni-

uersum corporis habitum, viscerumque statum labefactatum conspiciamus, vel vasa spermatica vitium

insignius contraxerunt. Scire tamen refert, solam varicosam eorum dilatationem, et collectionem fluidi

in tunica communi, ea inuestiente, nisi simul haec ipsa vitiata fuerit, non praebere tanti ponderis ar-


gumenta, quae ab operatione deterrire nos de- p. 277.

beant.

beant. Tandem probe tenendum est, etsi hernia humoralis epididymiden prius afficiat, quam ad testiculum ipsum progrediatur; tamen, in vero scirrho vel cancro, illam etiam interdum ante, **p. 279.** quam testiculus patiat, tangi, ideoque nullum aptum distinctionis fundamentum inde peti posse.

In descriptione operationis ipsius Cl. Auctor vulnus amplum minori praefert, et protinus post funiculi spermatici deligationem, testiculum ope scalpelli, a scroto separari iubet prius, quam funiculus praescindatur: neque opus esse monet, ut pars **p. 288.** quaedam scroti auferatur. Huius postea operandi modi, ab aliorum Auctorum praescripti, dissensum eiusque rationes solide exponit: tandemque suadet, ut eo in casu, quum tumor veram hydrocelem mentitur, prius pars eius anterior acu triquetra perforetur, quo de indole morbi certo constet: sibi enim ipsi aliquando accidisse narrat, ut testiculum exstirpauerit, quam praeuia hac operatione, cognitoque inde malo, se conseruaturum fuisse arbitratus est.

Tabularum aenearum, huic libro adiectarum, altera connexionem tunicae vaginalis cum albuginea, altera acum triquetram sistit.





V.

A new practical Essay on Cancers: containing,  
 I. An Account of their Nature, Causes, and  
 different Species II. A Detail of the gene-  
 ral Method of Practice, commonly called  
 rational or palliative. III. A Description of  
 the Remedies, proposed by some as Speci-  
 fics, but found to be either dangerous, or  
 ineffectual; with Remarks on the same.  
 IV. Is annexed the most safe, efficacious,  
 and only certain Method of Cure, founded  
 on Reason, and confirmed by Experience.  
 To which is also added, a new, more safe,  
 and efficacious Method of administering  
 Hemlock; By I. BURROWS, M. D. London:  
 Printed for the Author; and sold by W.  
 Owen, and I. Almon. 1767. 8. mai pag. 76.  
 praefat. p. 16.

i. e.

Tentamen nouum practicum de cancro, cum  
 methodo noua, salubriori, et efficaciori, ci-  
 cutam in vsum vocandi, Auctore I. BURROWS.  
 M. D.

**P**rolixior titulus huius libelli sufficienter argumen-  
 ta, in eodem quaerenda, declarat: breuiore  
 ergo in eodem indicando esse poterimus, cum vni-  
 versa hic proposita doctrina, de inflammatione,  
 scirrho, et cancro mammaram, quae fere sola obie-  
 ctum tractationis huius sistunt, noui plane nihil con-  
 tineat, si a censura medicamentorum, aduersus hos  
 morbos adhiberi solitorum, recesseris, ex quibus  
 pauca quaedam excerpamus.

Quum

- Quum scirrhus humoribus spissioribus originem debet, inter alios sales aperitiuos, ens iouiale commendare Nostrum miramur. Si miasma venereum in causa fuerit, ex omnibus mercurialibus remediis, potissimum aethiopis mineralis, deflagratione parati, vsum suadet. Antimonio in substantia omnes plane vires denegat, cum in corpore non soluatur, ideoque tincturis, ex eo paratis, vtendum esse praecipit. Symptomata canceri, ex turgescencia, seu rarefactione materiae scirrhosae aut obstruentis explicat, hancque ipsi dictam fermentationem, cum mutationibus quibusdam aliis, in natura obuenientibus, inprimis cum vegetationibus chemicis comparat. Mercurii sublimati cum spiritu vini vsum prorsus reiicit, quod remedium simul longo antea tempore notum fuisse, quam BOERHAVIUS eiusdem mentionem fecerit, ostendit. Belladonnae, aconiti, et ipsius cicutae effectum vel nullum, vel rarissimum fuisse hucusque, prolixè monstrat: et ipsam amputationem rarissime effectum tristi caruisse docet.
- P. 33. nem debet, inter alios sales aperitiuos, ens iouiale commendare Nostrum miramur. Si miasma venereum in causa fuerit, ex omnibus mercurialibus remediis, potissimum aethiopis mineralis, deflagratione parati, vsum suadet. Antimonio in substantia omnes plane vires denegat, cum in corpore non soluatur, ideoque tincturis, ex eo paratis, vtendum esse praecipit. Symptomata canceri, ex turgescencia, seu rarefactione materiae scirrhosae aut obstruentis explicat, hancque ipsi dictam fermentationem, cum mutationibus quibusdam aliis, in natura obuenientibus, inprimis cum vegetationibus chemicis comparat. Mercurii sublimati cum spiritu vini vsum prorsus reiicit, quod remedium simul longo antea tempore notum fuisse, quam BOERHAVIUS eiusdem mentionem fecerit, ostendit. Belladonnae, aconiti, et ipsius cicutae effectum vel nullum, vel rarissimum fuisse hucusque, prolixè monstrat: et ipsam amputationem rarissime effectum tristi caruisse docet.
- P. 34. remediis, potissimum aethiopis mineralis, deflagratione parati, vsum suadet. Antimonio in substantia omnes plane vires denegat, cum in corpore non soluatur, ideoque tincturis, ex eo paratis, vtendum esse praecipit. Symptomata canceri, ex turgescencia, seu rarefactione materiae scirrhosae aut obstruentis explicat, hancque ipsi dictam fermentationem, cum mutationibus quibusdam aliis, in natura obuenientibus, inprimis cum vegetationibus chemicis comparat. Mercurii sublimati cum spiritu vini vsum prorsus reiicit, quod remedium simul longo antea tempore notum fuisse, quam BOERHAVIUS eiusdem mentionem fecerit, ostendit. Belladonnae, aconiti, et ipsius cicutae effectum vel nullum, vel rarissimum fuisse hucusque, prolixè monstrat: et ipsam amputationem rarissime effectum tristi caruisse docet.
- P. 36. tione parati, vsum suadet. Antimonio in substantia omnes plane vires denegat, cum in corpore non soluatur, ideoque tincturis, ex eo paratis, vtendum esse praecipit. Symptomata canceri, ex turgescencia, seu rarefactione materiae scirrhosae aut obstruentis explicat, hancque ipsi dictam fermentationem, cum mutationibus quibusdam aliis, in natura obuenientibus, inprimis cum vegetationibus chemicis comparat. Mercurii sublimati cum spiritu vini vsum prorsus reiicit, quod remedium simul longo antea tempore notum fuisse, quam BOERHAVIUS eiusdem mentionem fecerit, ostendit. Belladonnae, aconiti, et ipsius cicutae effectum vel nullum, vel rarissimum fuisse hucusque, prolixè monstrat: et ipsam amputationem rarissime effectum tristi caruisse docet.
- P. 45. esse praecipit. Symptomata canceri, ex turgescencia, seu rarefactione materiae scirrhosae aut obstruentis explicat, hancque ipsi dictam fermentationem, cum mutationibus quibusdam aliis, in natura obuenientibus, inprimis cum vegetationibus chemicis comparat. Mercurii sublimati cum spiritu vini vsum prorsus reiicit, quod remedium simul longo antea tempore notum fuisse, quam BOERHAVIUS eiusdem mentionem fecerit, ostendit. Belladonnae, aconiti, et ipsius cicutae effectum vel nullum, vel rarissimum fuisse hucusque, prolixè monstrat: et ipsam amputationem rarissime effectum tristi caruisse docet.
- P. 53. rat. Mercurii sublimati cum spiritu vini vsum prorsus reiicit, quod remedium simul longo antea tempore notum fuisse, quam BOERHAVIUS eiusdem mentionem fecerit, ostendit. Belladonnae, aconiti, et ipsius cicutae effectum vel nullum, vel rarissimum fuisse hucusque, prolixè monstrat: et ipsam amputationem rarissime effectum tristi caruisse docet.
- P. 52. tempore notum fuisse, quam BOERHAVIUS eiusdem mentionem fecerit, ostendit. Belladonnae, aconiti, et ipsius cicutae effectum vel nullum, vel rarissimum fuisse hucusque, prolixè monstrat: et ipsam amputationem rarissime effectum tristi caruisse docet.
- P. 67. rissimum fuisse hucusque, prolixè monstrat: et ipsam amputationem rarissime effectum tristi caruisse docet.
- P. 69. Ad veram igitur curationem efficiendam quatuor morbi huius species distinguit, et in venereo mercurialibus; in scorbutico seu scrophuloso acidis mineralibus, et tincturis, ex antimonio paratis; in complicato, seu ex venereo et scorbutico mixtis, vtriusque generis medicamentis alternis vicibus exhibendis; et in simplici, siue a causa externa inducto, lacte caprae vtitur, cui pabuli loco cicuta porrecta, vel si haec nondum propullulauerit, eius extractum, lactae vaccino solutum, datum fuerit.
- P. 71. Hoc modo omnia molesta symptomata, quae alias cicutae vsum concomitari solent, abesse adfirmat. Externa quae tam remedia, quorum cognitionem a medico quodam Armeniae se accepisse, quum in regionibus, orientem versus sitis, commoraretur, in praefatione narrat, summis laudibus extollit, et
- quan-



quantum nobis quidem videtur, venum exponit: neque vero eorum compositionem, neque vel vnicum numerosissimarum curationum, quas iis se praestitisse gloriatur, exemplum communicat.

VI.

An essay of the medical virtues of acids. By SAMUEL FARR, M. D. — London: printed for T. Cadell. 1769. 8. min pagg. 139.

i. e.

Tentamen super viribus medicis acidorum, Auctore Cl. FARR.

In prima sectione huius libelli Cl. Auctor generalis descriptionem acidorum praemittit, et postea distinctionem in mineralia et vegetabilia, variaque utrorumque genera, ostendit, pauca quaedam de acido, ex quibusdam animalibus obtinendo, subiungens. In secunda ad effectus acidorum generales progreditur. Mineralia pura sunt; cum vegetabilibus et animalibus substantia quaedam mucilaginosa, seu combinatio olei et aquae, adiuncta sit: et licet ars similes substantias cum mineralibus coniungere possit, nunquam tamen vera combinatio mixtionis, sed tantum mechanica diuisio particularum inde eueniet; sicut e contrario nullo modo acidum vegetabile vel animale ita purum fisci potest, ut ad perfectionem mineralis accedat. Sollicite ergo effectus acidi puri ab effectu eiusdem, cum aliis particulis remixti discerni, debet: ille autem in genere, quatenus vel in fibram solidam, vel in fluidum agit, considerandus est. Fibram, si vim vitalem spectes, acida irritant ac stimulant; sin elasticam, corrugant et crispant. Corrugatio cum ab

p. 11.  
p. 33.  
p. 39.

Secund. Decad. Suppl. II. Q absor-

- absorptione fluidarum partium, tum ab attractione alkalinarum proficisci videtur. In fluidis effectus
- p. 47.** acidorum sunt coagulatio et vis antiseptica; in examine prioris vim ignis et spirituum ardentium cum isto effectu Noster comparat, et vtrumque in dissipatione partium aquosarum conuenire inter se suspicatur: praesertim cum acida sub quibusdam circumstantiis indolis admodum volatilis sint, ideoque facile cum alkali volatili, in fluidis animalibus latente, coniungi, hocque secum in auras abrepto, massam solidam relinquere, posse videantur. Putredinis animalis causae vel ab humoribus, particulis peregrinis ac noxiis inquinatis, vel a debilitato solidorum vigore repetendae sunt, et in vtroque casu acida eidem potentissime resistunt.
- p. 55.** Haec omnia in sectione tertia fusius et specialius explicantur. Praeter vniuersalem vim excitantem, ab irritante qualitate profectam, vsum acidorum in morbis oris et viarum imprimis saliuarum, ab obstructione oriundis, Noster ostendit; simul tamen monet, eo respiciendum esse, ne dentibus vis inferatur, cum marmorea ipsorum substantia terreae indolis sit, ideoque facile ab acidis soluenda. Quantum ventriculo cum reliquis corporis partibus, imprimis cum cute, intercedat commercium, ex eo
- p. 62.** probare satagit, quod, ventriculo delicatiore existente, vel minima acidi qualitas admodum validam diaphoresin excitat. Nimiae eiusdem quantitati,
- p. 67.** a viribus fermentationis decompositae, neque ob defectum bilis correctae, colica pictonum adscribenda est. Acida sub forma clysterum acrius purgant, sed ob tenesmum inde oriundum saepe infensa sunt: inde vsum eorum esse posse in paralyssi intestinorum, Noster arbitratur. Quamquam in primis viis adeo immutantur, vt in forma propria vasa lactea



lacteæ non intrent; possunt tamen in organis secretoriis novas mutationes subire, adeo, ut pristinam  
 rursum formam, particulis iterum inter se coniunctis, induant, quod excitata inde diuresis ac diaphoresis euincunt. Vis adstringens potissimum in partibus externis sese exserit, v. c. in luxatis, contusis, tumoribus: idem tamen effectus suo etiam modo in partibus internis expectari poterit. Vis coagulandi in sano corpore vix euoluitur; intemperantiori autem eorum usus concretiones polyposas tribuendas esse, nullum est dubium.

Sectio quarta specialiores morbos disquirat, in quibus acidis utendum sit. In febribus inflammatoriis efficaciam eorum Noster forte qualitati sedatiuæ, a stimulante profectæ, cum omnia sedantia vehementissime stimulant, quod opii exemplo patefiat, virtuti refrigeranti et resoluenti obstructions in vasculis minimis, ac denique putredini resistendi eamque corrigendi, adscribi oportere existimat. Posterior potissimum effectus in febribus putridis manifestus est; sed multo maioribus dosibus opus esse Noster docet, quam nunc solemnes sunt, cum quinquaginta guttarum spiritus vitrioli, duabus uncis aquæ temperatarum, non nisi quingentesima pars, singula vice in venam subclauiam perueniat; neque eorundem usum externum posthaberi debere in cataplasmate, fumigatione, clystere, odoro. Ad horum morborum febrilium normam etiam usus acidorum in variolis diiudicandus est; eo tamen respiciendum, ne solida nimis firma et rigida, fluida nimis immobilia ac densa, et eorum circulus nimis languidus sit: quæ attentio quoque in præparatione ad inoculationem locum habere debet.

- p. 114. In febre lenta quatenus acida conueniant, ardua res dictu est. Licet enim ob irritationem idonea videntur resoluendae obstructioni, quae illam saepius efficit, tamen rigiditas solidorum et densitas, visciditas atque inertia fluidorum, quae saepe in morbo hoc adsunt, eorum usum suspectum reddunt. Alia res est, cum sanguis magis dissolutus est, aut pus tussi reiectum, aliaque symptomata veram hecticam iam adesse euincunt: licet in tristi hoc aegri statu vix vnumquam curatio perfecta ab iis
- p. 123. expectari queat. In asthmate ac tussi senili maior utilitas ab iis cum interne, tum externe, sub specie cataplasomatis, suffimigii cet. adhibitis, expectanda est, cum inde glandulae bronchiales stimulentur, fibrisque, irritatis, remotio muci praeter naturam congesti et restauratio viuidae earum actionis
- p. 125. praestetur. Hac occasione etiam in transitu Noster monet, acetum vini, ob admixtas partes mucilaginosas, huic fini obtinendo minus idoneum esse, ideoque potius acidis mineralibus potiores partes tribui oportere, cum per se, tum in coniunctione cum aliis remediis: ipsique persuasum esse, oxymel scilliticum ipsum, si ope acidi mineralis dulcificati pararetur, palato multo gratius fore. In diarrhoea et dysenteria, quae a nimio acido in primis viis haerente oriuntur, si illud a nimia fermentatione fructuum maturorum et bene digestorum ortum fuerit, acida mineralia commendat Noster, quod eorum virtute aer elasticus, fermentatione euolutus, destruat et fixior reddatur. Quod autem frequentius isti alui fluxus putridae indolis esse cognoscuntur, latius etiam in iisdem acidorum usus patet, cum in inuertenda et euacuanda putrida materia, tum in irritandis vasis, quo contenta eiiciant, atque in roborandis eorundem tunicis.



In morbis chronicis acida vsurpari possunt, p. 132.  
 quum a caussa inertī et non actiua obstructiones  
 natae sunt, stimulum inde inferendum expostulan-  
 tes. Crebro etsi hac theoria fundati iisdem  
 vti velimus, ea tamen morbi indoles est, quae ipsorum  
 vsum non ferat, v. c. hydrops, rheumatismus, arthri-  
 tis, calculus: et licet ob potentio-rem resoluendi  
 vim, in iis conspicuam, in posteriori morbo haud pa-  
 rum vtilitatis inde expectandum videatur; difficilli-  
 mum tamen, imo impossibile est, eadem non mu-  
 tata ad vias vrinarias deferri. Primarius ergo eo-  
 rum in morbis chronicis vsus tum demum se pro- p. 136.  
 dit, cum organa digestionis afficiuntur: neque is in  
 compescendis variis haemorrhagiarum generibus p. 137.  
 contemnendus erit.

## VII.

**Physiological Essays and observations,** by JOHN  
 STEDMANN, M. D. Fellow of the Royal Col-  
 lege of Physicians in Edinburgh. Edin-  
 burgh: Printed for A. Kincaid and I. Bell, and  
 T. Cadell. London, 1769. 8. mai pagg. 140.  
 tabb. aeri incisae 4.

i. e.

**Physiologica tentamina et obseruationes,** Au-  
 ctore IOHANNE STEDMANN, M. D.

**T**entamen primum de diuisionibus pulsuum ex-  
 ponit. In diiudicanda actione arteriarum, a  
 sanitatis regulis recedente, ad eius vel iusto maio-  
 rem, vel minorem dilatationem, et ad eius pulsatio-  
 nes vel iusto frequentiores, vel rariores, respici  
 oportet: hae facilius disquiruntur, quam illae, fre-  
 quentius etiam a solito aberrant. Mensura igitur  
 p. 5.

- cum dilatationis, tum pulsationis opus est, si genera quaedam stabilire voluerimus. Inde pulsum
- p. 7. magnum dicit Noster, quum arteria vibrationibus excedit dilatationem naturalem, numero pulsationum mensurae vel aequali, vel eadem minore; parvum, quum arteria infra naturalem mensuram dilatatur, pulsationum vero numerus maior est vel superior mensura; fortem, quum arteria dilatatione et numero pulsationum simul mensuram excedit; et debilem, quum dilatatio naturali minor est, numerus vero pulsationum mensurae vel aequalis, vel
- p. 8. minor eadem. Cum vero dilatatio arteriae saepe adeo exacte definiri nequeat, ad primam classiem pulsus frequens et rarus adhuc referri debet, nimirum numero pulsationum mensuram vel excedente, vel non attingente, extensione tamen arteriae ad sensus non mutata. Has differentias in adiecta tabula, aeri incisa, curiosius delineare annititur Cl. Auctor, in qua duae lineae parallelae, prout magis vel minus a se inuicem distant, diuersos dilatationis arteriae gradus denotant, et vndae intra has descriptae, prout vel altiores vel profundiores, vel longiores vel breuiiores, vel latiores vel arctiores sunt, additis simul numeris, pulsationes designant. Docet postea, in quo pulsus magnus a forti,
- p. 10. et paruus a debili, differat, et aliud pulsum genus prioribus adiungit, nempe plenum, quum in systole diameter non ad iustum gradum contrahitur, quod a plenitudine vasorum seu plethora proficiscitur: qui quidem bene a pulsu magno distinguendus est.
- p. 17. Septem ergo hae pulsum classes, cuinam statui corporis potissimum competant? fusius exponit; quae tamen omnia hic repetere instituti nostri breuitas nos prohibet: ac postea ex istis pulsus compositos declarat, nempe mollem ac durum, celerem ac tardum, acutum et obtusum, dicroton, intermit-
- p. 22. ten-



tentem, aliasque species magis fictas, quam veras esse addit, nempe formicantem, qui minimus gradus parui; vermicularem, qui debilis sit; et vndosum, myurum, et caprizantem, qui vel ab inaequali pressione digitorum, vel ab inaequali situ diuersarum arteriae partium oriatur. Aptius pulsus disquiritur, si digiti primum arteriam eousque compriment. ut circulationem sanguinis in ea quasi intercipere videantur: posteaque per gradus eleuentur, ut demum tactus nonnisi superficialis reddatur, seruatō simul calore naturali manus disquirentis. Incertum signum gradus caloris naturalis ex pulsu desumitur. Denique disquisitionem pulsuum in statu sano corporum maximopere commendat Cl. Auctor.

p. 23.

p. 24.

p. 26.

p. 29.

Tentamen secundum de menstruatione agit. Originem eius Cl. FREIND in plethora menstrua, a deficiente perspiratione oriunda, ponit, hancque debiliori solidorum structurae tribuit; vltimam vero causam plethoram istam efficere non posse, variis argumentis Noster demonstrat, nimirum quantitatem materiae perspirabilis, quae, computo facto, singulo die retinenda esset, nulla fere symptomata; sin autem ad duarum circiter librarum, ex FREINDII sententia menstruationis tempore excernendarum, pondus per mensem ascendat, ea omnino pessima producturam; vero simile non esse, ut ad nutriendum fetum natura vtatur defectu reali, nimirum defectu virtutis expellendi fluidum excrementitium: sanguinem istum purissimum esse oportere, qualis tamen fere non sit: increfcente aetate, cum functiones vitales omnes debilitentur, ideoque perspiratio quoque minuatur, necessarium fore, ut fluxus menstruus tunc augeatur potius, quam supprimatur: feminas in regionibus borealibus nonnisi aestiuo tempore menstrua pati. Falsum etiam esse

p. 33.

p. 34.

p. 36.

- p. 40. assertum FREINDII, in plethora spiritus animales augeri, indeque actionem cordis et velocitatem sanguinis incitari. Potiorem autem causam Noster in plethora partiali ponit, quae a copiosis ramificationibus vasorum, ad vterum vicinasque ei partes tendentium, et multitudinem harum ramificationum in respectu ad paucitatem truncorum maiorum, ex quibus oriuntur, pendet: ex qua conditione non potest non insignis retardatio fluidi, per has partes mouendi, proficisci. Ab ipsa hac in adeo minutos
- p. 46. ramulos diuisione debilitas vasorum repetenda est, facile ideo impulsui fluidi maiori et subito cedentium: accedit structura ramorum venarum spermaticarum, quae in proportionem ad arterias amplae sunt, valuulisque destitutae, adeoque omnino actioni arteriarum magis resistunt. Si igitur ex his causis sanguis in minimis vasculis stagnat, ab omni corruptione immunis manere nullo modo potest:
- p. 48. acrimoniam ergo adeptus, vasa stimulat, et, cum nouus a tergo semper accedat, tandem, vtraque hac causa cooperante, ex orificiis arteriosis in cauum vteri ac vaginae excernitur, donec, vasculis collapsis, tonus priscus redeat, et fluidis, per has partes mouendis, iusta velocitas restituatur.
- p. 50. Similis fere ratio est fluxus haemorrhoidalis
- p. 53. periodici. Inde Cl. Auctor copiose docet, sanguinem menstruum, licet arteriosus sit, neququam purum esse habendum. His tamen omnibus stabilitis, difficilis quaestio est, cur haec excretio non nisi
- p. 54. pubertatis demum tempore accedat? A solo incremento corporis absoluto certe non pendet, cum illud adhuc continuari videamus, licet fluxus menstrualis iam inceperit. In genere defectus incrementi corporis non proficiscitur a maiori firmitate partium, sed a mole et pondere eius in proportionem
- p. 56. ad vim potentiae mouentis. Ad explicandam ergo huius



huius rei causam Cl. Auctor aptitudinem, seu dispositionem quandam naturalem vteri ad sanguinem menstruum recipiendum assumit, quae ante terminum pubertatis in eodem non adfuerit, pariter ac alias mutationes corporis humani, certis ac definitis vitae periodis proprias esse, perspicimus. Partialem porro plethoram ex vteri fabrica declarat, et exinde ad absorbentem quandam vim vasorum eiusdem concludit, atque ad illustrandam hanc opinionem exemplo seminum plantarum utitur, quae non, nisi tum, cum perfecte matura sunt, calori et humiditati exposita hanc attrahunt, turgescunt, et germinant, idque non ab externis tantum istis causis, sed etiam ex interiori ipsis propria structura.

p. 73.

p. 74.

Ex hac theoria transitus fit ad morbos vteri, causasque et curationem fluxus menstrui impediti aut suppressi, doceturque, in obstructione pertinaciori vterum vel destitui facultate absorbendi sanguinem ex arteriis adiacentibus, vel, hac etiam facultate adhuc quodammodo subsistente, tamen deesse vim propellendi et excernendi eundem: indeque constituendum esse discrimen inter usum remedium resolventium et stimulantium, neque ideo existere posse emmenagogum specificum. Causam, cur interdum matres imbecilles, vel morbo affectae, infantes sanos et vegetos vtero gerant, et in lucem edant, suo quoque modo ad theoriā de virtute absorbente vasorum vterinorum refert, et sanguinem in vasis placentae percolari quasi ac depurari putat, ut salubrior et nutritioni fetus aptior euadat.

p. 78.

p. 82.

p. 90.

Tentamen tertium de auxiliis mensurandi proportionales quantitates caloris differit, quorum tamen neque brevis satis et concinna, neque perspicua notio hic exhiberi potest, quum vix sine

p. 95.



inspectione figurarum additarum mens Cl. Auctoris satis capiatur. Ad inueniendam determinandamque proportionem caloris aeris per se, varios gradus caloris artificialis efficit, dum peculiari apparatu quatuor, sex, vel octo candelas sebaceas vnius eiusdemque formae, consistentiae atque magnitudinis circa thermometrum in aere libere haerens ponit, easque vno tempore, vel propius ad centrum totius apparatus, super quo thermometrum pendet, adducit, vel magis ab eodem remouet. Hunc modum determinandi caloris gradus, ad varia postea phaenomena accuratius inuestiganda applicari posse declarat. In addita protinus ab initio huius tractatus notula demonstrat, DREBBELIUM non posse dici, inuentorem thermometri, cum illud vel anno 1620, vel tardius adhuc ab eo inuentum fuisse constet; SANCTORII vero aphorismi 1614 in lucem prodierint, quem quidem thermometri usum cognouisse, ex ipsis eius scriptis vero simillimum sit.

P. 123. Tentamen quartum, idque vltimum, insalubres constitutiones aeris expendit, quae a defectu ventorum, maiori impetu accedentium, exoriuntur. Exemplo vicissitudinis tempestatum, a mense iunio 1732 vsque ad decembrem 1735 obseruatarum atque inter se collatarum, ostendit Cl. Auctor, mutationes, in barometro, thermometro et hygrometro conspicuas, tanti momenti non fuisse, vt iisdem morbi epidemici grauiores non Edinburgi tantum, sed et in pluribus Europae regionibus, quin in ipsa America duobus modo memoratis et proxime insectis mensibus grassati, adscribi potuerint; sed veram ipsorum causam in defectu ventorum vehementiorum, eo ipso tempore obseruato, poni oportere, praesertim tunc validiores effectus editurum, cum



cum corpora magis ad morbum suscipiendum idonea sint, minusque roboris habeant ad eadem resistendum: similem etiam morbum, antequam Edinburgi incolas inuaderet, epidemicum inter equos grassatum esse cet. Frequenter etiam contagium morbosum, per naues in aliquam regionem delatum, putari, ad quod tamen euoluendum depuratio aeris, minus rite procedens ob ventorum defectum, plus contulisse iudicanda sit, quod inprimis recentissimo exemplo pestis, quae Messanam anno 1743 depopulata est, demonstrat, quam a naue Genuensi inductam dicebant; cuius tamen potiore causam frequentioribus austris et coelo nubilo, funestum hunc morbum praegressis, et ipso iam saeuiente adhuc praesentibus, adscribit. p. 137.

### VIII.

IOANNIS ANTONII SCOPOLI Phil. et Med.  
Doct. S. I. R. et Apost. Maiest. Mont. Ciuit.  
Idriae Physici, Chem. et Metallurg. Profes-  
sor. Supr. Offic. Min. Ibid. Assessor. Soc.  
Oecon. Lusat. Sup. nec non Caes. Reg. Agric.  
Styriacae, Gorizensis et Labacensis Socii An-  
nus I. historico - naturalis. Lipsiae. sumpti-  
bus Christ. Gottl. Hilscheri 1769. 8. pl. 10½.  
Annus II. ibid. eod. pl. 7½. Annus III. ibid.  
eod. pl. 7.

**C**el. huius operis Auctor, cuius in variis historiae naturalis capitibus doctrinam, pluribus ex specimenibus iam perspectam habet eruditus orbis, apud se constituit, suas ad scientiam naturalem et agriculturam pertinentes observationes, singulis annis, publici iuris facere.

Ordi-

- Ann. I.     Orditur vero primum annum historico-naturalem \*) a specimine ornithologiae, in quo aues, quas aut ipse in museo conseruat, aut in viuario Caesareo et Museo Turriano Viennae vidit, describuntur. Quo in labore ad Ill. quidem LINNAEI systematis ordinem progreditur, ita tamen, vt et in generum et specierum enumeratione aliqua facta sit mutatio. Et primo noua quaedam condidit genera, quae Ill. LINNAEUS non habet; deinde duo
- P. 78. quoque ex Kleinianis introduxit. Noua illa sunt: *Vria* Cl. BRÜNNICH ex *Anserum* ordine. Distinguitur a colymbo, cui vicinum est genus, tibiis paene minime dentatis, digitis omnino palmatis. Ad *Ploti* vero genus Kleinianum potius referenda esse videtur species illa vnica *Vria Lomua*, quam ex BRÜNNICHII ornithologia hic adduxit Cl. Auctor, et quae apud LINNAEUM *Colymbus Troile* vocatur.
- P. 110. Aliud nouum genus *Trachelia*, Cl. SCOPOLI ad *Grallarum* retulit ordinem, cum apud LINNAEUM in *Passerum* ordine sit, vbi vnica huius generis Scopoliани species *Trachelia pratincola* ad *Hirundines* refertur et *Hirundo pratincola* vocatur. Ipse Ill. Archiater auem hanc, a KRAMERO olim descriptam, mediam inter *hirundines* et *grallas* dicit, ob femora
- P. 154. seminuda. *Syluiae* nomen genericum imposuit Cel. Auctor

\*) Huius anni versio germanica prodiit Lipsiae 1770. 8. Auctore Cl. F. C. GÜNTHER Med. D. Archiatro Coburgensi et Practico Cahlenfi, qui, cum ipse auium collectionem possideat, et in ornithologia non leuiter versatum se praestet, notas egregias adiecit, in quibus vel mentem Auctoris explicat, vel de victu, habitaculis, et moribus auium differit, vel characteres a Cl. SCOPOLI prolatos emendat. Promisit se ceterorum annorum translationem moliturum, quod optamus, cum id non sine vsu in augendo historiae naturalis et agriculturae studio fore speremus.



Auctor nonnullis *Motacillae* speciebus, quas ex eo quod arboribus infideant, vocemque in volando nullam edant, ab illo genere diuellendas esse credit. Ex his sunt : *Luscinia*, *Curruca*, cet. Ex Kleinianis recepit Cel. Auctor *Brantae* genus, quod ab Anatibus rostro attenuato, et digito postico perunguem validum, teretem, membrana subtus alatum, terminato, distinguitur. Species, quas huc retulit, omnes, subdiuisione facta, inter *Anates* comprehendit LINNAEUS. *Ploti* genus ad KLEINII descriptionem idem stabiliiuit, vt a *Mergo* rostro tantum edentato diuersum. p. 67. p. 72.

Deinde Cl. Auctor varia genera nouis quoque speciebus locupletauit, vt genus *Strigis*, *Colymbi*, *Lari*, *Ardeae*, *Ralli*, *Tetraonis*, *Emberizae*, *Fringillae*, *Motacillae*, nec non quasdam Linnaeanas species aliis generibus subiecit. Sic *Coruum pyrrhocoracem* et *graculum* LINNAEI, Cel. Auctor pro vna specie, diuersis anni temporibus colore pedum variante, habet, et ad *Graculae* genus refert, vti *Dio-medeam exulantem* LINNAEI ad *Procellarias* transtulit. Porro *Sterna nigra* LINNAEI ad *Laros*, et *Recuruirostra auocetta* EIUDEM ad *Scolopaces* abire iussa est. *Turdum roseum* LINN. *Sturnorum* generi inseruit. *Fringillam* autem *Carduelem*, et *Spinum* LINNAEI *Emberizis* adnumerat. *Sturnus cinclus* LINN, nunc ad *Motacillas* pertinet. Caeterum descriptiones omnium harum auium accurate elaborauit, differentias apposuit, et synonyma quoque et nomenclaturas Carniolicas, Germanicas atque Italicas addidit. p. 40. p. 74. p. 82. p. 92. p. 130. p. 144. p. 152.

Secundus annus iter Gorizienfe et Tyrolense, atque obseruationes de Cucurbita pepone et de Lichenis Islandici viribus medicatis continet. Scopus prioris itineris res agraria fuit. Pauca in eo animalia Ann.II. p. 7.



- malia, nullae vero plantae describuntur, quas *Florae Carniolicae* Auctor Cl. inseruit. Passim observationes nonnullae mineralogicae communicantur, ut
- p. 9. de *humo atra* (quam chemice Cl. Auctor examinavit, et, eam ex argilla particulis martialibus et inflammabilibus copulata constare, reperit) de *terra*
- p. 20. quadam martiali *Medeensi* rubra, de *Coralliis* variis petrificatis cet.
- p. 28.
- p. 37. Observata in itinere Tyrolensi secundum systematis naturae ordinem describit Noster. *Salmonem alpinum*, *salmarinum* et *saluelinum* L. distinctas esse species dubitat. Plantae, quarum descriptiones hic
- p. 41. communicantur, sunt: *Pederota* (Bonarota MICHELII) *coerulea* et *lutea*; *Veronica saxatilis*, *frutescens* et *bellidioides*; *Valeriana montana*; *Thesium alpinum*; *Rhamnus saxatilis* et R. *Lycium* (graine d'Avignon); *Campanula barbata*, *rotundifolia*, *linifolia*; *Phyteuma haemisphaerica*, *pauciflora*, et *comosa*, varietates tantum sunt unius eiusdemque plantae, quae a solo natali pendent; *Laserpitium latifolium*; *Allium schaenoprasum*; *Hemerocallis Liliastrum*; *Daphne Cneorum*; *Saxifraga stellaris*, *autumnalis*, *cespitosa*; *Saponaria ocymoides*; *Sempervivum arachnoides*; *Potentilla Tyrolensis*, et *aurea*; *Cistus canus* et *tomentosus*; *Anemone Flemmensis*; *Aiuga pyramidalis*; *Melissa Pyrenaica*, quam LINNAEUS ad *Hormini* genus refert; *Clypeola alyssoides*; *Iberis rotundifolia*; *Geranium cicutarium*; *Vicia sylvatica*; *Hedysarum Onobrychis*; *Astragalus Cicer*; *Lotus filiquosus*; *Scorzonera humilis*; *Andryala aurea*; *Hieracium alpinum*; *Crepis arenosa*; *Cirsium Britannicum*, *defloratum*, *acaule*, *spinosissimum*, et *Erysithales*; *Gnaphalium leontopodium*; *Tussilago alpina*; *Senecio alpinus*; *Aster alpinus*, et *Bellidiastrum*; *Orchis nigra*; *Pinus Mugho*, et *Cembra*; *Salices alpinae* duae; *Acrostichum septentrionale*; *Lichen miniatus* cet. His plantarum descrip-



scriptionibus annexa sunt varia corpora mineralia, p. 69.  
 circa quae Cl. Auctor aliquas in hoc itinere obser-  
 tiones facere potuit. Inter illas examen chemicum p. 73.  
*Basaltis spumae lupi* reperitur, ex quo patet inesse  
 huic lapidi terram ferriferam, irreducibilem, prin-  
 cipio terreo specifico ac forte alcalino vnitam, quae  
 vna cum terra vitrescibili strias radiosque, in mine-  
 rali hoc corpore occurrentes, constituat, absque  
 ullo arsenici aut sulphuris mineralis additamento.  
 Hinc putat non omnem spumam lupi ferrum aut  
 stannum et arsenicum continere, vt varii minera-  
 logi docuerunt. Observationes oeconomicas omit- p. 97.  
 timus. His addita sunt varia, quae botanicam de-  
 scriptionem et culturam Cucurbitae peponis spe-  
 ctant. Tandem de viribus medicis lichenis Islan- p. 107.  
 dici varia Cl. Auctor monet. Eo non solum fues,  
 equi, et boues intra breue tempus faginantur, sed  
 et cum lacte decoctus in phthisi, rachitide, cachexia,  
 ob vim nutrientem et roborantem egregios effe-  
 ctus praestat, quod pluribus observationibus hic  
 confirmatur.

Initium anni tertii historico naturalis facit solu- Annus  
 tio quaestionis, an, vt PLINIUS (L. 29. Cap. I.) III.  
 asserit, medici olim Roma pulsi sint, et Romani per P. 5.  
 sexcentos annos medicis caruerint? quod nun-  
 quam factum esse Cl. SCOPOLI asserit. Ostendit  
 vero primum variis Auctorum celeberrimorum te-  
 stimoniis et exemplis Pliniana historiae nullam  
 fidem deberi; deinde probat medicos intra tempo-  
 ris, a PLINIO commemorati, spatium Romae fuisse;  
 CATONEM, cuius auctoritatem PLINIUS affert, hono-  
 rifice de medicis sensisse; legem porro Aquiliam PLI-  
 NIO obstare; plures epidemicos morbos Romae fae-  
 vissse, in quibus Romani vsi sint medicis; templa illos  
 APOLLINI, AESCULAPIO et saluti exstruxisse, imo  
 AESCULAPIUM ipsum Romae fuisse cet. Quibus  
 omni-



p. 28.

omnibus catalogum aliorum medicorum, Romae degentium addit, in quo ii inprimis commemorantur, qui a Iulio Caesare ad Hadriani tempora in eadem vrbe floruerunt. Secunda huius anni commentatione luis bouillae symptomata, causas, mutationes, ac remedia praeferuatiua et curatiua Auctor Cl. describit. *Luem bouillam*, quam veteres *μαλὴς* vel *μαλὴν* dixerunt, febrem inflammatoriam contagiosam Auctor Cl. vocat. Huius quatuor species iam veteres fecerunt.

1) *Serosam* scilicet, quam Germani (*den schwarzen Brand*) s. gangraenam nigram vocant, in qua pituitosus vel viscidus humor ex ore et naso fluit.

2) *Siccam*, quae et (*die Bräune*) brunella vocatur, in qua nullum ex ore et naso stillicidium apparet.

3) *Articularem*, s. inflammationem articulorum, (*die Knochenentzündung*.)

4) *Cutaneam*, s. gangraenam calidam, (*der heisse Brand*.)

*Serosa* vero triplex est, *maligna*, *anginosa* et *pulmonalis*. Priorem LANCISIUS descripsit, in qua boues, quasi fulmine tacti, subito intereunt, quae in animalibus effoetis tantum ac debilioribus occurrit. *Anginosa* cum pustulis et vlceribus in lingua, et effluxu feri ex naribus, coniuncta est. In *pulmonali* omasus indigesto pabulo repletus est, tussis animal molestat, et saepius pulmones vario modo laesi sunt. His praemissis, de causis, progressum luis fouentibus, signis mutationis in mortem vel salutem, et remediis variis praeferuatiuis et curatiuis agit. Inter praeferuatiua numerantur phlebotomia, sal culinare, nitrum, fel vitri, decoctum herbarum amaricantium v. c. cardui benedicti cet. quo multos a lue praeservatos fuisse boues Cl. Auctor notat. Quod ad curationis methodos attinet plurimae tum ex aliis, tum ex propriis obseruationibus hic adducuntur. Inter illas est cura ab Ill. SWIETENIO in epistola manu-



uscripta commendata. Ex consilio vero eius,  
 alac prima morbi signa se manifestant, (caput  
 ipe pendulum, oculi tristes, cessans ruminatio)  
 aens remedium per infundibulum infundatur  
 mane in fauces: Recipe vitrioli albi vnciam semis,  
 mellis vncias tres, aquae purae libram vnam semis,  
 misce. Potus copiosus quoque tepidus ex decocto  
 furfurum detur, et idem remedium per tres dies  
 repetatur. In adulto morbo nocet. Remedio hoc  
 adhibito, potus copiosus solus reliquam curam ab-  
 soluit, cui acetum addatur, vel in quo fructus acidi  
 decoquantur Sequuntur observationes de coeru- p. 67.  
 leo Berolinensi, aliisque laccis. Experimenta, a Cl.  
 Auctore fusius hic descripta, probant, principia  
 constitutiua coerulei Berolinensis esse oleum ani-  
 male tenuissimum, alcali volatile, particulas mar-  
 tiales, et terram aluminis: a nimia copia particula-  
 rum martialium colorem nigrum oriri, eumque,  
 particulis his ab acidis solutis, quoque dissipari, et  
 coeruleum denuo redire: superfluum denique aci-  
 dum impedire, ne color coeruleus praecipitationis  
 tempore statim se prodatur. In observationibus de p. 76.  
 laccis experimenta refert, quae demonstrant, terram  
 aluminis a phlogisto vegetabili certis sub conditio-  
 nibus colorari, differentiam vero coloris a differen-  
 tia principii inflammabilis oriri. Ultima denique p. 79.  
 huius anni commentatio experimenta circa mine-  
 ram auriferam Nagyayensem continet. Notum est  
 plurimos mineralogorum, et HENKELIUM inprimis,  
 asserere, aurum non, vt vocant, mineralisari, sed  
 semper natiua sub forma mineris, e quibus educatur,  
 inesse, quamuis ob paruitatem auri puncta non  
 semper nudo oculo conspici queant. Hoc vero fal-  
 sum esse, aliqua minerae species, quae in Transyl-  
 vania circa *Seckeremb* non procul a *Nagyay* reperitur,  
 probat, ex qua, licet ne minimam auri natiui por-  
 Sec. Dec. Suppl. II R tio-

tionem contineat, insignis tamen auri copia fusionis ope educitur. Constat autem laminis nigricantibus, tenuibus, nitidis, quae quarzo solido inhaerent \*).

**p. 107.** Ex tentaminibus, quae cum ea Cl. Auctor instituit, concludit: esse eam galenam lamellosam, seu terram plumbariam, modice sulphuratam, principibus auri et argenti, nec non martialibus particulis intinuatam, quae volatiles partes plurimas contineat, aurumque et argentum, quod ex ea obtineatur, non eductum, sed productum esse.

\*) Prima mentio huius rarissimae minerae, quae in primis ex liberalitate Ill. DE BORN, qui rebus metallicis in Bohemia nunc summa cum laude praeest, mineralogis exteris cognita reddita fuit, facta est in libro, inter nos rarissimo, cuius titulus est: *Mineralogia magni principatus Transylvaniae, conscripta*, a IO. FRIED. WALSKY S. I. Sacerd. Claudriopoli 1767. 4, p. 85. qui in ea cum antimonio aurum mineralisatum esse credit. Experimenta, quae in libro Cl. SCOPOLI, de quo iam ad lectores retulimus, continentur, Cl. SCHREBERUS breui de hac minera commentario inseruit, qui in EIUDEM *Cameralischen T. II. p. 136.* reperitur, cui nonnullae observationes et emendationes, a Cl. BRÜNNICHE factae additae sunt. Post Cl. SCOPOLI idem Cl. BRÜNNICHE in noua, quam curauit, mineralogiae Cl. CRONSTAEDT in germanicam linguam translatae editione, huius minerae mentionem fecit, et Cl. SCOPOLI sententiam sequutus est. Cl. veron DELIUS in eleganti libro: *Abhandlung vom Ursprunge der Gebürge* etc. qui Lipsiae 1770. 8. prodiit, p. 122. seq. probat: aurum cum antimonio mineralisatum in hac minera esse, eaque occasione etiam de pyrite aurifero Facyebaniensi egregias observationes profert.





nitrum celerrime, pelluciditate non turbata. Terrae absorbens fundum item petiit, et pelluciditatem liquoris restituit. Quae corpora cum per aliquot septimanas cum bile committeret, veritatem, assertum Pringliani agnouit: alcalia fixa et volatilia aequae, acida putredinem non vrgere, sed arcere potius; terras, e contrario absorbentes, septica vi eandem imminentem accelerare.

p. 22. Gradus caloris naturali maior, ebullitione minor, exhalata liquida bilis parte, *sapam*, s. extractum eius efficit, quod in libero aere mollescit, putredine tamen non corrumpitur, in calore liquescit, igne inflammabile, in aqua solutum, biliariam naturam iterum induit.

p. 23. Destillatione bilis humanae drachmarum trium et scrupulorum duorum pondere Cl. Auctor obtinuit:  
 1) liquoris insipidi mediae naturae drachmas duas.  
 2) Spiritus vrinosae naturae, cui etiam multum olei adhaerebat, scrupulos duos. 3) Olei adusti circiter grana octo. 4) Carbonem nigrum, ex quo magnes nihil attrahebat, et qui elixiuatus purum alcali prodebat, ex cuius praesentia Auctor acidum quoque inesse iudicat, cum omne alcali ex acido igne producatum. Bilis putridae, destillationi subiectae, eadem plane ratio fuit.

p. 26. Acidum bilis principium ope vrinosi alcali expellere frustra tentauit; nec melior successus eius experimenti fuit, quo alcali volatile, addito tartaro vitriolato, e bile, destillatione, expellere crediderat, attamen in ea operatione hepar sulphuris nactus est. De sanguinis venae portarum et cauae differentia, et varia particularum salinarum et oleosarum proportionem, ex instituto experimento certior factus non est. Dehinc ad experimenta, sine igne, cum diuersis liquoribus progreditur, ex quibus sequentia notamus: acida mineralia concentratissima ebullire faci-



faciunt bilem, eiusdem colorem mutant; nitri acidum id peculiare ostendit, vt quasi fermentationem produxerit, in qua depositum coagulum ad superiora vasis attolleretur, vbi spumae instar liquori, caeterum claro, supernataret. Quod phaenomenon Cl. Auctor a partis inflammabilis bilis cum acidi phlogisto pugna deriuat.

Ex liquore, a praecipitatione per acidum vitriolicum residuo, duplices crystallos, alias sali mirabili GLAUBERI analogas, alias plumosas, quasi seleniticas, obtinuit Cl. Auctor. Nitri acidum crystallos, nitro cubico similes, largitum est. Salis denique acidum eas, quae sali culinari accederent. Concludit exinde, alcali minerale in bile esse, quod a sale marino, per varias vias in corpus ingesto, derivat. An vero illud medium sal integrum, an quoad partem tantum alcalinam in sanguine resideat, per vstulationem determinare cupidus, carbonem, ab ea operatione residuum, elixiuando, crystallos iterum duplices, cubicas nimirum decrepitantes, et oblongas in aere fatiscentes, (ideoque salis mirabilis aemulas) nactus est, quod aut ab acido catholico, quod in salis acidum mutatum fuerat, in corpore iterum restituto, aut a noua acidi vitriolici ex terra et aqua productione, ortum esse coniicit. Coagulum bilis, ab acidis mineralibus relictum, naturam resinae siue gummiresinae induit, et, pro varia acidi indole, magis minusue in aqua soluitur; vinum autem, alcohol, et alcalia illi pro menstruo sunt.

Vegetabilia acida bilem minori cum violentia mutant, si acetum, ab aerugine destillatum, excipias. Reliqua autem, si a crassiori bilis coagulo separaueris, massam melliformem, in spiritu vini et aqua perinde solubilem, cui nihil salini inhaeret, relinquunt. Cum bile bubulae capta eadem experimenta,

R 3

idem

- idem penitus largiuntur. Alcalia bilem aequè  
**P. 42.** solvunt, sed tardius, quam acida. Volatile alcali,  
dum attollitur, partes aquosas bilis abripit, et ma-  
gma spissum cum salinis particulis adhaerentibus  
relinquit. Vegetabile alcali, ob diuersam erga  
oleosam et aquosam bilis partem affinitatem,  
solutionem, in duplicem portionem secedentem, ob-  
tulit, oleosam, et aquosam; quarum haec duplices  
denuo crystallos, oblongas, et cubicas deposuit.  
Putridae bili admixta alcalia idem plane docuerunt.  
**P. 43.** Colorem, quem mixtus cum bile violarum  
syrupus prodit, viridem, Cl. Auctor non pro alca-  
linae indolis signo habendum esse existimat, cum po-  
tius a colore bilis liuido, cum coeruleo syrapi  
**P. 44.** mixto, producat. Fermentati vegetabilium liquo-  
res adhibiti minus constantia phaenomena dede-  
runt; siquidem vinum acidum vegetabile imitatum  
est; cereuisia, pro vetustate, magis minusue bilem  
mutauit; spiritus vini bili se miscuit; alcohol vn-  
ctuosam massam praecipitauit.  
**P. 45.** Porro Cl. Auctor Pringliana experimenta, de  
fermentatione, a partibus animalium ad putredinem  
procliuiibus, in vegetabilibus excitata, repetiit;  
eaeque genuina inuenit. Ridiculam inde eorum opi-  
nionem esse declarat, qui bilem inceptam in ven-  
triculo fermentationem suppressere statuunt; et de  
incongrua eorum methodo, qui in bilis inertia a-  
mara vegetabilia substituant, iudicat. Cl. SEE-  
**P. 48.** GERI assertum, sanguinem, e vena missum, bile af-  
fusa, fluidum aequaliter manere, repetito aliquoties  
experimento, verum esse inuenit. Saponaceam  
**P. 50.** bilis naturam indagaturus Cl. Auctor hanc, cum  
aqua frigida commissam, ab eadem ex integro recipi,  
inque ea mixtura omnia, quae in aqua solubilia sint,  
corpora solui, spumas facillime ex agitatione pro-  
duci, minimeque olei naturam prae se ferre vidit.  
Ean-



Eandem indolem vt disquireret, in diuersis vasis  
 lac purum, bilem cum diuersa lactis portione, et  
 lac cum sapone officinali reposuit, leuiter tecta, loco  
 modice calido; coxit eandem bubulam cum lacte;  
 agitauit alias portiones earundem substantiarum in  
 mortario; emulsionem quoque seminum cum et  
 sine bile reposuit; atque ex his omnibus compro-  
 batum ei est: bilem neque principiorum lactis seces-  
 sum, neque eius acescentiam morari, vt vtramque  
 potius acceleret; eandem tamen ab acido naturali  
 lactis, licet debilissimo, coagulari.

p. 51.

Vnguina animalium olea a bile nunquam tam  
 perfecte, quam a sapone vulgari subigi solent, sed,  
 etsi aliquantulum iuncta fuerint, breui tempore se-  
 parari obseruauit. Idem in amygdalarum, lini, et  
 oliuarum oleo, imo et butyro perspexit. Ex oleis  
 destillatis, instituto cum oleo sabinae, anisi, et te-  
 rebinthinae experimento, id redundauit, vt horum  
 nullum, bilis interuentu, vt ope saponis fit, in a-  
 qua suspendi posset, licet ea etiam bilis minus,  
 quam aquae connubium respuerent. Vetustate au-  
 tem aliquantumuis corruptum terebinthinae oleum,  
 cum bile et aqua ex integro coit, quod Cl. Auctor  
 euoluto per vetustatem acido tribuit.

p. 54.

p. 56.

Resina ope bilis non magis cum aqua mixta  
 fuit. Ex his experimentis colligit Auctor: Bilem  
 esse substantiam, ex acido animali et oleo vnguinoso,  
 ad certum gradum rancido, efformatam, multa aqua  
 dilutam, cui et serum et varium salium genus, mari-  
 num, mirabilis aliquid, forte et alcali mineralis  
 nonnihil, et terra, per animalis oeconomiae ratio-  
 nes inhaerent.

p. 57.

p. 60.

p. 61.

Vsum bili denique eum tribuit Cl. Auctor, vt  
 motum intestinum in digestionem promoueat, fer-  
 mentationem augeat, et, si saponacei aliquid habet;  
 eo vniat cum aquosis oleosas partes, mo-  
 tum

tum vermicularem sustentet, mucī intestinalis viscedinem minuat, ne vermiculorum forte ingesta ova excludantur, amarore suo caueat, et, officiis suis rite defuncta, cum foecibus, quas tingit, eliminetur.

X.

*Bericht von den heilsamen Wirkungen der Kinkina oder Peruvianischen Rinde, und von der Nichtigkeit der Vorurtheile, welche das Publicum gegen diese Rinde noch hat, mit einem Anhang von dem innerlichen Gebrauche des Schierlings, Bilfenkrautes und Münchskappen Extractes von IOH. GEORG. SCHENCKBECHER der Weltweisheit Baccalaureus, der Arztneygelahrheit Doctor, Feld - Stabsarzt bey der Armee Ihrer Käyserlichen Majestät aller Reussen. Riega und Mietau. verlegt Johann Friedrich Hartknoch 1769. 8. 174 Seit. mit der Zueignungsschrift.*

i. e.

Relatio de salutaribus effectibus chinae seu corticis Peruuiani, et de leuitate praeiudiciorum, quae homines contra eam formant. Cui accedit tractatus de interno vsu cicutae, hyoscyami et aconiti extracti. Auctore IO. GEORG. SCHENCKBECHER. M. D,

**F**allere se eos, qui corticem Peruuianum pro veneno, quod vitam humanam potius deroget, quam proroget, habeant, tribus in sectionibus Cl. SCHENCKBECHER demonstrat. Ac primum quidem causae ab eo enarrantur, cur cortex, remedium in primis febrium intermittentium, saepenumero



mero noceat: dein plurimi morbi, in quibus cortex optimo cum successu adhibetur, commemorantur; additis nonnullis morborum historiis, a Nostro ope corticis curatorum. Ac denique de ortu, usuque corticis medico, ac eius deprauatione, quae omnia salutari huius corticis effectui officiant, differitur.

Incommoda, quae usum corticis interdum sequuntur in febribus intermittentibus, non cadunt in corticem bonum, sed in eius, vel abusum, vel deprauationem, vel in ipsam febriuni intermittentium indolem. Hoc demonstrat Cl. Auctor exemplis aliorum Auctorum partim, partim suis. Obseruauit nimirum anno quinquagesimo nono huius seculi, febrem intermittentem cum lethargo in stadio horroris simul cum anhelosa respiratione: porro tertianam epidemicam cum oedemate faciei et pedum, facile atque iterato reuertentem, quae aegros valde debilitaret, ac potissimum vias, digestionem inferuientes, et cui cachexiae obstructions ac morbi neruosi succederent. Haec symptomata omnia cortici a nonnullis tribuuntur; Noster vero ex natura huius febris ea explicat. p. 23.

Tum corticem, si cum ea, qua decet, circumspeditione adhibetur, non solum febres intermittentes, sed et multos alios morbos internos aequae, ac externos iuuare a Nostro probatur. In febribus putridis quippe, in gangraena atque sphacelo aliisque. Atque hic inferitur obseruatio de sphacelo scroto, de spina ventosa ossis zygomatici, de febribus putridis intestinalibus, de fluore albo lacteo, de sphacelo membri virilis. Quae omnia cum a nobis repeti nequeant, exempli loco eam obseruationem, quae de spina ventosa ossis zygomatici agit, elegimus. p. 59.

p. 72.

Vir triginta et trium annorum, ad scorbutum procliuis, lue venerea aliquoties inquinatus, nec unquam radicaliter ab ea liberatus, quoniam, loco salivationis, colicam et dysenteriam mercurius excitabat, per quatuor annos palliative tantum est curatus. Interea autem semper propemodum passus est aeger cephalalgiam, quae subinde cum defectu virium, febreque lenta augebatur. His accedebat vlcus fistulosum menti, uti Noster suspicabatur, cum carie, quod diu quidem tractatum, tandem tamen, profunda relicta cicatrice, coaluit. Symptomatibus autem, quae supra enarrauimus, auctis, aeger demum ad Cl. Auctorem accedebat. Tabem iam emaciatus et tussi continua humida, cum copioso, flauo ac insigniter foetente sputo, et laesa respiratione vexatus, potissimum conquerebatur noctu de pertinaci capitis dolore, et inde pendentibus insomniis. Gena dextra erat rubra et tumebat, absque signis tamen inflammationis: leniter pressa gena, dolorem lancinantem internum percipiebat aeger, qui quoque, sine pressione externa, plus minusue aderat. Lenioribus bechicis aliisque medicamentis plane propemodum frustra adhibitis a Nostro, aliam medendi methodum hic esse eligendam censebat. Atque cum Cl. Auctor omnia symptomata, huic aegro communia, a coniunctione scorbuti cum inueterata lue venerea in eius humoribus proficisci arbitraretur, et, ob dolorem permanentem in gena, spinam ventosam ossis zygomatici suspicaretur, ob summam aegri imbecillitatem, de depurandis fluidis ac roborandis solidis praecipue cogitabat, ut, chylicatione ac sanguificatione correctis, viribusque inde recuperatis, rite posset saluatio in hoc aegro excitari. Atque hoc praestitit quoque Cl. Auctor sero lactis cum aqua calcis, et, succis plantarum expressis, ab aegro recusatis, et a

No-



Nostro sepositis, quoniam symptomata peiora reddebantur, cortice Peruviano, cuius quatuor libras intra decem hebdomadas deglutiuit aeger, ita, vt symptomata imminuerentur, aegerque sese bene haberet. Interea sub osse iugali paruulum foramen deprehendebatur, ex quo pus tenue emanabat. Quo dilatato, vlcus fistulosum versus orbitam in conspectum veniebat, cui aliud versus aurem accedebat. His externe ex chirurgiae legibus tractatis, nec vlla sanationis per sola externa remedia spe relicta, recuperatisque tum temporis aegri viribus, saluatio tanto cum successu in hoc aegro est excitata, vt vlcera sanata, et aegrum omnino sanitati penitus restitutum, maxima cum voluptate Cl. Auctor videret.

In tertia tandem sectione disseritur de corticis p. 115.  
Peruviani ortu, vsu medico, variis eius deprauationis modis, notis bonitatis, ac forma, qua ille optime aegris propinari potest. Quod ad formam attinet, optima Nostro videtur in puluere, vel cum aqua, vel syrupo, aut adhuc melius cum mucilagimbus, e. c. tragacanthae, in electuario. Recepit inde Cl. Auctor extractum corticis Peruviani, illudque per mucilaginem tragacanthae in electuarii formam redegit. Ceterum non reiicit choccoladam, ex cortice paratam.

Sed veniamus iam ad tentamina, Stoeckerianis p. 144.  
nonnullis cum remediis a Nostro instituta, quae huic tractationi sunt annexa, simul cum indice Auctorum, quibus Noster in hoc libro conscribendo vsus est. Ac primum quidem concernit extracti cicutae vsum in glandulis induratis. Multis in et externis remediis frustra adhibitis, vncia vna et dimidia solius huius extracti deglutita, lenes dolores  
cum

cum pruritu in his glandulis persentiscebantur, et earum induratio subinde cessabat.

p. 146. Tentamen cum eodem extracto in testiculo indurato sinistro. Febre tertiana superata, de testiculo conquerebatur aeger. In hanc rem cum Noster inquireret, nec vlla venerei miasmatis signa, ne suspicio quidem, adessent, arbitratus est, hoc ex metastasi materiei morbosae relictæ esse profectum; praesertim, cum alio tempore eidem aegro, eademque in parte, aequè similem post febrem fugatam, idem accideret. Variis in auxilium a Nostro vocatis remediis, minime efficacibus, cicutae extractum et huic aegro propinabatur. Primis diebus nihil inter eius usum aeger sentiebat. Sexto vero et septimo die, dolorem in testiculo animaduvertebat, acus puncturae similem. Ab hoc tempore tumor subinde ita decrescebat, ut die vigesimo decembris nihil morborum spectaretur. A primo itaque septembris ad vigesimum decembris diem quinque propemodum uncias extracti cicutae deglutiuit. Interea octies laxante, decocto bardanae, et externe emplastro de meliloto, Cl. Auctor usus est, et aeger semper sese bene habuit.

p. 153. Tentamen de cicutae extracto in tumefactis atque induratis glandulis aurium et maxillae, quae quoque post febrem intermittentem remanserant. Hoc extracto propinato, et hic aeger sanitati restituebatur. Sumsit, a sexto die augusti ad undecimum septembris, unciam vnam et dimidiam fere. Praeterea quater laxauit, decocta radice petroselini potavit, nec vllum doloris sensum in glandulis percepit.

p. 156. Tentamen cum aconiti napelli extracto in pertinaci febre intermittente. Per annum, et quod excurrit, aeger laborabat febre intermittente tertiana irregulari, quae per octo dies interdum cessabat. Tum in quartanam transibat. Per quinque hebdoma-



domadas huius febris quartanae, a datis medicamentis, nulla animaduersa mutatione, aconiti extracti, cum saccharo commixti, in aequalibus partibus usum Noster suadebat, ita, ut ab vno grano extracti inciperetur, et dein dosis subinde quotidie augeretur. Duodecimo curationis cum hoc extracto die paroxysmi leuiores reddebantur, nec adeo diu durabant, ac die vicesimo febris penitus cessabat. Per quatuor dies adhuc cum hoc extracto continuato, febreque non reuertente, curatio est finita, et aeger omnimode sanatus. Accepit hic aeger quadraginta grana vna vice, ac omnino drachmas sex et duo grana, cum totidem sacchari. Ad quintum diem usque vomebat, atque ita copiose et vehementer, ut per aliquod tempus lipothymiam pateretur. Sexto die desinebant vomitus, et hoc aequè, ac reliquis curationis diebus, bis terue aluus deponebatur.

Tentamen de extracto aconiti in arthritide p. 159.  
nodosa. Multis, humores depurantibus, in et externis remediis, sine fructu datis, extractum aconiti ita propinabatur aegro, extremitatum usu prorsus destituto, et lectulo continuo affixo, ut ab vno grano ad viginti et tria quotidie augeretur dosis. Interea potabat decoctum hordeaceum, et vescebatur hordeo et auena excorticata, et fructibus horaeis. In prima hebdomade huius curationes iam lectulum reliquit, et in tertia, baculo insistens, poterat aeger incedere. Febre, doloribus, et tumoribus tum cessantibus, extracti usum interdicebat Cl. Auctor, et reliquam adhuc immobilitatem quamdam genu, fotu ex aqua simplici et vnguento de althaea sanabat. Deglutiuit itaque per tres hebdomadas vnciam dimidiam, vnam drachmam, et nouem grana, sine saccharo, ac sine illis effectibus, quos in antecedente obser-

obſervatione commemorauimus. Nihilominus tamen aeger ſanitati prorſus traditus eſt.

p. 162. Tentamen de hyoſcyamo in vertigine, qua laborabat monachus, annorum ſexaginta, per viginti annos poſt plicam Polonicam curatam relicta. Extracti hyoſcyami folius, primum vno, dein ſubinde pluribus granis per duodecim dies ſumtis, bonum iam vidit Noſter effectum. Quo per quinque hebdomadas continuato, aeger penitus conualuit. Aſſumſit vnciam propemodum vnam huius extracti, nec debilitatem, nec nauſeam, neque alias moleſtias inde percepit, et duobus fere annis poſtadhuc bene ſeſe habuit.

# XI.

Lettre de M. DEROME' DELISLE à M. BERTRAND. Sur les polypes d' eau-douce. A Paris, chez Lacombe libraire. 1766. 8. pagg. 57.

h. e.

Cl. DEROME' DELISLE epiſtola ad Cl. BERTRAND de polypis aquarum dulcium.

Coniectura Cl. Auctoris haec eſt : grana iſta minora, quibus omnem externam pariter, atque internam ſuperficiem polyporum obſitam deprehendimus, non ſunt partes, ad vitam polypi neceſſario requiſitae; ſed ipſa animalcula, quae corpus polypi inhabitant, adeo, vt id, quod hucusque animal habitum ſit, non, niſi vaginam quaſi ac domicilium immenſae gentis animalculorum ſiſtat. Et hoc quidem de polypis aquarum dulcium certiffime adfirmat; quamquam, vt verum fateamur, nullis experimentis conuiſtus, ſed ſolummodo ratiociniis  
ad



ad eam sententiam deductus ; eandem tamen marinorum quoque polyporum rationem ac conditionem esse suspicatur. Diuersam praeterea hanc suam sententiam esse ab illa declarat, quam anonymus quidam in epistola ad Cl. L E C A T diarii gallici, quod *Mercur de France* dicitur, mensi ianuario 1749 inserta, proposuerat : polypos nempe sistere seriem animalculorum minorum, catenae ad instar sibi inuicem adhaerentium. Et ex ista sua hypothese plurima ex iis phaenomenis, quae in polypis tantam admirationem excitant, et nonnulla quidem eorum satis congrue explicat, v. c. propensionem ad lucis adspectum, digestionem multiplicationem cet. num vero omnibus phaenomenis declarandis eadem hypothesis sufficiat, penes alios iudicium esto, praesertim cum, posteaquam epistola haec in publicum prodiit, experimenta in limacibus capta, quantum nos quidem iudicare possumus, historiae multiplicationis polyporum haud parum lucis accendisse videantur. Quousque vero coniectura haec Cl. Auctoris veritati respondeat, experimenta, a scrutatoribus naturae instituenda, edocébunt, quorum solertiae hanc rem vna cum ipso vehementissime commendatam cupimus.

---

*Nouvelle méthode facile et curieuse pour connoître le pouls par les notes de la musique, par feu M. F. N. MARQUET. Seconde édition augmentée etc. par M. PIERRE IOSEPH BUCHOZ. à Amsterdam et se trouve à Paris, chez P. Fr. Didot. Quai des Augustins, à St. Augustin. MDCCLXIX. 12mo plag. 9. cum dedic. et praef. tab. aen. 6.*

h. e.

**Pulsus per characteres musicos cognoscendi ratio noua facilis, et ingeniosa. Auctore Cl. MARQUET, denuo edita et aucta a Cl. BUCHOZ.**

**P**ulsum ad musicos numeros reuocari posse inter veteres medicos HEROPHILUS, inter recentiores varii censuerunt, nullus vero ante Cl. MARQUETUM characteribus exprimere ausus est. Praestitit hoc libro, anno 1747 edito : cuius tamen exemplarium numero distributo, nouam editionem curauit Cl. Auctoris gener, adiectis, praeter vitam Illius, variorum de conamine isto iudiciis, aduersis non minus, quam benignis, et dissertationibus duabus ab editore confectis, quarum altera ad pulsum dignoscendum, altera ad melancholiam curandam musicam plurimum valere, ostenditur.

Ac primum quidem in Cl. MARQUETI opusculo, quid pulsus et unde, quamque varius sit, definitur. Traduntur deinde regulae, quas seruare oportet pulsus examinaturum. Denique, quibus notulis varia pulsum genera exprimi et significari possint, et oratione docetur, et tabulis aeneis ipsius Aucto-



Auctoris manu elaboratis, vltcrius dilucidatur. Pulsus nimirum vel naturalis est, sexagesies circiter p. 30. in adultis intra minutum horae primum micans, aequali robore et celeritate; vel a naturali recedit ratione fortitudinis, velocitatis aequalitatisque ictuum. Quum vero, quando in examine pulsus naturalis eiusmodi modorum flexionem, quam vulgo *Mennet* dicunt, cuiusque formulam praescripsit Noster, vel mente modulemur, vel canamus voce fidibusue, singuli ictus singulis numeris aut rythmis (*cadences*) respondere obseruentur: hanc modulationem ceu communem proponit mensuram, exprimitque pulsum naturalem per notam nigram (integri motus musici quadrantem), inter duas lineas parallelas post quemlibet rythmum positam. Magnum refert nota alba, integri motus musici dimidia pars; paruum siue vacuum, vncinata seu octaua, vermicularem bis vncinata seu sextadecima. Nota supra lineam primam, inferiorem nempe, prominens, pulsum depressum (*concentré*); inferiori inhaerens, profundum; in altera linea, superiori scilicet, posita eleuatum, eminens supra eandem superficialem indicat. Quilibet rythmus lineolis verticalibus in quinque spatia diuisus est, quibus tempuscula, quae inter binos quosque ictus pulsus naturalis distingui possunt, denotantur. Celerior pulsus, febrilis, pro vario velocitatis gradu haec quinque tempuscula non seruat, sed iam quarto, vel tertio, vel secundo, vel primo quouis micat. Lentus e contrario ad minimum sex eiusmodi tempuscula habet. Inaequaliter celer autem nullum ordinem obseruat. Reliqua pulsum compositorum genera, vt sunt intermittentium variae species, caprizans, conuulsivus et dicrotus peculiaribus schematis exhibentur. Dicrotum ceteroquin seu duplicatum indicat nota integra. Ex quibus quidem haecenus enarratis

Sec. Dec. Suppl. II. S patet,

pātet, et lectorem huius tractatus, et illum, qui hac ratione pulsum velit disquirere, imbutum esse debere artis musicae principiis.

p. 96.

Adiecta Cl. BUCHOZ dissertatione, musicis mensuris pulsum utique cognosci posse, ulterius confirmatur; altera vero melancholiae mederi docetur, illi, in qua fibrae siccae sunt, per musicos numeros, qui ordiuntur a tonis grauiissimis, sensimque in acutiores eleuantur; illi vero, in qua fibrae laxae humidaeque nimis occurrunt, per concentus fortes, viuidos, laetos atque variatos.

### XIII.

Cautiones nonnullae, ad liquoris mercurialis Plenckiani usum spectantes, quas Praeside PETRO IMMANUELE HARTMANNO Med. Doct. et P. P. O. doctoris medici honores legitime capeffurus publice defendit *Christianus Iacobus Sommer*, Francof. ad Viadrum 1769. pagg. 38.

**S**olutio haec gummosa mercurii, a Cl. PLENCKIO \*) nuper inuenta, cum Cl. HARTMANNO ob compositionis simplicitatem, quae cernitur in gummi arabico, remedio blandissimo mitissimoque, acido rodente libero, et mercurio viuo, magnopere placuerit, non potuit non ipse experimentis cognoscere, quam firma esset huius remedii in debellanda lue venerea efficacia. Atque haec a Cl. Auctore nobiscum hic communicantur cum nonnullis cautionibus, partim modum huius medicamenti praeparandi, partim methodum eo vtendi concernentibus, in venereis aequae, ac aliis morbis.

p. 6.

Ac primum quidem definitionem Cl. Auctoris videamus huius solutionis mercurii gummosae. Est  
nimi-

\*) v. comm. nostr. Vol. XIV, p. 263. it, Vol. XVIII. p. 34.



nimirum liquor hic congeries minutissimarum molecularum mercurialium simplicium, parca aquae copia tenuique gummi arabici cortice obductarum, et ita temperatarum, vt cum maiori aquae aut liquorum diuersorum aquosorum mole cohaerere possint. Quaecunque enim praeterea addi solent, syrapi, balsama aliaque, gratiae medicamenti quidem seruiunt, efficaciam tamen non mutant.

Tum Cl. Auctor ad modum praeparandi progreditur, et PLENCKII atque HERTZOGII \*) qui emendatam Berolinensium methodum parandi huius medicamenti tradidit, inter se comparat, suasque cautiones addit. Obseruauit enim Noster aequae, vti medici Berolinenses, sedimentum griseum huius medicamenti, quod, quiete accedente, a fluido s. aqua sese separet, agere in saliales, et liquorem supernatantem in vrinarias vias. Quapropter eo cautius, vti et PLENCKIUS ipse vrget, in praeparatione eius medicamenti versatur. Ac primum quidem mortario lapideo praefert vitreum, ob accuratiorem mercurialium globulorum separationem ac diuisionem. Dein gummi arabicum purum seligit, et maiorem eius partem, quam Cl. PLENCKIUS, sumit.

Id quod et suadent medici Berolinenses, quorum p. 12. formula haec est: \*\*) recipe mercurii viui depuratissimi drachmas duas, gummi Arabici vnciam vnam, conterantur in mortario lapideo affusa subinde rosacea aqua; tum omnis mercurius abibit in mucum: dein, inter terendum, addantur aquae rosaceae vnciae sedecim. Cl. HARTMANN vero aquam puram vel aquam destillatam gratiores, quam rosarum, quae non raro taedium creat, commendat.

S 2

Porro

\*) v. diss. inaug. de morbo articulari, speciatim venereo, praesertim de arthritica quadam feliciter curata. Helmstad. 1769. 4.

\*\*) v. HERTZOG, diss. iam laudat. p. 48.

p. 15. Porro Cl. Auctor ad medicamenta, quae Cl. **PLENCKIVS** huic liquori addidit venit. Sunt nimirum syrupus kermesinus, balsamus de copaiba et syrupus violarum. Quamquam Cl. **HARTMANNVS** lubenter largitur, posse syropos huic liquori addi non solum ob gratiam, sed et ob auctam hydrargyri cum gummoso liquore coniunctionem, praetereaque syrupo kermesino adscribi diureticam vim, quippe qua mercurius ad has vias possit dirigi; tamen non semper iis syropis opus esse putat, ac potissimum, si diutius adseruetur hic liquor loco non moderate frigido, Noster acidi evolutionem timet. Forte et medici Berolinenses hanc ipsam ob causam syropos non addiderunt.

p. 19. Longe autem insigniorem usum tribuit Noster balsamo de copaiua, cui Cl. **HARTMANNVS** balsamum Peruvianum nigrum substituit, ob virtutem in vasa renalia ac omnino viscera vropea, ad derivandas mercurii moleculas, in corpore vbique dissipatas, ad has vias.

p. 20. Pilulas mercuriales, a Cl. **PLENCKIO** inuentas, Noster non laudat, iisque potius electuarium, quod ex syrupo mercuriali, addito pulvere liquiritiae et conserua quadam paratur, praefert.

p. 23. His cautionibus adhibitis, hanc Plenckianam solutionem mercurialem gummosam inter praestantissima Cl. **HARTMANNVS** numerat, idque exemplis probat. Quae quidem antequam videamus, Nostri methodum huius solutionis praeparandae praemittamus. Sumtis hydrargyri purissimi et purissimi drachmis duabus et gummi Arabici, in pollinem redacti, vncia vna, haec inter se probe terantur ac misceantur, adpersa subinde aqua vel simplici, vel destillata in mortario vitreo. Dein eximatur haec massa ex mortario, et, marmori porphyri-



phyritae imposita, per horam teratur, et quaedam pulueris gummi Arabici pars inter terendum denuo addatur: ac tum, si tempestatis minus calida indoles fert, aquae loco syrupi tantillum admisceatur. Iam huic massae, accurate tritae, in mortario vitreo affundantur duodecim vnciae aquae destillatae gratioris inter terendum successiue, donec liquor perfecte leucophaeus apparuerit: ac, si lubet, syrupi vncia dimidia, adhibita tamen circumspectione, vti supra monuimus, admisceatur. Quod si vero acciderit vt sedimentum subcinereum grauius appareret, liquor caute est decantandus, et sedimentum denuo in mortario vitreo, adiecta aliqua gummi Arabici parte et adsperfa aqua ita, vti supra expositum est, terendum, et duabus tribusue vnciis aquae temperandum et priori liquori decantato affundendum. Atque ita grauius hoc sedimentum non apparebit, nec ptyalismus, medicamento ita praeparato, excitabitur.

Inter vsum huius medicamenti haec habeto : p. 24.  
cochlearia metallica et semimetallica prorsus reijcit  
Cl. HARTMANNVS et vasa vitrea, vel lignea, vel murrhina suadet, ob noxam ex coniunctione mercurii cum metallis metuendam. Quod porro dietam regimenque attinet, acida potissimum interdicit, (vidit enim Noster ab acidis magna incommoda inter vsum huius remedii oboriri) regimen suadet temperatum. Ex nimis frigido enim Cl. CARTHEVSERVS diabetem ortam esse vidit, et Cl. Auctor alia incommoda timet. E contrario e nimis calido regimine, parum frigidi aeris si accedat, nascuntur rheumatici et arthritici dolores.

Quapropter animaduertit quoque Noster, eos, p. 27.  
qui arthritide aut scabie venerea laborent, paullo calidius regimen inter vsum huius remedii tulisse.

Porro et decocta sunt iungenda, vbi Noster hordeacea, auenacea, aut etiam panis SYDENHAMI praefert reliquis. Eadem cura diaetae aequae ac regiminis etiam per aliquot tempus, curatione finita, opus est. Caeterum autem vsus aquae Selteranae, quem solent nonnulli medici post vsum huius remedii commendare, Nostro non arridet, ob dolores cardialgicos atque colicos, nec non diarrhoeas, inde oriunda.

p. 30. Praemissis rebus nonnullis, iustam huius PLECKIANI remedii dosin ac copiam, nec non indolem aegrorum, eo vtentium remedio, concernentibus, ad vltimam cautionem progreditur, quae Cl. Auctoris sinceritatem prodit, et nobis summam mereri attentionem videtur. Hac ipsa nimirum medendi ratione Cl. HARTMANNVS centum circiter et viginti syphilliticorum aegrotorum habuit curam, ac vidit saepenumero vlcera carcinomatica, rhagades, tubercula, condylomata, scabiem glandularum, scirrhos, tophos ac gummata, aliaque quam celerrime curata fuisse: ac quidem, etiamsi vel diaphoresis vel ptyalismus excitata sint, semper tamen diuresin auctam Noster obseruauit. Id quod Cl. Auctor celeri coniunctioni huius remedii cum nostris humoribus, in primis sero aequae, ac gummi Arabico ipso, ad vias vrinarias tendenti, tribuit. Atque ideo forte accidere arbitratur Noster, vt, crudioribus venereis impuritatibus eliminatis, et subtilioribus adhuc in corpore delitescantibus, symptomata quidem celeriter cessent, attamen per aliquot tempus redeant.

p. 35. Obseruauit nimirum Noster in his aegris, apparenter sanis, seruata quoque ipsa accuratiore diaeta, post longius breuiusque interuallum, luis venereae, leuiori quamquam impetu et per vnam alteramque huius liquoris portionem facile debellatae, reditum, atque hoc bis, ter, quinquies immo  
in



in quibusdam septies euenisse vidit. Inde factum est, vt nonnulli per annum duas mercurii vncias haurirent. In iis vero, qui nullo alio, quam Plenckiano remedio vsi sunt, nunquam iterum apparebant luis venereae symptomata si Cl. Auctor, absoluta Plenckiana methodo, iis has pilulas exhibebat per quatuordecim dies, ac quidem vesperi sex per diem : recipe extracti scordii, succi liquiritiae Hispanici ana drachmam dimidiam; mercurii dulcis grana quindecim; sulphuris antimonii aurati tertiae praecipitationis grana septem : misce, fiant pilulae ad pondus grani vnus.

Quod ad hunc luis regressum attinet, eum in aegris, P. 37. aliorum medicorum curae commissis, quoque expertus est, vt in Iudaeo, a Cl. TRALLELIO curato, et aliis, Berolini curatis hac methodo Plenckiana : nec non in infantibus, vbi suspicio nouae infectionis nulla deprehendebatur. Sufficiant itaque haec ad cautionem, a Cl. Auctore adhibitam, summo opere laudandam, quae eo redit, vt ii aegri, curatione absoluta, non dimittantur sine admonitione, regimen et dietam pariter, ac regressum morbi attingente; sed accurate attendantur, dietaque strictissima ab iis, et valetudine recuperata, diu obseruetur.

Denique et aliis morbis hic liquor Plenckianus P. 37. profuit e. gr. rachitidi pueri, quinque annorum, nec non glandulis mesaraicis infantum obstructis; porro cancro superioris labii aperto, qui in Berolinensi nosodochio *charitatis* hoc Plenckiano sanatus est remedio, excitato inde ptyalismo. Hic quoque commemorat Noster fungum articulorum, a Cl. CARTHEUSERO ope huius remedii sanatum. In spina autem ventosa spem elusit Plenckianus liquor.

XIV.

*Abhandlungen der Churfürstlich-Bayerischen Academie der Wissenschaften. Erster Band. München, mit academischen Schriften. 1763. 4. Seit. 514. Zweyter Band. 1764. Seit. 507. Dritter Band. 1765. 4. Seit. 527. Vierter Band. 1767. 4. Seit. 538. Fünfter Band. 1768. 4. Seit. 464. Sechster Band. 1769. 4. Seit. 334. Ohne Vorreden und Registern, mit Kupfern.*

i. e.

Commentarii Academiae scientiarum Electoralis Bauaricae. Vol. I. II. III. IV. V. VI.

**I**am dudum legimus varios, a societate Academiae Bauaricae \*) ad omnem eruditionem spectantes editos commentarios; quos vero, cum maximam partem ad historiam et philosophiam pertineant, nondum indicauimus: nunc vero, relictis omnibus reliquis, eos, qui ad finem alterius partis cuiuslibet voluminis reperiuntur, ad medicinam et historiam naturalem, praecipue mineralogiam pertinentes, cum Lectoribus nostris communicare constituimus.

Vol. I. 1) Primus, qui nobis in parte altera voluminis P. II. primi occurrit, commentarius agit *de paludibus*, p. 127. Auctore Cl. ILDEPHONE KENNEDY, qui Academiae a litteris est \*\*). In quo pertractando sibi id potissimum proposuit Cl. Auctor, vt ostenderet, quomodo paludes, quae in Bauaria admodum sunt frequentes, facillime et sine magnis sumptibus ita muta-

\*) v. comm. nostr. Vol. VII. p. 721.

\*\*) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 174.



mutari possent, vt agriculturae atque incremento  
graminis aptae redderentur. Quapropter, definitio-  
ne, diuersitate, origine, variisque earum mutationi-  
bus allatis, quae iis natura sit, explicare aggreditur.  
Partes, quae materiam paludum constituent, dupli- p. 132.  
ces esse, et proprias, et accidentales asserit: qua-  
rum priores sint terra, eaque vel simplex, vel com-  
posita; fabulum, filex, et lapides omnis generis:  
posteriores, aqua, sal, metalla, aliaque mineralia,  
quae aquae immixta esse soleant. Harum partium  
omnium naturam, atque effecta, quae ex varia ea-  
rundem proportionem ad incrementum vegetabilium  
vel commoda, vel incommoda redundant, expen-  
dit. Ita ex terris simplicibus, humum proprie sic p. 133.  
dictam, coloris subnigri, mollem, non nimis  
leuem, neque nimis frigidam, vegetationi optime  
conuenire putat: argillam, cuius plura sint genera,  
flauam vel nigram caeteris praestare; nullam vero,  
nisi arte iuuetur, incremento plantarum prodesse:  
margam denique solam agriculturae non omnino  
conuenire, id quod etiam valeat de fabulo, lapidi-  
bus et filice, nisi iisdem satis magna terrae copia  
admisceatur. Aquam, quamquam eius terreae et p. 135.  
salinae partes ad nutriendas plantas summe sint ne-  
cessariae, nimia tamen in copia iisdem maxime ob-  
esse. Ex salibus sal commune et nitrum: ex me- p. 137.  
tallis ferrum: ex mineris sulphur et vitriolum, prae-  
cipue in paludibus reperiri: quorum moderata co-  
pia egregie plantarum adiuuet culturam; vitriolum  
tamen hic, cum admodum parce inueniatur, vix  
mereri attentionem. Ex his partibus, inter se mix- p. 140.  
tis, varias enasci materias, quarum notatu dignif-  
sima et singularis turfa sit, quae ex sulphure variis-  
que salibus constans, si comburatur, colendis agris  
maxime profit.

- p. 141. His ita propositis, maximam curam in corrigendis paludibus eam esse debere confirmat Cl. Auctor, ut aqua inde deriuetur, atque, ne eadem redeat, impediatur. Quam rem exemplis, argumentis et praeceptis illustrat. Inclinationem aquae a plano horizontali esse quaerendam (*libelliren*) praecipit, cuius rei ratio ex figura, in tabula aenea addita, apparet: quo deinde aqua ad partem inclinantem deriuetur, quod fiat, si ea, quae, quo minus
- p. 144. aqua defluat, impedian, remoueantur. Facillime rem succedere confirmat, fossis per paludes ita ductis, ut omnis superflua aqua detrahatur. Quo plus aquae, vel argillae, vel margae paludi insit, et quo magis horizontalis eiusdem sit situs, eo plures fossas esse fodiendas: quas etiam ita dirigi oporteat, ut semper, quam plurimum fieri queat, procliues et rectae sint, atque, si scaturigini cuidam vehementi obueniant, ad angulum acutum cum eadem coniunctae ducantur: fossaeque transuersae, praesertim si scaturigines in paludibus sint, quantum fieri possit, euitentur. Altitudinem fossarum illi paludum respondere debere, latam fossam angustae praeferendam, atque accliuitatem laterum ex altitudine latitudineque esse definiendam. Quae
- p. 149. omnia in tabula addita figuris illustrantur. Praeterea ad tempus anni maxime respici iubet, ut, quam primum fieri poterit, fossae aperiantur, sicque per aestatem aqua defluat, quo etiam per sequentem hyemem exsiccatio succedat, quam igniculi subterranei et frigus ipsum iuuent. Quae denique ad correctionem soli paludum, ita exsiccatarum, pertineant, iam exponit Noster, atque cum ex varia indole terrae variis usibus adhiberi debeant, ut vel pastui pecorum, vel pratis, vel agris conficiendis adaptentur, regulas tradit: ex quibus praecipuas, ad correctionem terrarum agriculturae aptandarum
- spectan-



spectantes, afferamus. Terra argillofa, vel fimo, p. 155.  
vel melius fabulo commiscetur ; fabulofa optime,  
marga addita, corrigitur ; turfosa conburenda est,  
atque deinde vel argilla, vel marga, praecipue au-  
tem fabulo, immutanda.

2) Qui fequitur commentarius continet *hifto-* p. 161.  
*riam turfae, in qua fumum, qui ex igne eiusdem oria-*  
*tur, fanitati non nocere oflenditur.* Auctore IOAN-  
NE ANTONIO DE WOLTER, Confil. Elect. et  
Protomedico. Duo potiffimum probare aggredi- p. 162.  
tur. Et primo quidem turfam vegetabile effe, et  
ex viridibus crescentibusque paludofis cespitibus  
componi, id quod defillatione, ad modum  
DEGNERI \*) inftituta, patefiat, qua eadem  
fe obtinuiſſe affirmat, quae defillatione ligni  
querni defillent, producta. Deinde conten- p. 164.  
dit fumum, qui combuftione eiusdem concitetur,  
fanitati non omnino obefſe, vt potius eius vſus rei  
familiari quam maxime proſit. Qua in re ad  
SCHOOCKIUM \*\*) DEGNERVM, et HOFFMAN-  
NVM \*\*\*), aliosque prouocat, qui demonſtraſſent,  
turfam cum lithanthracibus conuenire, neque eſſe,  
niſi bituminofum cespitem: ideoque fumum eius  
non magis nocere, quam fumus, qui ex quolibet  
alio ligno naſcatur, laedat. Illuſtrationis cauſſa re-  
giones, praecipue Belgium, commemorat, vbi ma-  
gna in copia, ligni inſtar, turfa comburitur.

3) Hunc excipit commentarius CAROLI AU- p. 169.  
GUSTI SCHEIDTII, *ſiſtens tentamen methodi*  
*practicae, qua ſtrata lithanthracum in montibus*  
*eorum*

\*) V. IOH. HARTMANN DEGNERS *neu entdeckte*  
*Goldgrube Deutschlands.* Leipzig. 1731.

\*\*) V. EIVSD. tractatus de Turfis, 1758.

\*\*\*) cf. EIVSD. ſcriptor diaeteticorum T. V.

*eorum facile inueniantur, atque recte excolantur.* Cum, praeter Cl. LEHMANNVM \*), et FRIEWALDVM, \*\*) quorum alter modum lithanthraces inueniendi, alter culturam eorum exposuit, ex recentioribus nemo hanc ipsam rem pertractauerit, neque illi Cll. viri eandem plane exhauserint, Cl. Auctor, cum eorum vestigiis insisteret, atque, quae deessent, proprio studio saepeque repetita experientia adderet, hanc exarauit tractationem. Quam quidem in sex diuisit capita; quorum prius utilitatem lithanthracum, causasque, quae, iis magis ligni loco uti, suadeant, exponit; alterum naturam montium lithanthracum, eorumque situm tradit; tertium, quo modo strata lithanthracum lapideis parietibus (*Steinwände*) varie diuellantur atque in venis suis mutantur, docet; quartum exhibet regulas montes lithanthracum, eorumque strata in telluris superficie explorandi; quintum agit de iusta cultura et exploratione stratorum lithanthracum in ipsis fodinis; sextum denique remedia, quae vaporibus lithanthracum occurrant, proponit. Breuitati studentes, quaedam tantum notatu nobis dignissima visa excerptamus.

P. 174. Nominat Cl. Auctor lithanthraces, corpus solo paludoso natum, quod lapidi fossili simile, atque ex humore aqueo, spiritu sulphuris acri, duplici bitumine, et sale acido commixtum reperitur. Ex his sequi putat, eos inflammari posse; atque, cum ligni copia in quibusdam regionibus, praesertim iis, quae carbonum fossilium copia abundant, imminuatur, et illi maiorem, quam quidem ipsum lignum, efficiant calorem, commodis hominum admodum inferuire. Vapores adeo non nocere, ut etiam

\*) V. EIVSD. liber cui titulus est *Geschichte der Flötzgebürge*.

\*\*) V. Acta Academ. Holmienst. T. I. seq. ubi historia lithanthracum auct. EOD. continetur.



etiam puritati aeris prodesse videantur. Praeterea in ipsa cultura lithanthracum multa incognito, mineralogiae fauentia, commoda enasci posse. Quaedam, quae, quominus colantur, impedire videantur, incommoda non tanti habenda esse, quae ab eorum exploratione homines detineant. De ratione eos p. 177. in usum adhibendi monet, cauendum esse, ne recentes et madidi lithanthraces candentibus subito imponantur, sed sensim esse admouendos. In promontoriis, quae in planitiem subinde abeant, atque, ubi strata terrea, sabulosa, et lapidis fossilis reperiuntur, lithanthraces plerumque inueniri ostendit. Loca deinde horum montium singula indicat, atque stratorum terreorum cet. cum lithanthracum stratis veram situs rationem, et quasdam ab eo aberrationes ostendit, atque iconibus illustrat: naturamque lithanthracum ipsorum variam esse ostendit.

In ipsa stratorum lithanthracum perscrutatione p. 195. subterranea, ad inclinationem eorum attendi iubet, atque operam dari, ut cuniculus in *pendente*, quod cum strato angulum obtusum formet (*im Hangenden*) ad stratum usque ducatur, et, si aer deficiat, putei effodiantur; sin, quo minus id fiat, locorum ratio impediatur, varias affert rationes, quibus, quod quaeritur, obtineatur. In ipsa ratione tractandi et colendi duplicia ponit strata, vel *sensim sese inclinantia*, vel prope *verticalia*. In prioribus videndum, ut *cuniculo* applicato tractari queant; sin id minus fieri possit, *puteo* ad stratum penetrandum esse, atque tum communi modo tractandum. Posteriora tractatu difficiliora esse, cum non in vna serie procedant, sed lapidibus aliisque modis disiungantur. Quare regulas, quibus rursus inueniantur, tradit. Vaporum duplex genus esse docet, alterum ab exhalatione fossorum, lampadum, et humidita-

ditatis natum; alterum a sulphureis, oleosis, venenatis, et rodentibus substantiis ortum, quod in fodinis lithanthracum saepius obuenerat. Priores non adeo nocere, posteriores subito vita homines privare. His occurrendum directione fodinarum ea, qua liber accedat aer: quo praestito, varia fossoribus usitata auxilia, ipsiusque TRIEWALDI remedium, qui furno paruo ignito aerem noxium dispulit, recte et cum successu adhibeantur.

p. 211. 4) Additae denique sunt *icones et historia duorum verorum totidemque falsorum petrificatorum.*

Auctore IACOBO CHRISTIANO SCHAEFERO, Reg. Mai. Danicae Consiliario, cet. Ad spuria petrificata refert lapidem, cui litterae inscriptae esse videbantur, atque zoolithum, qui canis imaginem quodammodo repraesentabat; vera autem, duos carpolithos esse, dicit. Descriptionum ratio ex iconibus est cognoscenda. De causis vero, Cl. Auctorem ad diuisionem hanc mouentibus, notamus:

p. 222. Primum lapidem ideo Ei videri spurium petrificatum, quod litterae non insculptae, sed eminentes fuerint; alteri autem, praeter dissimilitudinem eiusdem cum quopiam animali, propter nimiam paruitatem veram petrificationem non posse tribui. Ortam esse, ex Cl. Auctoris sententia, hanc horum lapidum figurationem ex pluuiis, fabulum ita paulatim lapidibus apponentibus, ut propter varium eorum situm diuersae figurae enascantur. Hanc sententiam probabilem Ei videri, cum, quod in lapidibus vestigia guttarum et varii fluxus inuenerit: tum, quoniam pluviae cadentes in qualibet arena varias figuras forment, quibus forsitan nil, nisi induratio, ad petrificati naturam induendam desit.

p. 229. Vera petrificata cum Cll. WALLERIO et VOGELIO definire, fructum vero in iis contentum legu-



leguminosum, nobis quidem ignoti generis, fuisse rationibus probare.

Ex voluminis secundi parte posteriori sequen- Vol. II.  
tes afferamus commentationes : P. II.

1) *Tentamen geographiae metallurgicae, qua p. 61.*  
*tota tellus tamquam mons stratofus, eius autem montes*  
*ut declinationes totius considerantur, additis, inde de-*  
*riuat, certisque regulis, quae, quomodo in illa venae,*  
*metalla, ac mineralia exquirenda sint, doceant.* Au-  
ctore CAROLO AUGUSTO SCHEIDTIO. Cum  
nullus adhuc, in quo, quae ad metallurgicas disci-  
plinas pertineant, proponatur, liber exstet \*) :  
quarum quaedam quidem iam tractatae; multae ea-  
rum tamen vel parum excultae, vel omnino negle-  
ctae reperiuntur : in praefatione breuem sciagra-  
phiam eiusmodi disciplinarum Cl. Auctor offert.  
Quorsum etiam hanc, quam proponit, geogra-  
phiam referendam esse affirmat. Quae in ea tra-  
ctat, eo redeunt, ut primo de origine telluris agat ;  
deinde superficiem eius consideret, atque in causas,  
quae, diuersam eius faciem efficiant, inquiret ; tum  
interiorem illius structuram, quatenus ea respectu  
stratorum terreorum et lapideorum detecta sit, in-  
dicet ; et denique quasdam exhibeat regulas inue-  
niendi terrea lapideaque strata, eorumque venas et  
extensas et cumulatas, fissurasque, mineralia atque  
metalla. Quae cuncta, cum visum fuerit, iconibus  
in tabula additis, illustrat.

Putat Cl. Auctor in principio, cum omnia in p. 80.  
motu fuerint, terreas partes aquae immixtas fuisse,  
spar-

\*) Quod quidem tum, cum haec scripta esset commen-  
tatio, vere dixit Cl. Auctor ; iam vero proposuit  
IOH. GOTSCH. WALLERIVS in *Elementis Metal-*  
*lurgiae. Holm. 1768. p. 2. v. comm. nostr. Vol. XVI.*  
p. 31.

- sparsimque quasi innataſſe; motu vero hoc deſinente, illas ſeſe attraxiſſe, et demum fundum ita petiſſe, vt grauiores infima loca occuparent, leuiiores autem ſuperficieſi magis propinquae eſſent; quae tamen ſententia nobis continuo terrae motui repugnare, meliusque ex vi, quae dicitur centripeta, explicari videtur.
- p. 84. Ex motu terrae, qui quietem paullo poſt ſecutus ſit, aquam quoque, et aerem atque ignem commota fuiſſe, ex quorum, praecipue aquae, viribus et actione in terram adhuc mollem, montes, variasque in tellure conſpiciendas mutationes nata eſſe confirmat. Praeterea telluris motus huc quoque multa contribuſſe Telluris ſuperficieſi quadruplicem generatim faciem adſcribit, vt vel plana ſit, vel promontoria oſtendat, vel medios, vel denique ſummos montes conſtituat. Internam horum locorum ſtructuram in diuerſis variam eſſe proponit.
- p. 93. In planitie enim terrea atque lapidea ſtrata horizontalia inueniri, ita, vt humum proprie ſic dictam ſequantur limus, arena, argilla et glarea, donec minores ſabuloſos lapides, calcea et gypſea, atque lapidis foſſilis ſtrata excipiant, vbi interdum petrificata varia inueniantur. Praeterea in paludoſis locis ſtrata turfoſa inueniri: metallica raro, nitroſas contra, et vitriolicas, aluminofasque, atque ferrum continentes terras in planitie effodi: in collibus, praeter ſupra commemorata, varias ſilicis ſpecies, quae gemmae dici ſoleant, reperiri: marium lacuumue eandem fere ac continentis faciem videri: ſalinam eorum naturam non tam ex ſcaturiginibus quibusdam, quam potius inde eſſe deriuandam, quod aquae ſalia ex terra quaſi elixiuarint, fontesque ſalinos forſan ex maribus per ſubterraneos ductus natos eſſe.
- p. 95. Promontoria generatim offerre fontes ſalinos, turſam lithanthraces, et varias humi ſabulique ſpecies.

His



His traditis, stratum cupreum, quod praeterea lapidem fossilem contineat (*Kupfer Schieffer Flötz*) describit, variaque metallurgorum nomina explicat, atque, quae corpora in rimis inueniantur, proponit. In mediis montibus, qui metallorum proprii sint, p. 103. sub humo varia lapidum genera reperiri, atque rimas arcuatim descendere, variaque in iis posita esse et lapides, et metalla, terrarum denique strata illos, ut promontoria et planitiem, varia offerre. Cum p. 109. summorum montium interior structura, ob varia impedimenta, non satis cognosci possit, eos et a quadam subterranea vi, et a motu aquarum effectos esse, generatim vero cum caeteris conuenire proponit. Regulas, quas addit, hic commemorare, breuitate impedimur.



2) *Traſtatio de uſu commodisque ſalis communis*, p. 141. tum iis, quae homines et animantia bruta, vegetabiliaque et instituunt, et ſentiunt: tum, quae chymiae, et mechanicae, variisque artiſciis, atque agriculturae, reiſque familiari tribuit. Auctore WOLFGANG THOMAS RAU. Poſtquam rationes, quibus commotus hanc commentationem conſcripſiſſet, atque quas in conſcribenda ea ſecutus eſſet, commemorauit: ipſam traſtationem, quam in quatuor capita partitus eſt, aggreditur. Quorum quidem primum de ſale communi generatim agit, uſumque, quem homines ex eo hauriant, exponit; alterum, quid pecoribus, tertiumque quid vegetantibus conferat commodi, declarant; in quarto denique commoda eiſdem in varias diſciplinās artiſciaque Cl. Auctoꝝ enumerat. Cum, quae in primo capite de variis ſpeciebus ſalis communis, parandique modo, commodis et incommodis eiſdem dicuntur, maximam partem ex aliis auctoꝝ collegerit Noſter, de iis nihil referimus, praeterquam  
*Sec. Dec. Suppl. II.* T quod

- p. 155. quod sal hoc mulierum foecunditatem augere cum  
JOHNSTONO \*) probabile esse censeat. Ex iis-
- p. 161. dem, quibus hominibus conueniat salis vsus, caus-  
 sis, animantibus brutis quoque prodesse affirmat,  
 et experientia probat. Non enim solum iumen-  
 tis, atque equis, praecipue ouibus, in pabulum  
 commodissime immisceri; sed etiam in morbis,  
 quales ouium vermes, obstructionsque, et appeti-  
 tus deprauatus, atque porrigio sint, alique multi in  
 equis, iumentisque, praecipue in his lues, quae di-  
 citur, bouina, maximi vsus esse.
- p. 180. Vegetantibus conuenire ideo, quod omnis nu-  
 tritio ex salibus oleosisque partibus oriatur; quibus-  
 dam tamen, vt *Fago Castaneae* LINN obesse con-  
 tendit, et varios ita terram corrigendi modos pro-  
 ponit: atque, si terra muria saepe aspergatur,
- p. 188. optime infecta arceri a plantis affirmat. Ex sale  
 communi varia salia nitrumque parari posse, quod,  
 quamquam facilius alia via efficiatur, hoc sale ta-  
 men eius originem multum iuuari asserit: praete-  
 rea eius ope ferrum in chalybem mutari, atque  
 tombacum album parari: in arte figularia hoc sal  
 ad vitrificanda vasa adhiberi, ipsamque calcem, in  
 re caementaria necessariam, maiorem inde firmita-  
 tem adipisci: ad saponis praeparationem addi, atque  
 ad varias macerationes, quales sint corii, linteorum  
 que, requiri: denique res, quae diu seruandae sint  
 vt butyrum, fructus varii vegetabiles, vinumque  
 ipsum, ita a corruptione defendi.

- p. 199. 3) Tractatio de fonte *Soterio*, qui dicitur de  
 Heilbrunn, in *Bauaria* sito. Auctore IOSEPHO  
ANTONIO CARL. Quae fontis huius est vis san-  
 nandi magna, ea Cl. Auctorem mouit, vt ipsum  
 adiret, atque causas huius vis perquireret. Hist  
 riam

\*) v. EIVSD. *Thaumatochr. natural.* p. 128.





riam eius, cum a Cl. GEYERO, in *Fontigraphia*  
a. 1636 edita, tractata iam esset, prateriit; iam  
vero ipsas eius partes considerat: quas esse dicit,  
praeter aerem, aquam et ignem, sal commune, et  
alcali fixum, vitriolumque martis, atque terram  
cretaceam. Salis communis praesentiam satis ap- p. 205.  
parere perhibet, ex sapore, ex colore lacteo, quem  
cum solutione plumbea, argenteaque, atque mer-  
curii viui offerat, puluereque inde praecipitato vel  
albo, vel flauo rubroque immisto, ex crystallis, illis  
salis communis similibus, et denique ex decrepita-  
tione, si in ignem crystalli mittantur, quae et cum  
oleo vitrioli efferuescant. Cum syrupus violarum in p. 209.  
colorem viridem mutaretur, praecipue vero charta  
coerulea, acetoque rubri coloris facta, primum rur-  
sus ostenderet colorem, fontis aqua immixta: lin-  
tea, hac aqua lota, flavescerent, vrinamque redole-  
rent, praesertim, si cum sale volatili commiscere-  
tur aqua, odorem alcali volatilis offerret: mercuri-  
usque sublimatus solutus, cum lixiuio, elutione salis  
communis nato, mixtus, aquam flauo colore tinge-  
ret, atque eiusmodi sedimentum praecipitaret: et  
denique sal ammoniacum cum sale huius fontis,  
sepe, instar tartari, vasis apponente, destillatum, sal  
vrinosum, nullum vero spiritum praeberet: collegit  
Cl. Auctor sal alcali minerale marinum huic fonti  
in esse. Vitriolum martis in eo contineri haec per- p. 214.  
suadere putat. Mercurius aqua forti solutus sedi-  
mentum album quidem, flauo tamen immixto, prae-  
cipitauit; aqua gallarum aquae fontis nigrum dedit  
colorem: ouorum, hac in aqua coctorum, testae  
fusco colore praeditae apparuerunt: atque sal calci-  
natum, multoque igne tractatum, magnetem tan-  
dem attraxit. Terram, quae insit aquae, creta- p. 218.  
ceam esse inde certum existimat Cl. Auctor,  
quum, quod adhaesit, calcinatum saporem vrentem,

- quo antea careret, acceperit, aliasque calcis dotes ostenderit, atque in aqua cum sulphure coctum, hepar sulphuris praebuerit: et denique cum sale ammoniaco destillatum coeruleum alcalinum spiritum emisit: quod, etiam cupri aliquid inesse, ostendere videatur. Ex his vim huius fontis medicam explicat, eamque resoluendis fluidis viscidis, obstructis, cet. roborandis stimulantisque solidis maxime feruire pronunciat, ideoque in multis morbis egregia effecta edere; simul tamen omnia, quae in usu omnium fontium attendenda sint, diligenter esse obseruanda, quo, quae iam euenissent, mala vitarentur.
- p. 223.
- p. 232. 4) EIUSDEM tractatio de fonte *Sulzerano in Bauaria superiore*. Indicato loco, in quo fons hic situs est, partes, quas contineat, describit Cl. Autor, et denique quaedam de eius viribus medicis addit. Contineri vero in eo dicit, praeter ignem aeremque, hepar sulphuris, ferrum, vitriolum martis, sal commune, terram calcaream et seleniticam. Quae, ad haec demonstranda, adhibuit tentamina plurima ideo praeterimus, quod cum iis, quae in antecedente tractatione proposuit, conueniunt, atque solum, quae addidit noua, commemoramus.
- p. 236. Odor illi ex hepate sulphuris expiranti similis, attractio ferrearum partium, hepate sulphuris solutarum, per magnetem, et mutatio coloris argentei in brunum, hepar sulphuris demonstrant. Calcareae terrae praesentia, ex sedimento cinereo, ignis
- p. 241. vi calcis proprietates acquirente, apparet. Parum selenitis inesse colligit inde, quod sedimentum huius fontis, aqua elixiuatum, cum sale tartari et puluere carbonum mixtum, in crucibulo bene clauso positum, igni superimpositum, atque de nouo elixiuatum, hepar sulphuris redoleret: id enim docere dicit acidum vitriolicum cum terra intime



coniunctum esse, id quod seleniten constituat. Proportionem harum partium his subiungit Cl. Auctor, p. 243. et vim medicam esse resolventem, atque stimulantem, nec non diureticam confirmat.

5) *Tractatio de mineris cupri, in qua caussae, cur p. 247.*  
*cuprum adeo difficulter ex iis eliciatur, examinantur.*  
 Auctore IOANNE FRIDERICO PETITO. Ex latino sermone in Germanicum versa. Caussam generalem, quae, ne cuprum facile ex mineris eliciatur, prohibeat, in praesentia multarum mineralium et semimetallicarum partium quaerendam esse affirmat, atque ita apparituum esse, quod ferrum, sulphur et arsenicum, praecipue omnium zincum, impedi- p. 252.  
 at, quo minus cuprum ex his mineris, quas solum intelligit, atque quae, cum ex illis partibus constent, naturam habent lapidis calaminaris, facile obtineatur. Modum, quo Cl. IUSTI \*) faci- p. 251.  
 lius id obtineri putat, vix sufficere, quin iis sumptibus, atque communis ratio, perfici. Vitionem ita p. 257.  
 que solam esse cuprum obtinendi rationem affirmat.

6) IACOBUS CHRISTIANUS SCHAEFER p. 260.  
 enumerat ea, quae, *tentamina lanam semina cingentem Populi nigrae LINN. atque Eriophori poly-*  
*stachii LINN. in oeconomia cum fructu adhibendi, se-*  
*cuta sint euenta.* Etsi eum, quem primum sibi proposuerat, finem, his tentaminibus inopiae chartae succurrendi, non plane assecutus est Cl. Auctor; tamen non omnino inutilia et lectu admodum digna videntur. A GUETTARDO \*\*) propositae plantarum, quae rebus ad conficiendam chartam ad-

T 3

hibi-

\*) V. EIVS. *Neuentdeckte Wahrheiten zum Vortheil der Naturkunde und des gemeinschaftlichen Lebens der Menschen.* Pars IX.

\*\*) vid. *Journal oeconomique.* Juillet. 1751. 8.

hibitis substitui possint, enumerationi insunt *iuliferae* et *gramineae*: ex quibus eae etiam sunt, quarum tentamina, praemissa utriusque plantae historia, hic p. 275. proponuntur. Primo tentamina enarrantur, cum lana populi nigrae instituta, eorumque euenta. Quae sunt sequentia: charta, quae exinde parata erat, non votis respondit, sed cinerea, non satis firma, et nodis inaequalis facta est; cui vitio tamen forsan macerationem lanae huius in calce mederi posse coniicit Noster: ad fila lanea conficienda adhiberi sola non potuit; cum vero eius partibus duabus gossypii pars una adderetur, cessit parationi, atque varia panni genera, indeque effecta vestimenta exhibuit. p. 288. Ex lana eriophori polytachii, cum quinque tantum uncias haberet, ob parvam copiam charta non potuit confici; probabile vero esse asserit, ut inde efficiatur charta admodum usibus conueniens. Neri non poterat sola; si vero pars eius una cum serici partibus tribus commisceretur, tum omnibus, quibus sericum tractatur modis, parari poterat, et variis rebus, quas affert, seruire.

p. 299. 7) *Observationes medicae, de variis ad medicinam pertinentibus, notatuque dignis argumentis.* Auctore FRIDERICO CASIMIRO MEDICO. Observationes de vesicatoriis in pleuritide loco dolenti impositis, perutilibus: de vi moschi in mania cum epilepticis motibus: atque de variis hydropis speciebus earumque curatione hic referuntur; cum vero easdem alii libro inseruerit Cl. Auctor, atque a nobis supra \*) iam recensitae sint, illinc Lectores nostros amandamus.

Vol.III. In tertii voluminis parte altera sequentes ad nos pertinentes reperimus tractationes:

1) *De*

\*) v. supra pag. 220. seq.



1) *De arena fluuiatili tractatio.* Auctore P. p. 183.  
 CLARO MAYR. Ordini S. Benedicti adscripto  
 Vormbacensi. Proponuntur hic quaedam tenta-  
 mina, cum arena fluuiatili Oeni fluminis instituta, at-  
 que, quae ex his colliguntur, ratiocinia, eo ordine,  
 vt primo singulae partes earumque proprietates de-  
 scribantur, deinde ea in vniuersum consideretur,  
 tum de eius vfu quaedam subiungantur. Quum p. 186.  
 eae, quas microscopio detegamus, partes sint *calca-*  
*rei filices, crystallina frusta, alia quarzea, alia micaea,*  
*ferrum magna copia, aliaque metallica frustula, atque pau-*  
*ca bruna humus* : nominat hanc arenam *calcareum*  
*ferrumque continentem arenaceum.* Ferri singularem p. 188.  
 naturam fuisse eam commemorat, qua non omne  
 acidis, etiam fortissimis solui posset, sed magnetem  
 magnam eius insuper ex arena eduxisse copiam :  
 quae ideo sit ferrum nulla rubigine corrumpen-  
 dum. Probabile esse has, quas in parua arenae co- p. 190.  
 pia ostenderit ferrum dotes, etiam in maiori fore,  
 an vero appariturae sint, non audet decernere.  
 Cum moueatur arena, flumina turbidare, idque a p. 191.  
 calcareis partibus, quae quasi fermentent, terreis-  
 que pendere ; quum in quietem tendat, varia varii p. 193.  
 coloris offerre strata : si plane quiescat, superius  
 cinereo tegi tegmine, inferius magis margaceum,  
 coeruleum colorem ostendere : in interna eius parte  
 varia petrificata occurrere. Quae inde redundant p. 194.  
 vtilitates in correctione et foecundatione consistere  
 agrorum pratorumque, quum ita et emolliatur et  
 pluuiiae partes pingues facilius retineat terra : quod  
 experimentis et filtratione aquae per arenam No-  
 ster demonstrat.

2) EIU SDEM *de nouo serico vegetabili commen-* p. 198.  
*tatio.* Quamuis haec, quam Cl. Auctor describit  
*Asclepiadis syriacae* natura, nobis iam non noua  
 T 4 vide-

videtur \*); notamus tamen, praetermissis iis, quae de descriptione illius affert, Eum sericum huius plantae ad varias res conficiendas, quales sint, textilia, atque papyrus scriptoria, gossypio addito, cum successu adhibuisse.

- p. 213. 3) *Tractatio de modo, quo ex humo turfosa atque paludibus fructus sint hauriendi.* Auctore P. BENNO GANSERO, Ordinis Benedicti Monacho Oberaltaichenfi. Cum, quae in hac tractatione continentur, maximam partem ab aliis viris Cll. LINNAEO \*\*) DEGNERO \*\*\*) et BERNHARDO \*\*\*\*), aliisque dicta, ab Auctore in suam rem conuertantur, atque, quae in primo volumine traditae sunt tractationes de paludibus et turfa \*\*\*\*), alia confirmentur, alia oppugnentur: sufficiat Lectoribus nostris summa
- p. 215. solum capita indicare. Quorum septem sunt: primum originem paludum declarat, quam ab aquis, a montibus defluentibus, vel e fluuiis venientibus,
- p. 218. atque hic stagnantibus deriuat; secundum de natura turfae exponit, esse eandem vegetabilia quaecunque stagnantibus paludum aquis putrefacta, neque facile succrescere, ideoque non esse
- p. 225. comburendam; tertium aquas ex paludibus deriuare
- p. 230. praecipit; quartum de correctione turfae paludum.
- p. 235. que quaedam addit; quintum quo paludes modo
- p. 236. tanquam arua; sextum tanquam prata; et septimum
- p. 238. vt siluae vtilis esse possint, ostendunt.

- p. 247. 4) *De generatione naphthae, haftenus incognitae, ex sale communi commentatur* IOANNES PETER SPRING,

\*) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 464.

\*\*) vid. EIVSD. *Her. Scanic.*

\*\*\*) EIVSD. *physicalische u. chym. Erörterung vom Torfe.* Leipz. 1760.

\*\*\*\*) EIVSD. *Abhandlung vom Wiesenbau.* Leipzig, 1763.

\*\*\*\*\*) v. supra p. 280 et 283.



SPRING. Med. Doct. Elect. Rei Numismaticae et Metallicae Consiliarius et Medicus Aulicus. Omis-  
 sis, quae de naphtharum vitrioli et nitri fatis exponit  
 Cl. Auctor, ex multis, quae proponit, tentaminibus  
 tria modo afferamus, vbi naphtham salis communis  
 obtinuerit. Cum naphtha nihil aliud ei esse videre- p. 258.  
 tur, quam spiritus, acido minerali in oleum muta-  
 tus, adeoque maxima vis acidi, quam acido salis  
 deesse putabat, ad illum perficiendum requirere-  
 tur, variis modis acidum salis eruere tentauit; quod  
 vero prius non successit, quam donec acido salis p. 262.  
 lunam corneam praecipitaret, praecipitatum oleo  
 vitrioli misceret, atque ita spiritum salis destillaret :  
 qui spiritu vini commixtus, rursus sensim destillatus,  
 paullum naphthae offerret. Quam vero, cum ad  
 lunam cornuam spiritus nitri veniat, non solius salis  
 fuisse, sed nitri, animaduertit Auctor. Quare aci- p. 263.  
 dum sumsit ex mercurio sublimato, eodemque in-  
 stituto labore, praeter quam quod, loco spiritus  
 communis rectificati, spiritum alcalisatum fumeret,  
 naphtham veram salis se obtinuisse asserit. Huic  
 autem experimento, quod nimio constaret, substituit  
 denique vulgarem spiritum salis, eundemque cum p. 265.  
 spiritu vini alcalisato commiscuit, atque sic quoque  
 naphtham accepit. Putat igitur non in solius acidi  
 salis natura, sed etiam in qualitate spiritus vini caus-  
 sam, cur naphtha oriatur, positam esse. Ex his ex-  
 perimentis aliisque se nouam de origine naphtha-  
 rum formasse theoriam Cl. Auctor dicit, eamque  
 proxime propositurum esse promittit.

5) *De lepra, eiusque cura, observationes.* Au- p. 269.  
 ctore WOLFGANG THOMAS RAU. Leprae,  
 quam summum scabiei siccae gradum dicit, et ex  
 pilorum mutatione defluuioque, pustulis in capite,  
 T 5 arte-

P. 271. arteriarum temporalium sublingualiumque nigredine, sensuum obnubilatione, et cinereis per totum corpus oriundis squamis, aliisque signis cognosci perhibet, duo hic proponuntur, natura tamen diversa, exempla. Alterum in homine quinquaginta annorum, phlegmaticae melancholicaeque naturae, et victu minus bono nutrito, postquam a spina ventosa antibrachii salivatione curatus esset, conspiciabatur, eumque vehementissime afficiebat. Curatus tamen est, praemisso decocto lignorum crebriusque purgantibus ex mercurio dulci exhibitis, vnguento neapolitano inuncto, quod deiectiones excitauerat, sicque morbi vim infregerat. Alterum in femina, septemdecim annos nata, nec dum menstrua experta, natum est, quod in eo a praecedenti differebat, ut squamae pauciores, dolores autem artuum vehementes, pedes manusque immobilia et contracta essent. Restituta mulier est mixtura S W I E T E N I I \*) aliisque resolventibus medicamentis, atque bono et nutriente victu, addito post curationem balnei Bollerrani usu. In annotationibus addit Cl. Auctor historiam huius morbi, atque veteres recentioresque refert curandi methodos.

Vol. IV. In quarto volumine continentur tractationes,  
P. II. quae ad quaestiones, pretio quodam propositas, elaboratae sint; e quibus sequentes commemoremus.

p. 2. 1) Tractatio super quaestione *de commodissima furnos et patinas in salinis exstruendi ratione.* Auctore CAROLO AUGUSTO SCHEIDT. Quam ita proposuit, ut primo quasdam, huc pertinentes ignis qualitates tentaminibus et experienciis declararet: deinde quaedam haecenus adhibitorum furnorum vitia ostenderet, et denique ex illis nouam, quae

\*) vid. comm. nostr. Vol. V. p. 717.



quae haec corrigeret vitia, stabiliret furnos patinasque exstruendi rationem. Quum ex tentaminibus, atque experiētiis pateat, omnia fluida, ita et ignem, facillime motu gyrali moueri: colligit furnos rotundos, eosque, qui aeri liberum aditum permittant, esse et maxime naturales, et rei cuiusque consequendae aptissimos. Ex furnis, qui adhuc adhiberi p. 11. soleant, optimos esse dicit oblongos quadrangulosque, eiusmodi etiam craticulis instructos; quibus tamen inter alia haec sint vitia, vt focus craticulaeque nimis magna sint, et spiracula fumum lateribus patinae apponant, imo eo obstruantur: praeterea etiam ignis vis non aequaliter expandatur, patinaeque et nimis magnae, et inepte sibi superstructae sint. fundusque earum facile inaequalis fiat. Suae itaque, vt et furnus, et patinae circulares ex- p. 14. struantur, proportionemque singularum partium indicat, atque additis iconibus illustrat.

2) De eadem quaestione tractationem proponit IOANNES GOTTLÖB ANGERMANN, quae duodecim aureis coronata est. Post quam varias falsae communis species eiusque principia enarravit Cl. Auctor: quo modo aqua salina elixiuetur, p. 36. atque sal commune inde paretur ostendit: deinde, p. 38. quae in sale parando adhibeatur ignem applicandi ratio, proponit: et denique patinarum furnorumque qualitates propriamque ea exstruendi rationem offert. Cum vero, quae hic dicantur, passim in praecedente tractatione pleraque dicta sint, passim ab aliis iam commemorata: id solum notamus, Cl. Auctorem quadrangulam furnorum patinarumque figuram retinuisse quidem, sed duplicem, alteram, p. 45. in qua lignum adhibetur; alteram, vbi lithanthracibus turfaque sal paretur: atque propterea potissimum ab Academia ornatam esse hanc tractationem p. 49. pre-

pretio, quod res rei publicae vtilis, comparandasque facile contineat.

p. 55. 3) Commentatio super quaestione; *quid plantae ipsae ad praeparationem succi nutritii conferunt, atque quid vario solo, cum incrementum iis inaequale sit, est tribuendum? Possuntne et varia eiusdem bonitas, et vitia, chemicis tentaminibus, potissimum respectu agriculturae, utili ratione definiri?* Auctore Cl.

p. 61. VON IUSTI. Diuiditur ea ad normam quaestionis in tres partes: quarum prima, tradita ex physica vegetabilium eorum crescendi ratione varia, ostendit, ex diuersitate variarum plantae partium nihil adeo certi elici posse, vt saltem sciamus vasa plantarum maiora alios nutritios succos, quam minora exigere, ideoque varias plantas in vno eodemque solo crescere, et, si per annos eidem diuersa inferantur semina, sine fimatione ea nascitura esse et vegetatura; generatim vero nutrimentum, quod ex terra hauriant vegetabilia, esse aliquod sal neutrum, ex sale acido catholico, alcali volatili et fixo compositum; sique quid coniecere liceat, sal acidum primum forsan esse vis actiuae elaterem.

p. 74. In altera parte virtutes vitiaque soli affert. Sit illud oportet sale foecundante repletum, aliaque, quae officiant, acida mineralia et nimia acidi vegetabilis copia, in turfosis agris conspicua, sint remota; ipsum vero mollitiem quandam habeat: quapropter argillosum, et limosum, gypseum, calcareum, cretaceumque, atque lapideum sterilitatem afferat: et denique firmum sit solum, ne radices vento euellantur vel terra destituantur: hinc arenosum glareosumque minus conuenire.

p. 82. His propositis tertiam, qua signa cuiusque soli, ratioque illud corrigendi desiderantur, soluit Cl. Auctor quaestionis partem. Si acidis mineralibus,  
vitrio-



vitriolo praesertim, scateat solum, madidum cum sit, nigri coloris videri; ficcatum vero, rubicundi flauicantisque euadere, praeterea chemice tractatum signa acidorum ostendere asserit: corrigi illud putat, si addantur, quae alcalinae sint naturae, ut calx, cinis, margaque alcalina. Turfosam cognosci p. 84. eiusdem indolem ex spongiosa mollitie reliquisque turfae signis, corrigi eandem, si sola sit, exsiccatione \*): si vitriolum praeterea adsit, alcalinis substantiis. Argillam solo inesse apparere dicit ex lubricitate, si humidum sit; sin ficcum, ex rimis, quae in eo oriantur; fertile illud fieri, immista marga alcalina. Rubicundum flauumque colorem limosum solum indicare, praeterea cognosci, si massa quaedam combusta, humidum attrahat et sponte corruat; illudque et fimo, et arena corrigendum praecipit. Calceum, gypseum, cretaceumque et marga- p. 90. ceum solum esse, si aqua fortis immista drachmae illius soli efferuescentiam excitet; mutari illud et fertile fieri, si limus combustus ei immisceatur, quod, quomodo optime fiat, proponit. Solo iam intuitu lapideum cognosci solum; quod tamen vix, nisi dili- p. 92. genti lapidum depuratione, possit corrigi. Are- p. 93. nosum, quod quoque statim cognoscatur, quacunque soli specie, praeter argillam, meliorem accipere indolem. Glaream, cum facile vento noua afferatur, noua quoque correctione egere: ideoque praestare, ea, quae ibidem crescant vegetabilia, ut moros, illic colere. p. 95.

4) Super eadem quaestione tractatio, Auctore p. 97. Cl. WALL, Pastore: quae nummo duodecim florenorum pretio ornata est. Eodem, ut superior tractatio, modo haec quoque proposita est. Putat Cl. p. 203. Auctor succum in plantis perfici filtratione, in celluloso-

\*) vid. supra, p. 282.

- luloso radicis, trunci, ramorum foliorumque contextu incepta, atque in gemmis continuata, et digestionem et mixtionem intimiorem in articulis et nodis. Vnde sequi dicit, vere foliis esse parcendum; cum vero fructus maturescant, ea esse imminuenda: deinde corticem trunci ramorumque esse purificandum, atque nodos tot, quot fieri possint, esse efficiendos. Deinde plantas laetissime in solo crescere, quod subtilissimam terram, quae non, nisi arte chemica, ex aliis elici queat, offerat: id quod ex subtilitate vegetabilis animalisque terrae, agrorumque terram comminuendi opera, patere arbitratur. Non tamen certe posse definiri, quatenus generatim vegetabilibus maxime conveniat terra. Solum in genere illud fertile utileque esse habendum, cuius particulae terreae iuste inter se cohaereant: quare requiri, ut varia eiusdem genera inter se commisceantur, atque cultura in bono conservetur statu: deinde, quod facile *principium vegetans* nitrum nempe volatile, in se suscipiat: et denique in quo maxima huius principii vegetantis copia reperiatur, quae quidem attributa terram alcalinam habere.
- p. 210. Bonitatem vel vitia soli chemice cognosci elixuatione et calcinatione, elutriationeque atque commistione cum acidis: quibus, pro varietate effectorum, quae fertilis vel sterilis sit habenda terra, cognoscatur.
- p. 220. Vol. V. Ex quinto philosophicarum commentationum volumine \*) sequentes referimus:
- p. 225. 1) Tentamen tractationis *de separatione et praeparatione pauperiorum minerarum in fodinis metallicis.*

Aucto-

\*) Institutum Academiae in edendis his commentariis in quinto volumine et sequentibus ita mutatum est, ut disciplinae et historicae, et philosophicae seorsim proponerentur.



Auctore CAROLO AUGUSTO SCHEIDT. d.  
4. iul. 1765. Agit Cl. Auctor primo de necessi-  
tate separandi praeparandique has mineras, vsuque,  
qui inde redundat: deinde indicat *machinas contuso-*  
*rias*, quae ad praeparandas mineras pauperiores  
requiruntur; tum *fossas contusorias*, vbi minerarum  
contusarum viliores partes fundum petunt, descri-  
bit: et denique varias minerarum *loturas* enume-  
rat. E nonnullis praecipua annotemus. Cum, p. 230.  
quae adhuc in contundendis mineris adhiberi soleat,  
quamquam sit vtilissima machina; tamen, ob nimium  
attritum, in partibus eiusdem enascentem, minus apta  
inueniatur: eam, tradita illius descriptione delinea-  
tioneque, indeque demonstratis vitiis, tanquam inuti-  
lem reiicit, aliamque, quae hoc vitio careat, pro-  
ponit, et icone illustrat. Quae est ita exstructa, vt,  
ope duorum vectium, motus fiat ad rectangula, et  
vectis, qui in *trabis* extremitate superiore per cate-  
nam cum ea coniunctus sit, in extremis arcus  
habeat: inferior in altera extrema parte sit ar-  
cuatus, in altera autem, quae rotam respiciat,  
crassior inueniatur, quo *brachio* eam eleuante  
subducto, facile sponte recidat. Ita omnem p. 237.  
attritum impediri putat Cl. Auctor. Fossas con-  
tusorias adhuc adhibitas, cum non omnino finem  
expleant propositum, reiicit, aliudque, cuius com-  
moda et vtilitates demonstrat, receptaculum, in  
quo minerae contusae deferantur, suadet. Compo-  
nitur id ex asseribus abietinis, instar scalae sibi inui-  
cem ita appositis, vt omnium asserum superficies  
horizontalis sit, habeantque transversam latitu-  
dinem sensim incrementem, ad longitudinem vero  
totius receptaculi eorum superficies imminuatur. p. 249.  
In lotura, vt *area curta* obtineat inclinationem mi-  
neris conuenientem, praecipit: quod idem WAL-  
LERIUS \*) quoque suavit.

2) Ve-

\*) loc. cit. vid. comm. nostr. Vol. XVI. p. 31, seq.

- p. 252. 2) *Veritates, experientia et cauta meditatione inventas, quae vim vitae omnium rerum colligentem, naturam intimam elementorum, naturalemque in generandis corporibus ordinem concernant*, offert ANTON RÜDIGER. med. doct. et chem. P. P. O. Lipsi. Quamquam in hac commentatione multa eaque nobis interdum obscura, continentur; tamen ex instituti ratione non diu in eius recensione immorabimur. Vim corporibus propriam in saponacea substantia residere asserit, atque vim primam corporum colligentem esse *sal essentielle* eorum, praecipue *illud, quod materiae inflammabili inhaereat*. Deinde, cum materia inflammabilis in omnibus etiam reperiatur corporibus, eaque iungat terram et sal, in *sulphure salis naturae* esse positam attrahentem colligentemque vim vitae, omniaque elementa ex illo enasci dicit quidem Cl. Auctor; num vero satis demonstrauerit, satisque perpenderit haec, quae dicta sint, non tam, quam Ei videtur, cum rei natura conuenire, aliis diiudicandum relinquimus.
- p. 267. Elementa corporum esse debere simplicia, pura, viua confirmat, eaque inueniri in elementis a BACHERO assumtis; cum vero is characteribus externis ea tantum considerauerit, ipseque naturam interiorem contemplatus sit, se posse plures de qualitatibus atque viribus horum elementorum soluere quaestiones opinatur. Principium itaque corporum esse partem quandam vi propria et vita praeditam *sulphuris naturae*; vel spiritum materiae inflammabilis, cum terra iunctum; vel terram vitrescibilem, cum acido natiuo et aqua volatili connexam; vel terram alcalinam sulphuris, acido volatili aquaque grauiori immixtam. Praeterea, quas vires exerant haec principia separata, et, quomodo ea, comparatione cum passiuis vel destruentibus viribus cognoscantur, proponit.



In sexto volumine, cum vna tantum LIN- Vol.  
BRUNNI de chronologico systemate anni, quo VI.  
Iesus mortuus sit, contineatur commentatio histo-  
rico philosophica, nihil, quod ulterius afferri a no-  
bis possit, reperimus.

XV.

JACOBI HERM. OBEREIDII, Arbore-feli-  
ce-Helvetii, Chymiatris Lindauia - Acroniani,  
Academiae Scientiarum Electoralis Boicae  
sodalis, vniuersalis confortatiua medendi  
methodus; disquisitio noua. Carolsruhae,  
1767. 8. pl. 10.

Esse regulas, in omni morbo curando attenden-  
das, quae ad virium corporis, morbum ventu-  
um arcentium, praesentem superantium, conserua-  
tionem faciant: atque adeo dari methodum me-  
dendi confortatiuam vniuersalem auctor libelli fata-  
lit ostendere.

Hinc primo sanitatis notionem euoluit, eius- p. 9.  
que duo quasi fulcra constituit; alterum *physico*  
*mechanicum*, expeditum scilicet fluidorum iustae co-  
haesivae et indolis per solida firma et apte resistentia  
transitum, indeque pendentium actionum omnium  
vigorem; alterum *ethicopneumaticum*, siue rectum  
regimen actionum animae, quo praeter sensationes  
et voluntarios motus, *patheticos* quoque, qui affe-  
ctus animi consequuntur, et vitales refert, qui o-  
mnes ope fluidi neruei, pro temperamentorum,  
aetatis, sexus, immo actionum mentis diuersitate, in  
motu, copia et mixtione multum discrepantis, per-  
ficiuntur.

Inde temperamenta, praecipua sanorum disci- p. 29.  
mina, expendit, in quibus definiendis, praeter soli-  
Sec. Dec. Suppl. II. V dorum

p. 86. dorum elasticitatem, irritabilitatem et sensibilitatem, inprimis respicit ad fluidorum mixtionem, quae sex principiorum contemperatione ipsi absoluitur; aetheris nimirum, aeris, sulphuris s. principii visceri, aquae, salis et terrae diuersi generis; et, praeter quatuor vulgaria illa temperamenta, alia procreat; quod *Socratici* et *Antoniniani* temperamenti, ab ipso descripti, exemplo euincere conatur. Nunc ubi horum principiorum vnum alterumue vel supereminet, vel deficit, vel iusto laxius arctiusue cum reliquis coniungitur, atque motum sanguinis, fluidi neruei, lymphae et bilis, vt praecipuorum humorum corporis, vel auget nimium, vel imminuit, vel quouis modo irregularem reddit, ita, vt functiones corporis inde laedantur, morbi existunt, quorum recensitionem ad harum causarum ordinem suscipit: ac denique omnes ad tres summas classes reuocat, existimans cunctos vel a principio igneo, vel a viscido, vel a terreo praedominante oriri; quumque igneo abundante, viscidum; viscido, igneum et terreum; terreo, reliqua duo deficient, classes has etiam a defectu principii ignei, visceri frigidi, et terrei constituit, et sanitatis redintegrationem, h. e. virium naturae confortationem deficientium principiorum restauratione absolui credit; vt adeoque omnis interna medendi methodus, methodus naturae confortatiua per addita principia deficientia, et triplex quidem, calida nimirum, frigida et sicca siue solida ipsi esse videatur.

His addit obseruationes quasdam practicas vniuersales de iusto animi et corporis aegrotantium regimine, de virium vltiori debilitate arcenda, deque iisdem, post morbum superatum blanda diaceta restituendis, et vltimo lectores, methodi huius penitus cognoscendae cupidos, ad THEOPH. LOBBII generalia medica principia et cautiones amandat.

XVI. Pra-



XVI.

*Practisches Mineralsystem entworfen von D. RUDOLPH AUGUSTIN VOGEL, der Arzneygelahrtheit ordentlichen Lehrer zu Göttingen etc. Leipzig, verlegts B. C. Breitkopf. 1762. 8. mai. Seit. 518. nebst Vorrede.*

h. e.

Mineralium systema practicum. Auctore Cl. VOGEL.

**A**rtissimus, qui intercedit chemiae cum mineralogia nexus, harumque doctrinarum vnus cuiuslibet ex altera petenda dilucidatio, permouerunt Cl. VOGELIUM, vt, quum tam concinne esset et perutiliter commentatus de chemicis rebus, mineralium quoque doctrinam disponderet, artisque doctrinae et metallurgicae praecepta, in chemiae institutionibus omissa, adderet; vnde etiam practici est, ob addita ista, systematis huius nomen. Siue vero vel singulorum historiam et descriptionem, siue totius operis ordinem et perfectionem spectes, vtique inuenies et plenius dicta plurima, et saepius hic demum dicta primum. Imminutus est generum numerus, classium contra adauctus, notaeque characteristicae cum ex habitu externo, tum vel maxime ex interna desumptae mixtione sunt.

Totum opus distinctum est in sectiones sex; quarum prima terras tradit, in argillaceas, calcareas, filiceas seu arenosas, margaceas, seleniticas, talcosas, micaceas seu micantes, inflammabiles, salinas, metallicas semimetallicasque et humum siue ruralem diuisas.

Altera sectio enarrat lapides, quorum classes sistunt argillacei, calcarei, margacei, selenitici, pyromachi,

machi, schistosi, foliosi, seu lamellati plumosi s. filamentosi, salini, metallici, fusiles, quorum pumex refertur cum zeolitho, denique petrae vel saxa. Ad-  
dita nouorum lapidum classis tourmalinum solum continet.

Tertia sectio petrefacta exponit, quorum classes sunt animalia, phytholitha, lithophyta, lithotomi, et pori.

Quarta sectio salia continet, in classes distributa quinque. Scilicet in *styptica*, vt sunt vitriolum et alumen, *liquabilia* seu fusilia, quae vel in igne fluunt tantum, vt nitrum et neutrum sal acidulare, vel etiam vitrescunt. vt borax siue sal tincal: porro *igne induranda*, vt salis communis species; *volatilia*, vt sal ammoniacum, sal vrinofum et arsenicum; denique *lixiuiosa*, vt sal persicum, aphronitrum, sal cretae.

Inflammabilium sectio quinta est, quorum classes praebent sulphura, bituminosa, seuum, balsamumque minerale.

Sexta denique sectio metalla et semimetalla cum appendice de platina offert, et metallurgiae atque docimaestices dogmata praecipua enucleata exhibet.

Haec totius operis forma est; sed, quo et partium singularum demus qualemunque adumbrationem, speciminis loco passim delibata nunc superaddamus.

p. 21. Terram dicit Cl. Auctor illud fossile, quod friabile sit, cultroue facile patiat se radi: ponit praeterea terrarum in classes diuisionem e mixtione sola recte deduci. Hinc ab ipso inter terras recepta sunt, quae ab aliis in minerarum, bituminum, saliumue numero ponuntur.

p. 27. Ad argillaceas terras refert argillam vulgarem, limum, argillam fistularem, porcellanam, smectin, medul-



medullam saxorum et tripelam, quarum et vtilitas, et natalis situs discrepant.

Argilla vulgaris gne rufescit Saepe arenam, aliquando et calcaréam admixtam habet Calce tamen remixta figulino operi non apta est. Etenim calx calore tumefacta, vasa, quae vix primum experta ignem sunt, findit, subque lamellatim secedente argilla in grumulos collecta sedet. vti Cl. Auctor in variis vasis chemicis, ex argilla Gottingensis agri confectis, aliquoties vidit. Addita est enarratio modi, quo argilla ad varia opera praeparetur. p. 28.

Boli terrae argillaceae sunt subtiles qualitercunque coloratae, quae in igne tractatae colorem rubrum acquirunt. His notis iunctis boli natura continetur. Nam, quod boli medicis inferuiant vsibus, character nullus est, tactusque pinguis bolis, terrae fullonum et porcellanae communis, itidem bolos non satis distinguit. p. 30.

Terra lateritia et limus differunt, maiori, quas illa prae hoc habet, argillacearum particularum copia. Fistularem argillam color albus, in igne permanens, distinguit. Qua ratione inde tubuli, fumo tabaci sugendo destinati, parentur, simul expositum est. p. 32.

Subtilissima argilla porcellana est, coloris vel albi vel grysei. Misnica et Bohémica terram calcaréam admixtam gerunt; Brunsvicensis vero cum acidis non feruet. Dictum quoque hic est, quid proprie sit porcellana massa. p. 33

Smectis praestantiam non ab alcalino admixto, sed a partium subtilitate habet. Anglicanam fullonum terram feruere cum acidis Cl. IUSTI affirmavit, negavit Cl. POTTIUS. Noster medius est, duplicem asserens talem dari, quarum una pura esse, altera calcem habere possit. p. 39.

p. 39. Tripela argillacea quidem terra est; non tamen vnquam simplex, sed calce, marga, arena, quin immo et ferro subinde remixta.

p. 40. Glutinans argillarum et tenax principium ab inflammabili esse cum ELLERO asseritur: confirmaturque inde, quod argilla calces metallicas reducat ex parte, saepeque sit pyritarum sulphureorum matrix.

p. 41. Originem argillas nulli alii terrae debere statuitur. Ex arena destructa, vt Cl. BUFFONUS arbitratur, esse nequeunt, quum, quorsum assumtus Ipsius ignis penetrare nequit, in profundissimis cryptis terrae sub arenae quoque stratis argillae reperiuntur: porro ex terris vegetabilium destructis et inflammabili mixtis nequeunt prodire, quum argillae parciolem habeant inflammabilis substantiae copiam, quam vegetabilium terrae. Neque, quod sub turfa inueniantur argillae strata, quidquam demonstrat.

p. 44. Sic et creta inter terras aborigines refertur. E cornuo certe lapide destructo non esse, docent conchae integrae, cornuo inhaerentes, alcalinaeque et filiceae terrae tam discrepans indoles. Argillam, vbi glutinoso suo fuerit orbata, cretam fieri, propterea non assumitur, quod, argilla quacunque demum ratione glutinoso suo priuata, calcarea tamen terrae naturam non recipiat. Buffoniana de cretae genesi sententia e verisimillimis esse dicitur.

p. 46. Farina fossilis calcarea Cl. SCHAEFFERI videtur lac lunae fuisse.

p. 51. Arenam e lapidibus dirutis prouenire, adeo vero videtur absimile, vt probabilius contrarium asseri posse credatur. Ea tamen arena, quae aquis fontium inest, vtique conceditur esse lapis destructus.



Margam ostendit Cl. Auctor semper esse terram p. 52.  
mixtam, vel ex arena et calce, vel ex his et limo  
constantem. Arenae quoque plus habent margae,  
quam calcis. Plurimae margae in igne vel induran-  
tur, vel vitrescunt. Argillaceae terrae, micaceae  
et humus, frequenter cum marginis concretae, partes  
margarum aduentitiae sunt. Mentio hic fit egre-  
giae fossae, sex margae genera offerentis, quae est  
prope *Lengelern*, vicum duos a Gottinga vrbe distan-  
tem lapides. Sitne alicubi marga, praeter alia, aratrum  
prodit, si terram profert gryseam arenosam inter  
arandum, vel integras eiusmodi terrae massas con-  
cretas ostendit.

Farinae fossilis natura in eo consistit, ut sit p. 58.  
terra selenitica, sub dio reperiunda, atque in agris et  
pratis cum aqua fontium protrusa.

Oleum talci et magisterium eius nil sunt, nisi p. 63.  
commenta vel lucripetarum impostorum, vel  
imperitorum et perperam ex solo tactu oleoso  
et superficie splendida olei praesentiam praesup-  
ponentium.

Molybdaena terra micacea est, plerumque tal- p. 67.  
cosa et refractaria, plumbi nihil, sed ferri, et phlo-  
gisti parum continens. Parantur inde styli scripto-  
rii, quorum conficiendorum ratio exponitur.

Terrae inflammabiles diuiduntur in sulphureas p. 68.  
et bituminosas. Praeterque consueta sulphuris  
principia, terra quoque ipsi inesse volatilis propte-  
rea statuitur, quod fluida duo ista, inflammabile  
scilicet et acidum vitriolicum absque eiusmodi  
terra solidum corpus constituere nequeant. STAHLII  
sententia, qua statuit, in libra sulphuris vna,  
vix contineri phlogisti drachmam, minime tam  
certa est, quam plerisque videtur.

Sub terris metallicis et semimetallicis intelligit p. 77.  
Cl. VOGEL genus minerarum, habitu terram refe-  
rente,

rente; praeter terreas tamen partes metallici quid vel ibidem vere primitus natum, vel fortuito admixtum continens. Seiunxit autem istas substantias a reliquis mineris coniunxitque cum terris, quoniam credidit, interdum utique aliquid tribuendum esse notis ex habitu externo petitis, quarum magna sit in mineralogiae doctrina faciliori reddenda vis. Corpora huc relata sunt arena aurea, minera argenti mollior, terra plumbaria, arena stannea, arena ferrea, mica ferrea, ochra, minera cupri terrea, viride et coeruleum montanum, lapis calaminaris, terra cobalti, terra arsenicalis et minera hydrargyri terrea.

p. 83. Terrae cobalti non omnes redolent allium, prunis iniectae.

p. 89. Lapidēs a terris separauit, quoniam non cuncti e terris nascuntur, neque eiusdem omnes sunt cum terris indolis. Genesis eorum itidem vna non est.

p. 92. Alii nasci videntur concretione, alii coagulatione materiae viscidae vel gelatinosae, alii crystallisatione. Concretione v. c. generari stalactiten, calcareum, arenarium, et schistum; coagulatione, cornuum; crystallisatione, crystallum montanam, spathum.

p. 96. Neque absurdum est statuere succum subtilem, qui lapidibus formandis inferuiat, licet sensibus nostris haud percipiatur. Cuius rei confirmandae causa prouocatur ad agros, qui, diligentissime a lapidibus liberati, intra paucos annos aequae magnam lapidum offerunt, quam antea, copiam.

Haec, quae hactenus proposuimus, satis ostendere putamus, Cl. VOGELIUM in concinnando hoc systemate multa protulisse, quae huius doctrinae cultoribus plurimum debeant esse accepta, quaeque alibi anteaque dicta haud reperiant. Ipse iudicauit Cl. Auctor, virorumque clarissimorum sententias examinavit, priusquam suas faceret; saepissime



sime quoque nouas protulit. Quum vero, saluís breuitatis legibus, plura excerpere haud possimus, in illis, quae speciminis loco laudauimus, subsistimus, inprimis, quum pridem iam eulgati huius libri notitia mineralogiae studiosis vix possit esse nulla; quumque, si fuerint, qui eum nondum nouerint, ad eum ipsum adeundum et legendum per pauca quoque ista fatis videantur allici posse et excitari.

XVII.

CARL AUGUST GRAEBNERS *Gedancken über das Hervorkommen und Wechseln der Zähne bey Kindern nebst Anweisung für Erwachsene die Zähne gesund zu erhalten, nebst einem Zahnca-  
lender und vier Kupfertafeln. Nach dem Ham-  
burger Exemplar. Langensalza bey Johann  
Christian Martini. 1768. 8. Seit. 64.*

i. e.

Cogitata de eruptione dentium et dentitione secunda in infantibus, vna cum methodo, qua adultorum dentes conseruari queant, calendario dentifricio et tabulis quatuor aeneis. Auctore CAROLO AUGUSTO GRAEBNER.

**I**nfantibus magis salutare iudicat Noster, si ferius dentes erumpunt, cum tum dolores et morbos, cum dentitione coniunctos, melius ferre queant. In mediocriter macilentis dentes facilius erumpunt, quam in crassis. Omnibus remediis, ad masticandum excogitatis, praefert radicem iridis

Florentinae, cum melle rosarum illatam. Dentitionis secundae initium fit sexto aetatis anno, eo propemodum ordine quo primi eruperunt. In macilentis sponte excidunt primi, ac dein secundarii apparent, ac hoc illud tum non est praetereundum, si necesse est, dentes primos extrahere: nam breue est hoc tempus et postea firmitatem nouam dens nanciscitur. Vsum dentium tum perpendit Noster: non solum ad masticandum, sed et ad respirandum ii sunt vtilis, quoniam, dentibus euulsis, loquela difficilior fit plusque tum aeris requiritur et pulmones patiuntur. Pulmonibus itaque aequae conducunt dentes, ac ventriculo.

p. 16. Sed haec haec haec de dentitione infantum, iam adultis modum dentium conseruandorum tradit Noster. Atque hic differitur de tartaro, scorbuto dentium, aliisque dentium morbis. Galli suadent separationem arcte connexorum dentium per limam; sed apud eos plus iuuat haec operatio, quam Hamburgenses et eos, qui in vicinis locis habitant. Dente vnus lateris amisso, oppositus in altero latere quoque inutilis fit. Aquam non nimis frigidam ad os eluendum, et dentes abluendos suadet. Grauiditas et puerperium dentibus pariter afferunt incommoda, quam morbi, vt variolae, morbilli alique. Dentes, qui accurate depurantur, in sanis albedinem iuuenilem et splendorem conseruant vsque ad trigesimum annum aetatis. Fissurae et atrapuncta morbum dentis produnt.

p. 39. Cauti dentes plumbo, auro, ceraque impleri possunt, interdum autem hae laminae plumbeae aut aureae premunt et excrescentiis fungosis dant occasionem in gingiuis. Hic referuntur a Nostro epulis et parulis. Inter pessimos morbos dentium refert Noster vlcera et fistulas.

Ad



Ad tempora primae et secundae dentitionis recte definienda proponit Noster methodum, quae cernitur in calendario dentium, cuius iconem adiecit, quo dentes, simulac eruperunt, annotantur, insimulque, si rursus elabantur. p. 44.

Artificialium dentium arctam coniunctionem suadet, ne esculenta iis adhaereant eosque corrumpant. Artificialibus dentibus totam maxillam sine noxa et incommodo ornat, sit inferior, sit superior, imo vtramque maxillam, vbi et machinam in iconesistit, quae a machina, a Cl. FAUCHARD inuenta, aliqua ex parte differt. p. 49.

Porro fieri quoque potest, vt dentes post euulsionem emendati et cera vel plumbo impleti, vel alio atque alio modo correcti, iterum in alueolos immittantur, aut similes dentes humani alius hominis, loco eorum, imponantur. Hanc operationem Noster appellat (*transportieren, versetzen oder umpflantzen*) atque exemplis illustrat. Inter quae illud vnicum hic commemoremus, vbi vidit Noster dentem peregrinum firmiter adhaerere alueolo. p. 58.

Ad purgandos dentes, artificiales inprimis, suadet duo instrumenta, quae vero sine icones, quam Noster adiecit, non perspicue satis possunt describi. p. 61.

XVIII.

Ontleed en heilkundige verhandeling van het waaterhoofd, het waatergezwel en verdere bekende gebreken der ruggegraat ; nevens eenige aanmerkingen over de boghelworing en het mankgaan. Alles alleen uit waarneemingen opgemaakt en verklaart, door E. P. SWAGERMAN, Chirurgyn te Amsterdam, met platen. Te Amsterdam by E. van Harreveldt 1767. 8. mai. plagg. 30. cum dedicatione et indice.

i. e.

Tractatio anatomico chirurgica de hydrocephalo, spina bifida variisque spinæ vitiis. Auctore E. P. SWAGERMAN.

**T**ribus potissimum ex causis opus hoc vtile paullo magis increuisse videtur. Vel enim Cl. Auctor rerum descriptiones ad minutissima, quod Batavis solemne est, deducit: vel, præter tumores eiusmodi aqueos, quibus tractatus inscribitur, alia multa, quibus corpus deformius redditur, ossium vitia pertractat: vel denique multis et copiosis exemplis, quæ huc spectarent, ex optimis scriptoribus rem illustravit, quæ itaque breuiter examinabimus.

p. 8. Hydrocephalum Noster colluviem aquæ, intus in capite collectam, cuius pondere caput, ad magnam partem hætenus membranaceo cartilagineum, prematur et extendatur, dicit, asseritque, initia huius mali, quod in fetibus plerumque et infantibus recens natis observatur, diu ante partum

h. e.



h. e. tum, cum ossa caluae ad maximam partem cartilaginea sint, quarenda esse. Vel solum in capite obseruatur, et *hydrocephalus* proprie dicitur; p. 4. vel interdum, quod tamen rarissime fit, tota medulla spinalis simul extenditur, cui quidem malo, cum, ruptis membranis, effusoque humore, infantes ante et inter partum semper perire soleant, peculiarem denominationem non attribuerunt auctores; vel denique pars tantum medullae spinalis extensa conspicitur, quod *spinam bifidam* dixere. Accidere interdum asserit, vt, vel pondere capitis, vel p. 12. extensione medullae spinalis simul, vertebrae colli aliae absumantur, aliae vero compingantur: videri tunc collum deficere, caput intra scapulas deprimi, vt ita os pectus tangat; cum vero et tum interdum os frontis deficiat, facies plana sine vel compresso naso conspiciatur, portenta haec, ea praecipue, quae, euacuatis e capite humoribus, ex vtero prodire, cum bufonibus compararunt auctores \*) alii ea capita felina vocarunt \*\*). Ossium quoque cra- p. 40. nii, in initio eiusdem mali fere cartilagineorum, insigniter alia increfcere, alia comprimi solere, et ita deformiora reddi, vt, si quando separatim effossa sint, ad suspicionem gigantis cuiusdam, ibi sepulti, deducerentur quidam, qualia § 73 refert. Cum p. 36. vero aegri, subductis aquis, semper et statim moriantur, qui, si sibi relinquuntur, diutius viuere soleant, operationem omnem reiicit. De obseruatione Cl. p. 56. SCHEUCHZERI Cel. VESALIO communicata, iure dubitamus.

Sed et eiusmodi tumores in omnibus spinae medullaris partibus apparent, quos varios Cl. SNIP vidit, et Noster talem ad ceruicem, qui caput aequa-

\*) vid. Ill. HALLER opuscul. anatomica p. 282.

\*\*) vid. BARTHOLIN hist. an. Cent. II. obseru. 44.

- quaret, integro tamen capite obseruauit, quocumque nec superiorum, nec inferiorum extremitatum paralysis coniuncta erat, et infans ipse per annum adhuc vixerat. Oedemata vero haec, etsi in omnibus his partibus offendi soleant, crebrius tamen in lumborum parte inferiore, et ossis sacri superiore occurrere, experientia docet, quorum delineationes in Cel. RUYSCHIO \*) euolui poterunt. Malum hoc spinam bifidam appellant, in quam paullo altius Noster inquit, iconemque eius egregiam, quae spina medullaris praeter modum prolongata, et, ad instar linguae, deformata conspicitur, adiungit. In variis exemplis, quae ex auctoribus hic recenset, nulla aderat paralysis; in omnibus vero latera processus spinalis vertebrarum lumbarium a se inuicem diuisa conspiciuntur, magnumque efformare solent
- p. 115.** hiatum. Vnde vero eiusmodi colluuius aquosa in canali, qui medullam spinalem fouet, contenta, partemque spinae ad talem tumorem distendens deriuanda sit, non certo potest determinari: vel potest intra caput colligi, ad ventriculos encephali deriuari et exinde in canalem medullae spinalis descendere, cum inter haec caua nexus omnino detur; vel origo eius in canali hoc esse potest, colluuiem ibi colligi, et partem eius debiliorem in peculiarem canalem mutare, qui sensim increscens et ad cerebrum usque adscendat, ventriculos cerebri petat, et
- p. 118.** ipsum hydrocephalum efformet. Initia eius in fetu et quidem diu ante partum ponenda esse asserit, cum tumor iste, si infans cum eo nascatur, ad insignem magnitudinem iam delatus conspiciatur, quamuis volumen eius post partum magis extendi posse concedat.
- p. 120.** Conspicitur tumor externe coloris naturalis, ad situm et positum aegri varium magis minusue tensus,

\*) Annot. 34. fig. 36.



fus, tactu mollis, aqua plenus, et admota candela  
 pellucens, cum aqua intus contenta limpida utplu-  
 rimum et clara deprehendatur: collo magno, ut  
 digitis vix possint eleuari; pollices vero, vnguibus  
 versus se inuicem positis, latera tumoris prementes  
 introrsum supra duos quasi margines duos de-  
 hiscunt. Aegri eiusmodi in vniuersum vitam haud p. 125.  
 diu trahunt; sed et eo citius e viuis rapiuntur, quo  
 magis arte malum hoc tollere conentur auctores.  
 Quicquid etiam in laudem operationis dixerint, in-  
 cisionem tumoris tamen letales semper produxisse  
 effectus experientia testatur. Nam etsi eiusmodi  
 effectus letalis non semper ex neruis inde laesis  
 deriuandus est, cum medullam spinalem ibi, vbi su-  
 pra lumbos conspicitur, per hunc morbum bifurca-  
 tam et in fasciculos nerueos diuisam esse, nondum  
 obseruatum sit; interim probabilius esse, aerem  
 atmosphaericum in cauum euacuatum intrare, nec  
 eam tantum, quae tumore tegitur, medullae par-  
 tem, sed et totam spinalem medullam cum omni-  
 bus initiis fasciculorum exinde oriundorum, quid,  
 quod totum encephalum petere, cuius affectio his  
 partibus semper noceat. Inde operationem quam-  
 libet reiiciendam esse quoque defendit.

Iam paullo fusius anatomiam earum partium, p. 143.  
 quae in producendo hoc malo concurrant, perstrin-  
 git. In fetu partem eam canalis spinae mollissimam p. 148.  
 esse, vbi posterius vertebrarum officula coeant,  
 h. e. in medio, quo processus spinalis fulcitur, cre-  
 dit: nam non, nisi integumentis tantum communi-  
 bus, obuoluitur, nec villo osseo tegmento, sed cartila-  
 gine tantum tegitur, quae, quo propiora latera  
 huius processus contactui sint, quoque longius fetus  
 a maturitate sua distet, eo tenuior sit et mollior;  
nec

nec spinalis ista apophysis iam in os mutata est. Si itaque in canali ipso causam quandam suspiceris, quae eum extendat, ibi eam quaerendam esse, ubi minima resistantia sit ad partem extendendam vel prolongandam, probabile est, praesertim cum plurimae partes molliores, urgente quadam vi superatae, diutius possint extendi, antequam rumpantur. In qua quidem re principem causam, cur malum hoc tam frequenter in vertebrae lumborum et initiis ossis sacri obseruetur, poni exinde concludit: sed hoc magis elucescere, si in ortum et progressum ossescentiae spinae, quam Noster studiosius examinatus, inquiratur. In tribus variae aetatis fetibus, quos attente disquisiuit, spinales processus omnes fere haecenus diuaticatos, nec non vertebrae, exceptis septem superioribus dorsi, quae clausae iam viderentur, apertas Cl. Auctor vidit, adeo, ut etiam medullam spinalem per hunc hiatus in ultimo fetu,  $1\frac{3}{4}$  digitum longo, detegeret, eamque, illaesis vertebrae, extraheret. Vnde colligit, tunc temporis, vel fetu etiam paulo adultiore, medullam spinalem in omnibus spinae partibus commode posse extendi, spinaeque bifidae occasionem dari; nec diuaticationem istam causam mali, sed eius potius effectum dici debere. Iam vero aqua, in crasso durae matris processu, qui spinae cauum intus obuehit, contenta, eundem eo magis et facilius extendit, quominus vertebrae, posterius nondum iuste coalitae, resistunt. Cum paralyis inferiorum extremitatum interdum in spina bifida appareret, fuerunt, qui eam a pressione medullae spinalis versus nervos deriuarent; quibus vero, quo saepius ab aliis refutati sint, eo minus Noster assentitur, cum frequentius nulla paralyis in spina bifida obseruetur, eamque non, nisi post partum, accedente occasionali causa, oriri concedit. Nec a pressione quadam in vtero eam



eam quaerendam esse, liquores copiosi, quibus corpusculum fetus innatat, prohibent.

Ex adspersis, quibus Noster paullo diuagatur, p. 222.  
observationibus eam colligimus, qua, calua tota  
fere carie destructa, desperandum non esse suade-  
tur; sed, calua exempta, super nudam duram ma-  
trem vnguentum diapompholygos applicandum  
esse.

Spinam bifidam porro non ex defectu verte- p. 235.  
brae cuiusdam, quorum exempla inducit, sed ex  
vertebrarum per tumorem distensione, qua earum  
ossescientia impeditur, nasci contendit, vbi multas  
simul gibberoformis historias communicat. Quam-  
quam Noster de imaginatione materna, ex magna  
hac de re Auctorum contentione dubius adhuc vide-  
tur; ei eum tamen parum attribuere, ex eo etiam patet,  
quod multae matres reperiantur, quae, varios per  
graviditatem affectus passae, infantes, his vel illis  
naevis notatos, se parturas metuerint, quae tamen  
vegetos et sanos eos, nullaue macula conspicuos  
enixae sint.

Catalogum insuper infantum recenset, quibus p. 262.  
pars quaedam vitio haereditario, vel fortuito deef-  
fiet aut abundaret: inter quos eorum meminit, qui p. 283.  
integri et iusti ex parentibus circumcisis procreati  
sunt; nec proli, ex brutis animantibus, cauda vel  
auribus priuatis, genitae quidquam deficere solere:  
verbo, vitia mechanica parentum, post partum ac-  
quisita, fere nunquam ad infantes transferri. Sic  
et gibbositatem vel claudicationem, haereditariam  
familiae cuidam visam, non iam in fetu adesse; sed  
corpus eius tantummodo ita dispositum esse defen-  
dit, vt post partum, causa quacunque accedente,  
hoc vitium sibi contrahat. Qua occasione mecha- p. 308.  
nismum claudicationis, ex quatuordecim ossibus in-

nominatis ab ineunte aetate claudicantium attente examinatis, et cum femoribus comparatis, ad quinque potissimum species reduxit: quam quidem theoriam, cum paullo curiosior videatur, lectoribus hic communicare non alienum putamus; monemus simul, Nostri de iis tantum loqui, qui a prima

- p. 311.** aetate hoc vitio laborent. Prima species in eo cernitur, si inferius cavitas acetabuli iusta, superius vero et ad latera paullo amplior et minus profunda euadit, capite femoris simul planiore et latiore.
- p. 312.** In altera acetabulum non solum superius et posterius ampliatum, sed et foueam, qua glandula mucosa latet, lamina ossea obducta apparet, glandula ipsa et ligamento rotundo ex acetabulo protrusiss et degeneratis, quod ex sectione cadaueris confirmatur.
- p. 317.** Tertia, acetabulo vero pene depresso, novam cavitatem supra priorem, vel ad ileum os, vel ischium sistit. In quarta cartilago caput femoris inter et collum fracta occurrit, ut inde caput ab reliquo femore separetur. Nouam denique quintam articulationem capitis femoris, ex acetabulo sensim dimoti, posterius cum osse ileum ostendit.

Quae Noster de ossium fractorum per sensim induratum gelatinam, callum nimirum, restitutione disputat, omittimus. Sed cum inter alios Cel. praecipue RUYSCH de luxatione femoris vel dubitaret, vel prorsus eam negaret; Noster hac in re ab eo dissentire videtur, cum sibi ipsi exemplum eiusmodi luxationis sine ligamentorum disruptione, notum

- p. 421.** sit. Tandem Cl. Auctor, se neque causam hydrocephali et spinae bifidae, nec remedium iustum scire, ingenue fatetur.



## XIX.

*Aufrichtiger Unterricht vor neuangehende Aerzte und Wundaerzte, wie sie sich vor, in und nach den legalen Besichtigungen todter Körper zu verhalten, und die Besichtigungsscheine nach beygefügter Betrachtung von der Tödllichkeit der Wunden einzurichten haben: nebst zwey und sechzig von gehaltenen Besichtigungen todter Körper und gehaltenen Untersuchungen verschiedener Sachen den iudiciis ertheilten Besichtigungsscheine und Zeugnisse herausgegeben von CHRISTOPH GOTTLIEB BÜTTNER Med. Doct. et Prof. ord. physic. Samb. Collega Sanitat. membro et h. t. facult. med. Decan. Königsberg und Leipzig bey Joh. Dan. Zeisens Wittwe und Joh. Heinr. Hartungs Erben. 1769. 4. Seit. 208. ohne Vorrede, Vorbericht und Register.*

i. e.

Fida institutio iuniorum medicorum et chirurgorum ante, et post legales sectiones cadaverum: nec non de sectionis relatione, simul cum tractatione de letalitate vulnerum et sexaginta duobus casibus medico forensibus. Auctore CHRISTOPH GOTTLIEB BÜTTNER. M. D. etc.

Postquam Cl. Auctor, medicinae forensis et omnino medicinae totius cognitionem physicis summe necessariam esse, rursus physici officium in foro ciuili, criminali et ecclesiastico demonstraue- rit, de lethaltate vulnerum differit. Tum sequuntur casus medico forenses, a Nostro elaborati. Nos

vero, cum omnia excerpere nostri instituti ratio non ferat, de nonnullis exempli loco videamus, ex quibus ut appareat huius libri utilitas, optamus.

p. 36. De letalitate rupti vteri grauidi haec habeto. Arbitratur Noster tum rupturam vteri grauidi non esse letalem, si vmbilicalis funiculus simul ruptus sit. Nam potest postea vteri vulnus ob vim suam summe contractilem facile consolidari, et placenta vterina dein cum lochiis per orificium vteri, consueto modo, expelli. Quod si vero fetus cum secundinis in abdomen pellitur, et lochia, ob denegatum per orificium vteri transitum, non fluere possunt, tum stagnans hic sanguis abit in putredinem, vicina viscera inquinat et inficit, quem mors sequitur.

p. 37. Probat minus eiusmodi letalem rupturam vteri grauidi exemplo. Rustica sentiebat magnum strepitum in abdomine, cum filius inopinato in matris abdomen casu ab alto impingebat, quem strepitum sequebatur vteri haemorrhagia magna cum secundinis. Non diu post tumor oriebatur in sinistro abdominis latere, quo rupto, fetus aliquot mensium membra per suppurationem expellebantur, et, fetu articulatim exento, non solum vulnus feliciter claudebatur, sed femina pristinam recuperabat sanitatem, ita, ut, vno anno praeterlapso, rursus grauida facta, viuum, sanum et maturum fetum ederet. Quaerebatur itaque: vtrum fetus extra vterum in abdomine fuisset, an per casum ab alto, ruptoque inde vtero, in abdomen matris pulsus fuisset. Ac priore a Nostro negato, posterius affirmatur.

p. 51. Inter vulnera per se letalia refert Noster et vulnera abdominis, si intestina in vulnus sese ingerunt, atque ab eius labiis incarcerantur, nec subito repri-



reprimuntur. Quoniam, accedente sphacelo in incarceratis intestinis, mors subsequi potest.

De veneficiis, abortiuis et opiatidis remediis dum agit Cl. Auctor, enarrat quoque nonnulla exempla de cicuta aquatica, ex cuius usu duo mortui, et duo infantes, qui minus comederant, liberati sunt remediis. p. 55.

De morte subitanea, subsequente ex variis causis, imprimis cum virgis quis caederetur. Corporis autem debilitas non solum, sed et anxietas, timor tristitiaque mortem hanc induxerunt; non vero virgae. p. 58.

De absolute letali vulnere capitis sine fissuris, contrassuris et fragmentis ossium capitis, ob extravasati sanguinis magnam copiam. p. 92.

De alapa mortifera Cl. Auctor enarrat exemplum. p. 109.

De letali splenis ruptura. Lien ruptus et in duas partes diuisus erat. Ex nimis itaque extrauaso sanguine in abdomen, reliquis vasis sanguiferis, sanguine orbatis, cordis et vasorum vacuitas indeque mors subitanea subsequuta est. Quapropter cor cum vasis pallidum et vacuum, et viscera abdominis pariter alba et vacua sunt reperta. p. 121.

De morte subitanea ex inflammatione ventriculi et pulmonum, per spiritus vini abusum. p. 134.

De letali inflammatione ventriculi a bile, vehementer mota. p. 140.

De laesione et ruptura intestini tenuis letali. Erat ieiunum, in cuius fine, vbi ileon incipit, ruptura deprehendebatur. p. 149.

De impedita vrinae excretionem per vrethram compressam ab annulo, a meretrice membro virili circumdato, vti referebat aeger. Per annum hunc p. 160.

annulum in membro virili gessit, multaque inde incommoda percepit. Vrina autem guttatim interea pone annulum effluebat, vbi sponte apertura quaedam parua ex naturae conamine facta erat. Annulo hoc remoto, per vrethram vrina non amplius fluebat, sed per foramen illud paruum.

p. 199. De morte subitanea duorum infantum post externum vsum butyri, cum arsenico mixti, in tineae. Arsenicum fuisse ex allii odore probat. Inflammationem ventriculi et intestinorum, nec non pulmonum deriuat Noster a particulis arsenicalibus, cum sanguine coniunctis, quae causa mortis erat.

## XX.

De modo cauendae corruptionis corporum naturalium in museis, auctoritate amplissimi Philosophorum Ordinis d. 9. nou. 1766. disputauit M. IOANN. GOTTHELF HERMANN. Med. Bacc. respondente *Joh. Dan. Reichel.* Lipsiae, ex officina Breitkopfia, 4. mai. plg. 8.

Cum contigerit Cl. Auctori, varia videre musea corporum naturalium in itineribus susceptis, ac permultas colligere obseruationes, quae eorum conseruationem concernant: commotus est, ad hanc dissertationem scribendam, in eaque varios modos conseruandi musea in genere proponendos. Praemissis itaque causis praecipuis, quibus musea destrui solent, varias denique methodos his occurrendi describit, et omnia variis exemplis illustrat. Nos praecipua tantum hic breuiter indicaturi sumus.

p. 3. Cohaesio partium minimarum omnium corporum trium naturae regnorum pendet a glutine, quo  
vel



vel imminuto, languescunt corpora viua; vel dissipato, destruuntur corpora mortua. Generalis vero destructio varia est: etenim putredo humida inuadit praesertim animalia, sicca vero inprimis vegetabilia, cui analoga est fatifcentia mineralium, vappescencia liquorum fermentatorum et rancor oleorum. Ipsius aeris externi elastici et interni fixi aequilibrium sublatum destruit corpora, atque ob admixtas partes vt menstruum agit, eaque vel laxiora, vel firmiora citius tardiusue soluit. Huc pertinent porro insecta, quae ouula sua corporibus naturalibus immittunt, e quibus vermiculi gignuntur, qui, cum larga ibi inueniant nutrimenta, sua erosione horum destructionem efficiunt. Situs vel mucor, siue plantulae corporibus putridis incrementum, etiam ad eorum causas destruentes referendae sunt. p. 5.

In adiumentis eorum conseruationis inprimis ad duo respiciatur, scilicet ad conseruationem vel siccam, vel humidam. Prior tum demum locum habet, postquam partes, corruptioni prae reliquis obnoxiae, remotae sunt, v. c. carnes, viscera, cerebrum, oculi, cet. in regno animali, vel succi vegetabilium adeoque mineralium. Altera ope liquorum fermentatorum peragitur, quibus corpora naturalia immittuntur. Vt museum ad cauendam corruptionem apte disponatur, eligantur conclauia, quae non humida sunt, saltem ibidem saepe mutetur aer: vitetur solis ardor nimius, calor artefactus immoderatus, ac transitus aeris perpetuus adhibeatur, inprimis mundities, atque, ne forte insecta noceant, immittantur v. c. quadrupeda, aues, mense praesertim maio et augusto in furnum, eo caloris gradu seruato, qui nec pilos, nec pennas vrat: sic enim insecta vna cum ouulis destruuntur: in herbariis viuissaepe reiciantur chartae humidae, et plantae vermibus iam laesae. p. 11.

- p. 16. Ab animalibus, quadrupedibus inprimis pelles et ossa sceleti seruantur, reliquae partes, putredini maxime obnoxiae, remouentur. Docet itaque Cl. Auctor methodum excoriandi quadrupeda, additque cautelas necessarias ac enchireses, et ostendit simul compositionem eorum sceletorum. Progreditur deinde ad auium excoriationem, quarum maiores vel duplici incisione, ab ano iuxta femora ad alas adscendente; vel simplici, a fine sterni usque ad anum ducta incidit: minores, visceribus exemptis, per aliquot dies spiritu vini imbuunt, posteaque siccat: oua auium euacuat, foraminulo in vtraque extremitate facto. Pisces maiores, uti quadrupeda, excoriandi sunt, incisa nimirum cute sub ventre ad totam animalis longitudinem: pisces molliori cute praediti, exemptis visceribus, in spiritu vini seruantur: ii cute squamosa diuidantur medii ab ore usque ad caudam, et cutis cum capite, exemptis cerebello et oculo, chartae crassae imposita siccat.
- p. 21. Reptilium, serpentum, testudinum, echinorum marinarum et stellarum marinarum excoriationem deinde explicat. Diuidit postea rationem exsiccandi, quae vel calore moderato in umbra, vel vehementiore in furno perficitur. Pelles vero quadrupedum, auium, animalium marinarum, serpentum, cet. detractae, prius, quam exsiccentur, sunt praeparandae, cuius varia ratio hic amplius describitur. Accedit Noster ad insectorum exsiccationem, quae ratione conseruationis diuidit in duas classes, in molliora pulposiora v. c. erucas, vermes, millepedes, cet. et in duriora, v. c. scarabaeos, cicadas, scorpiones, quorum alia, ut papilioes, pulvere; alia, ut scarabaei, scutis duris teguntur. Ne vero papilioes splendore alarum priuentur, melius est, hos ex eruca educere, ac deinde illaesos museis tradere. Explicat itaque, quo modo nutriantur eru-



eruca, et qua ratione chrysalides ad vltimam vltimam transformationem feruentur: porro, quibus instrumentis commodis ea capiantur insecta, quae ex eruca educi non possunt. Indicantur postmodum variae methodi interficiendi insecta, inter quas imprimis commendat Cl. Auctor vsum lentis, vitreae in cuius foco insecta maiora caute tenet, donec levis fumus adscendat; minora vel ante, vel post focum collocat; sed et vapor aquae feruida, per tubulum infectis applicatus, haec sine noxa necat. Adduntur cautelae, quibus insecta et in iustum situm partium redigantur, et affigantur.

Differitur postea de plantarum exsiccatione et p. 28.  
conseruatione, in qua imprimis caueatur, ne forma naturalis plantarum, nec singulae earum partes, nec ipse color nimis mutetur, ac illa mucilago aromático spiritiuosa conseruetur, qua post exsiccationem flexiles permanent. Exsiccatio plantarum vel compressione, vel sine hac peragitur. Priore modo comprimuntur plantae charta grisea obiectae, vel prelo, vel, vti Cl. ADANSON suadet, corpore humano insidente. Alter modus tantum in plantis durioribus v. c. xeranthemo, gnaphalio, locum habet, vt nimirum planta fundo vasis imponatur et arena circumducta in furno siccentur. Musci marini, fuci et corallinae prius in aqua dulci edulcorentur, quam inter chartas siccentur. Plantae siccatae non agglutinentur chartae, sed potius caulis segmento chartae in parte inferiori vel acu aut filo affigatur. Explicatur deinde, quomodo partes quaedam vegetabilium separatim siccentur. p. 34.  
Fructus pulposiores in spiritu vini seruantur, et antea in aqua macerantur, vt dispositio vasorum conspiciatur: sicciores in furno caute siccantur, ne dehiscant: scelela fructuum vel ope naturae, vel maceratione in aqua  
X § paran-

parantur. Quae in foliorum maceratione sunt attendenda, hic ulterius enarrantur.

**p. 38.** Tractat Cl. Auctor deinde de modo infarciendi exuias animalium. Quadrupedum pelles, quarum praeparationem iam describit, sunt replendae variis rebus, ex tribus naturae regnis desumendis. Regnum animale suppeditat v. c. pilos, lanam, ungularum vel cornuum raspaturam: vegetabile cannabim, stuppam, linum, foenum, stramen, cet. minerale turfam s. terram cespitosam; semper vero caueatur, ne corpora eligantur, quae humiditatem attrahant, ac simul adiiciantur antiseptica, v. c. camphora, asphaltum, calx viua, alumen, cet. Ad formam corporis animalis retinendam, conficiatur forma corporis ex dura re, cuius spatia relicta mollioribus rebus impleantur: fila ferrea, apte disposita, etiam inseruiunt ad sustinenda membra animalis in situ idoneo. Varias deinde methodos hinc illinc collectas enarrat infarciendi aues. Porro progreditur ad liquores balsamicos, corporibus illinendos, ut defendantur ab aeris vi et insectorum laesione. Obductio autem vernicis tantum locum habet in animalibus repentibus, squamosis, glabris, splendentibus, v. c. serpentibus, lacertis, piscibus variis, scarabaeis. Bonus vero vernix colorem animalis minime mutet, facile siccescat, transpareat, minus fragilis sit. Varias deinde vernicum formulas describit. Sed et reliqua corpora, quae vernice obduci non possunt, ab aeris vi tuenda sunt, ut

**p. 43.** quadrupeda, aues, insecta varia: ostendit itaque modos, quibus haec corpora, inprimis insecta, in cistulis et receptaculis disponantur.

**p. 51.** Transit deinde ad conseruationem corporum naturalium in liquoribus, eorumque differentiam ostendit; eligantur vero praecipue liquores minus vehementes, vel aqua diluantur, ne vel corpora immis-



immissa nimis constringant, vel nimis volatiles sint. Postremo modos, euaporationem nimiam liquorum p. 56. conferuariorum cauendi describit, quod vel sigillo hermetico, vel oleo inspissato, quod fundum vasis inversi petit, peragatur; vel ope suberis, orificium vasis arcte claudentis, quod amalgamate obduci potest. Melior est obturatio vasorum ope epistomiorum vitreorum, vel subere, quod membrana, oleo humefacta, circumdetur, ac variis lutis vel alia tenaci massa agglutinetur.

## XXI.

Mémoires sur différentes parties des sciences et arts. Par M. GUETTARD, de l'Académie Royale des sciences. Tome premier, à Paris, chés Laurent Prault, libraire. 1768. 4 mai. alph. 2. plagg. 10. cum praefat. plagg. 15. et tabb. 18. aeri incisis.

i. e.

Commentationes super variis partibus disciplinarum et artium, Auctore Cl. GUETTARD. Tom. I.

Quas hic edidit Cl. GUETTARD commentationes, eum in finem elaborauerat, vt successue commentariis regiae academiae scientiarum infererentur. Cum autem praeuideret, ob multitudinem sociorum, qui in edendis his commentariis concurrunt, illarum propalationem multum retardatum iri: consilium cepit eas in aliquot tomis seorsim edendi, ita, vt primo loco observationes singulares poneret, ac iis demum integros commentarios

rios subiungeret; eodem modo, vt academiae scientiarum moris esse solet.

- Praef. Primo igitur loco obseruationes quasdam ex  
 p. 68. physica generali inuenimus. Vidit Cl. Auctor, quod NEWTONVS olim, radiis solaribus ab acie cultri exceptis, obseruauerat, eosdem radios matutino tempore versus castellum ad Vicenas impulsos diuergere, ac dum reflectebantur, duos fasciculos formare, qui diuergentes spatium inter se relinquiebant ad minimum vnus pedis. Copiosa est descriptio ascensus vaporum in montibus elatioribus, quales sunt Tirolenses et Vogesus, et quomodo ii in nubes coeant, vbi Cl. Auctor putat, si accuratae et continuatae fierent obseruationes, nubium eiusmodi origines, certis legibus constitutis, praedici posse: eiusmodi obseruationes potissimum pictorum vsibus inseruituras, qui adeo saepe in depingendo horizonte errare conspiciantur. In eodem Vogeso monte tonitru obseruauit non vno impetu erumpens, sed repetitis, at per parcissima interualla, ictibus, vt adeo materiae inflammabiles, in nubibus haerentes, non vna, sed successiue inflammarentur: qua occasione varias quaestiones, in declaranda tonitru origine adhuc enodandas, proponit, et suadet, vt experimenta electrica in summis montibus tum praecipue instituantur, cum vapores humidi ascendunt.
- p. 76.
- p. 78. Ad praecauendos funestos effectus, qui sepulturam cadauerum in templis sequuntur, exemplum Germanorum atque Polonorum ciuibus suis imitandum proponit, qui in sarcophagis conficiendis curatius versantur, quam Galli, ita, vt nulla pateat apertura, per quam teter odor exhalare queat: porro cadauera ope syringae, in intestina atque oesophagum immisissae, pice liquefacta repleri, eadem totam



totam externam superficiem obduci, postea linteis arcte inuolui, ac denique fundum sarcophagi calce viua obtegi, ac, postquam cadauer in illo reconditum fuerit, eadem, quicquid superest spatii, repleri iubet. Tandem monet, ne cryptae sepulcrales orificio in ipsum templum patulo instruantur, sed illud extrorsum patere oportere monstrat, et de auxiliis, renouando aeri inferuentibus, varia monita addit.

Ex historia naturali recenset, in omnibus haren- p. 85.  
gis, quibus per tempus quadragesimale 1765 vescebantur Parisienses, inuentas esse ascarides, crassitie et longitudine acus; ex harum tamen esu nihil incommodi in sanitatem hominum redundasse, adeoque videri posse, cuius animalis esse insecta sibi propria, quae in alio quouis corpore viuere non possint.

In *xiphia* dentes, quibus rostrum eius armatum p. 86.  
est, numero insigniter variare, pluribus exemplis ex museo ducis Aurelianensis, cui praeest, euincit. Neque ergo iidem distinctionis specificae fundamentum constituere, neque certum de aetate piscis indicium praebere possunt. Vfus quoque eorum magis in defendendo consistere videtur, quam in tenenda vel dilaceranda aut comminuenda praeda.

Ex botanica recensetur historia *mali aurantiae*, p. 89.  
quae per totam trunci longitudinem diuisa, tamen singula parte, probe cera molli obducta, rursus convaluit et incrementa cepit: quam rem vltioribus experimentis confirmandam commendat, cum eo modo facilius arbores multiplicari possint.

Fieri posse, vt planta, cuius olim maximus in p. 92.  
loco aliquo prouentus fuerit, nunc in eodem plane exoleuerit, exemplo loci cuiusdam in sylua prope fanum

- fanum f. Dionysii monstrat, in quo, superiore seculo ad finem vergente, insignis tuberis copia crevit, quod nunc plane non adest. Mittimus alias observationes minores, quae incrementum plantarum in foliis cet. spectant. Quod Cl. DELISLE, pharmacopoeus Stampiensis, olim ex relatione academiae scientiarum observauerat \*), intra squamas radices scillae vera germina futurae plantae delitescere, Cl. Auctor quoque conspexit, idque toti classi liliacearum peculiare putat, ita, ut eo modo propagatio earum adiuvetur, quum rariores iisdem rami a natura sint concessi. Tandem observata quaedam de effectu frigoris in plantas subnectit.
- p. 99.
- p. 103. In observationibus chemicis primo loco de filamentis seu floribus ferri (*laine de fer*) agit, qui sublimantur, cum ferrum ex duabus in Occitania fodinis funditur ac postea malleo subigitur. Quae minerae quum prope alias reperiantur, quae teste Cl. HELLOT cuprum, plumbum et antimonium contineant, probabile est, hos flores non ferro, sed antimonio adscribendos esse. Sequitur proluxa enarratio vegetationis chemicæ, seu dendritarum, per solutionem salium enatorum.
- p. 105.
- p. 109. Porro de exsiccatione plantarum agit, cuius eam forte esse legem generalem coniicit, ut id, quod planta exsiccando perdet, sit in ratione inversa quantitatis perspirationis quotidianæ, et sic vice versa. In experimento capto radices *symphyti* multo plus ponderis sub exsiccatione perderunt, quam folia eiusdem plantae: quod a structura priorum spongiosiore repetendum est. Se-
- p. 111. mina *nicotianae* fere quintam partem totius ponderis olei expressi largita sunt, cuius ergo disquisitionem commendat, annon exinde utilitatis quidquam obti-

\*) v. comm. horum Vol. IX. p. 375.



obtineri possit, cum semina ista velut inutilia reiici soleant. Ex oleo lini et oleo vitrioli inter se mistis, p. 112. ac post aliquot dies destillationi subiectis, relicta est in fundo cucurbitae massa bituminosa, bitumini minerali similis, cuius origo forsan ab iisdem substantiis, sub terra concurrentibus, nempe acido vitriolico et substantiis oleosis ex putrefactis vegetabilibus relictis, adscribi posset. Ex capitibus papaveris albi extractum solidum paratum fuit, iisdem, p. 113. ut verum opium, proprietatibus insigne, sed multo mitioribus. Enarrat simul, seminum papaveris frequentem usum esse in Persia, Italia, Polonia, imo etiam Argentinae, in cibis, sine noxa sanitatis: ideoque videri, deesse in his regionibus plantae isti vim volatilem, quae licet vix sensibus percipi queat, tamen vere adsit, sub leuissima autem mutatione evanescat: quod exemplo *Iatrophae* seu *Cassauae* Americanorum et *Mannae*, quae destillatione saporem ingratum et nauseosum, sed multum simul virtutis purgantis perdit, illustrat.

Solutio vitrioli coerulei, pulveri cretae superfusa, massam pultaceam sistebat, quae altero die ita fermentescebat, ut super marginem vasis se eleuaret; aequalis autem solutio vitrioli viridis, aequali portioni cretae superfusa, massam quiescentem reliquit: an haec diuersitas a difficiliore solubilitate vitrioli coerulei pendeat, Cl. Auctor non dirimit. p. 116.

Ex anatome sistitur descriptio piscis cuiusdam p. 117. ex cetaceorum classe, qui subinde prope maritimas Galliae oras capitur, et cuius caro ad excoquendum oleum impendi solet. Descriptionem hanc acceptum debemus Cl. SERARD, medico Caletano, et BLONDEAU, professori hydrographiae in eadem vrbe: eandem nunc repetere prolixum nimis foret, quare id tantum notamus, animal istud vel  
physi-

*Physeterem macrocephalum* iuniorem, vel varietatem eiusdem, formae minoris, habendum esse. Hoc autem attentione dignum videtur, sub cute crassa ac dura, huicque subiecta magna lardi copia, enormem quantitatem neruorum positam esse, quorum origo videatur esse in tertia parte distantiae capitis a medio corpore, et qui varia sub directione, strato super strato posito, fere totam substantiam carnis efficiant, intercedente contextu celluloso, qui substantiam partim aquosam, partim oleosam contineat. Longitudo totius corporis ab ore usque ad bifurcationem caudae 48 pedes aequauit, et peripheria eiusdem in regione penis (qui truncatus 45 librarum pondus habuit) 36 ; ex quibus reliquarum partium proportio, accurate hic enumerata, suo iam modo colligi poterit.

p. 122.

Ex medicina vnica obseruatio adiungitur : ad hydrophobiam nempe suadet Cl. Auctor, vt liquor iste volatilis, quem *l' eau de luce* vocant, guttatim diuersis temporibus, et potissimum versus accessum paroxyfmi, ex aqua communi exhibeatur, vulnusque ipsum, scarifatum antea, hoc liquore eluatur. Quod remediorum genus etsi nondum tentatum; tamen ob analogiam tentari posse asserit, cum eiusdem vsus in viperæ morfu sit declaratus.

p. 1.

Progredimur nunc ad integros commentarios, quorum primus ossa quaedam fossilia describit, quae in variis Galliae locis, partim in silicibus, partim in terra locorum montosorum, partim inter strata sabulosa, partim inter alia petrefacta v. c. conchitas cet. inventa fuerunt, et quorum icones nouem tabulas implent. Omnia sunt substantiae calcareae, licet multa ex iis cum externa facie, tum duritiae silicem igniarium mentiantur : coloris plerumque exterius flauescentis, inte-



interius obscure fusci. Primum os sistit mandibulam, in qua dens adhuc haeret, in lapide gypseo; secundum est vertebra, bene adhuc conseruata, in simili lapide; tertium, scapula in simili lapide; quarto loco sistuntur in simili inuolucro nouem costae, quarum priori adhuc vertebra adnexa est. Haec omnia, crusta lapidea obducta, partes piscium esse, extra dubium positum est.

Sequuntur nunc aliae partes in lapidem conuersae, quae vero absque adhaerentibus aliis lapidibus detectae sunt: duae vertebrae insignioris molis, certe quoque piscium; os quoddam, vel eiusdem portio, difficilioris indaginis (an forte ad ossa capitis pertinens, ut saltem iconem intuenti videri posset?); pars ossis longi, cum apophysi: aliud os incognitum ex insula s. Dominici, ex lapide albo calcareo extractum, quod videtur scapula piscis cuiusdam; ossis cuiusdam longi pars, cum eius capite, ut videtur; duae aliae ossium longorum partes, ex diaphysi, ut videtur; tres partes costarum, vel forte dentium piscis cuiusdam, quarum tertia potissimum denti *manati* admodum similis est; ac demum duo ossa incognita, quae vero vertebrae piscis cuiusdam esse verisimile est: et posteriorem quidem pro atlante Cl. Auctor, licet coniectura tantum, habet. Hoc autem pro certo assumit, ossa haec omnia ex piscibus aut animalibus marinis esse, ad quod probandum argumentis satis validis utitur, quae vero repetere breuitas nos prohibet.

Commentarius secundus de *Tirsa* Cofaccorum p. 19.  
 agit. Planta est Vcraniae indigena, cuius femina tamen cum Cl. DUFAY ad Cl. Auctorem misisset, eadem laete in Gallia creuit: digna propterea, quae oeconomis commendetur, cum aequè in foeno, ac  
*Sec. Dec. Suppl. II.* Y in

in feminibus gratissimum equis pabulum praebeat. A fasciculis foliorum, ex radice protrusis, formatur vagina culmum ambiens, ex qua emittuntur folia linearia, subulata, prismatica, canaliculata, margine nonnihil aspera, in superiore superficie tenuissimis pilis obsita: ex quorum medio surgit culmus duorum ad minimum pedum altitudinis, in duas paniculas se diuidens, quarum altera post alteram euolvitur: succedunt quoque aliae secundariae paniculae ex culmo ipso, sed breuiores, et parcioribus floribus instructae. Habitus affinis esse videtur aenae, a qua tamen multum omnino distat. Paniculae sunt laxae, ramulisque, huc illuc dispersis, locustae vniflorae adhaerent: calix constat duabus glumis oblongis, apice aristatis; folliculus vnivalvis, inferius et ad latera pilis obsessus, superius in vno latere oblonge excissus; stamina tria, filamentis brevibus, antheris superius et inferius bifurcatis, vt in arundine; stili duo, breuissimi, stigmatibus plumosis, florem coronae instar cingentibus; semen oblongum, corollae longitudine, superius arista longissima, cylindrica, spiculis minutissimis obsita, primum apice nonnihil inflexa, in maturitate vero in lineam rectam se extendente, terminatum: quae ideo rectius semini, quam corollae attribuitur, cum illi adhuc adhaerent, si ipsum a corolla iam secessit. Ex hac descriptione, collatis *Aenae*, *Aristidae* et *Stipae* characteribus, patet, plantam hanc, nisi nomen inde genus sub nomine *Tirsaе* constituere malueris, nullibi melius, quam sub *Aristida* stare posse; nonnihil quidem cum *Aristida adscensionis* conuenire; aliis tamen momentis, quantum ex icone PLUKENETII iudicare potuit Cl. Auctor, ab eadem recedere: quare eam dicit *aristidam paniculis ramosis, spicis sparsis, corollae arista longissima insidente, foliis subulatis*; et ita forte characterem genericum *Aristidae*



*fidae* paullum mutandum esse monet. Icones additae descriptionem egregie illustrant. Tab.X.  
XI.

Commentarius tertius de ossibus fossilibus animalium terrestrium exponit. Ante aliquot annos insignis eorum numerus prope Stampas effossus est; sed ob incuriam et ignorantiam inuentoris neglectus et rursus saxis obrutus, adeo, ut non, nisi eorum ossium Cl. Auctor particeps fieri potuerit, quae postea detecta fuerunt, quae sollicite et accurate describit atque iconibus adiectis illustrat. Dolendum est, nulla ossa capitis, si a duabus portionibus maxillae inferioris inhaerentibusque iisdem dentibus recesseris, reperta esse, ex quorum consideratione forte melius de determinando genere animalis statui possit. In genere pauca ossa integra fuerunt. Sunt multa fragmenta cornuum, costarum, scapularum, et ossium extremitatum, et aliquot vertebrae integrae. Vix non omnia haec ossa animalibus ex cerui genere competere videntur: vnum alterumue forte ad oues pertinere possent. Occasionem, qua factum sit, ut tantus numerus in eodem loco coaceruatus fuerit, neque insigniori telluris mutationi, neque inundationibus Cl. Auctor adscribit, sed sacrificiis solemnibus, a priscis Galliae incolis peractis, quum constet, insignem copiam animalium sacro ritu quotannis occisam, eaque vel penitus combusta, quae holocausta, vel vna defossa, quae immolationes dicebant, fuisse. Neque, ubi ossa maioris molis deprehensa fuerint, illa statim elephantis vel hippopotami credenda esse monet, sed vris adscribenda putat, qui forte tractu temporis, regionibus cultioribus redditis, sensim degeneraverint atque a priori magnitudine defecerint. Varia deinde ossium fossilium exempla ex diuersis scriptoribus excitat, et quantum veri vel falsi horum relationi-

p. 29.

Tab.  
XII-  
XVI.

tionibus inſit, diiudicat : ac denique indicem ſcriptorum, qui de hoc argumento expoſuerunt, ſubiungit.

p. 80.

Commentarius quartus de corpore quodam agit, quod polypum terreſtrem putat Cl. Auctor. Inuenit illud ante 22 annos prope Aquilam, neque alio poſtea tempore, neque aliis in locis, in foliis *Spergulae aruenſis*, cuius glandulis cupulatis, quas olim in hiſtoria glandularum plantarum deſcripſerat, copioſiſſime inſidebat et adhaerebat ; neque ulli alii plantae vicinae idem corpus inſediſſe animaduertit. Paruitas eius tanta eſt, vt oculos nudos fugiat, qui, quum magna eius copia in vno loco haeret, nonniſi maculam albam diſcernere queunt, quam facile *Byſſum* vel ſimilem plantam putares : et microſcopio non mediocri uſus Cl. Auctor paruum filamentum, quartam vel dimidiam partem lineae magnitudine aequans, conſpexit, in varia alia minora filamenta, extremitatem ſuperiorem circulari modo cingentia, terminatum, coloris egregie albentis, motu admodum viuido : os quidem ob ſummam exiguitatem nullum detegere potuit ; eandem tamen ipſius, ac aliorum polyporum, qui in aquis dulcibus viuunt, rationem eſſe, analogia ſuadet. Deſcribit poſtea modum, quo polypi iſti inter ſe cohaereant : veſtigia quoque nonnulla orientis iunioris polypi, et ouulorum in apice glandularum, animaduertit, quamquam de poſterioribus ipſe dubium fouet, qui fieri poſſit, vt in planta annua ouula iſta feruentur. In praefatione, mentione huius commentarii facta, varias obſervationes de differentia motuum in polypis et variarum plantarum, v. c. marchantiae, lungermanniae, anthocerotis, conferuae, tremellae, ſpeciebus obſervatorum proponit, hiſque ad declarandam ſuam de polypo hoc terreſtri ſententiam utitur.

Com-



Commentarius quintus amplissimus est, et con- p. 91.  
tinet historiam porcellanae Gallicae. Scripta, quae  
hic collecta sistit Cl. Auctor, in variis iam antea dia-  
riis Gallicis dispersa in lucem prodierant. Notum  
est, Chineses ad conficiendam porcellanam uti la-  
pide quodam, quem *pe-tun-tse*, et terra, quam  
*Kao - lin* dicunt. Dux Aurelianensis haec duo  
mineralia ex China apportari iusserat, quibus  
inspectis, Cl. GUETTARD monstravit, similia in  
Galliae variis locis prostare: quare idem Dux, pro  
singulari erga artes amore, tractum quendam, ubi in-  
signis eorum inueniebatur quantitas, coemit, et, fur-  
no prope vicum Bagnolet exstructo, iam res eo re-  
dierat, ut porcellana indigena confici posset, cuius  
tentamina Chinesem perfecte aequasse Cl. Auctor  
affirmat. Sed mors principis haec conamina o-  
mnia irrita reddidit. Cum autem Noster hanc hi-  
storiam in confessu academiae scientiarum publici  
iuris fecisset, exorta est acerrima controuersia, cum  
partim Ill. COMES DE LAURAGUAIS sibi in-  
ventionis gloriam vindicare anniteretur, partim Cl.  
GUETTARD, Cl. VALMONT DE BOMARE re-  
prehendisset, quod causam cohaesionis in parte  
argillacea terrae *kao-lin* posuisset, quae tamen  
ex mente Nostri lapidi *pe-tun-tse*, ex vitrescentium  
classe, competeret; item quod prior in *kao-lin* ad-  
mixtam terram calcaream statueret, Noster e con-  
trario eandem puram argillaceam, vel saltem mi-  
cae particulis remixtam, perhiberet: insurgentibus  
interea defensoribus Cl. DE BOMARE, TOR-  
CHET DE S. VICTOR et ROUX; ac utram-  
que sententiam inter se conciliare annitente Cl. DE  
LA PERRIERE DE ROIFFE. Totam hanc  
controuersiam repetere, et ab instituti nostri  
breuitate alienum putamus, et ea nos potius Lecto-  
res nostros offensuros, quam delectaturos veremur.

p. 227. Quare protinus ad commentarium sextum progredimur, qui de materiis, ad chartam scriptoriam conficiendam aptis, exponit, et iam ante plures annos diario oeconomico insertus fuit. Tentamina Cl. SCHAEFER \*) Nostro nondum innotuerant, cum hunc commentarium scriberet. Postquam historiam inuentionis chartae scriptoriae tradidit, varias plantas ex palmarum, graminum, liliacearum, amentacearum, incompletarum, maluacearum, atque algarum classibus considerat, quae ex testimonio Auctorum huic operi inferuire putatae fuerunt: postea paleas, sub cannabis et lini praeparationibus deciduas, (*chénévettes*) capiendis tentaminibus commendat, et instituta a se Ipso in tomentis variarum plantarum v. c. lanugine, semina *gossypii* inucluyente, pappis carduorum cet. experimenta recenset. Substantiam sericam *apocyni* tentare nondum potuit. *Conserua* in lacubus coagmentata, quum hi exsiccati fuerint, chartam satis densam exhibet; experimenta tamen Cl. Auctoris non satis bene cesserunt; putat autem, rem melius actum iri, si forma plagulae chartae non per immersionem, vti consueto modo fit, sed per compressionem efficiatur. Cum Chinenfes dicuntur ex serico chartam conficere, tentauit Cl. Auctor folliculos phalaenarum huic vsui adhibere, quod negotium aliquo modo eidem cessit; sed minore horum folliculorum copia instructus, non, nisi mortario minore, ad eos contundendos et aqua subigendos vti potuit, et sperat, melius negotium processurum, si ii in machina ampliore, quo in officinis chartae conficiendae lintea conquassare et in pultem redigere solent, praeparentur. Neque earum phalaenarum folliculos excludit, qui his pilos suos intertexere consueverint: satis nimirum inde lucri exoriturum autu-

mans

\*) v. supra p. 293.



mans, si vel sola charta emporetica inde confici queat.

Commentarius septimus experimenta enun-  
rat in variis speciebus argillarum coloratarum (*glais*), arenarum et diuersorum lapidum capta, vbi mutationes sub vario ignis gradu ratione consistentiae, coloris, et potissimum particularum martialium, obuenientes sollicitè et curiose obseruauit Cl. Auctor; quae vero in compendio contrahi se non patiuntur. Mineralia haec omnia ex Gallia deprompta fuerunt. p. 254.

Octauus sistit obseruationes mineralogicas, in  
Polonia per annos 1760, 1761, 1762 et priores  
mensēs 1763 captas, primum a Cl. GUETTARD,  
et post eius discessum ex hoc regno a Cl. DEL-  
SUC abbate; quarum summam iam commentariis  
academiae scientiarum anni 1762 \*) inferendam  
Noster curauit. p. 273.

Commentarius nonus isque vltimus de minera-  
logia Italiae exponit. Nota est hypothesis Cl. Au-  
toris de variis regionum diuisionibus, quae zonae  
(*bandes*) Ipsi dicuntur, cui olim iam systema mine-  
ralogiae Galliae atque Angliae superstruxit \*\*).  
Eodem nunc modo Italiam considerat, chartam geo-  
graphicam huic vsui inferituram successu tempo-  
ris se editurum pollicetur, et propediem similem  
Germaniae nostrae descriptionem confecturum  
spondet. Iam cum ipse numquam viderit Italiam,  
disquisitionem mineralogicam huius regionis com-  
misit Cl. ROLANDO DAUBREUIL, et qui eum  
Y 4 comi-

\*) vid. comm. nostr. Vol. XV. p. 468. seq.

\*\*) Hist. et Mém. de l' Acad. Roy. des scienc. année  
1746. p. 363. v. comm. nostr. Vol. I. p. 298.

comitabatur Cl. GUENÉE, eloquentiae quondam in collegio Plessiaco vniuersitatis Parisiensis professori, qui Ipsi iam in pluribus itineribus mineralogicis per Galliam comites fuerant. Hi viri mense aprili 1762 iter exorsi sunt per meridionalem Galliam, et inde naui Genuam profecti maximam Italiae partem peragrarunt, ac Germaniae partes quasdam emensi, cum in eo essent, vt in Prussiam se conferrent, Lipsiae commorari coacti sunt, vbi Cl. DAUBREUIL die 21 septembris 1763 variolis confluentibus exstinctus est, nondum expleto vigesimo primo aetatis anno. Quicquid in toto itinere a Lugduno vsque ad Oenipontem notatu dignum, quantum ad terrae et lapidum strata, ad fontes, fluvios, lacus, montes, imo quoque ad varium vsum mineralium in vita communi spectat, occurrit, sedulo hi peregrinantes consignauerunt, quorum relationem Cl. GUETTARD ex aliis auctoribus, Cll. GROSLEY, NOLLET, ADDISON, DE LA CONDAMINE, cet. illustrat et descriptionem mineralogicam insularum, in vtroque latere Italiae adiacentium, quas nostri peregrinantes non attigerant, ex aliis scriptoribus addit, de Sicilia opere PETRI DEL CALLEIO Y ANGULO \*) de Corsica Cl. IAUSSIN \*\*), de Sardinia BLASII CARYOPHYLLI \*\*\*) et SALUATORIS VITALIS \*\*\*\*), et de mari Adriatico Cl. ALLIONI \*\*\*\*\*), praecipue vsus. Nos, quum exactam relationem de singulis notatu dignis rebus, quas in Italia obseruatas commemorat Cl. GUETTARD, tradere nequeamus; pau-

\*) Description de la Sicile, Amsterd. 1734. 8.

\*\*) Mém. sur la Corse, Lauf. 1758. 12.

\*\*\*) De antiqu. auri, argenti, etc. fodinis, Vienn. Prag. et Tergest. 1757. 4.

\*\*\*\*) Annal. Sardin. Florent. 1639.

\*\*\*\*\*) Essai sur l'Histoire naturelle de la mer Adriatique traduit en Franc. à la Haye, 1758. 4.



pauca tamen quaedam excerpamus, quae attentionem horum virorum prae reliquis declarasse nobis visa sunt. Cl. TARGIONI terras et arenas Florentinas examinat, ad porcellanam inde parandam.

Nimis forte generale est, et exceptiones quas p. 362.

dam, quantum nos iudicamus, admittit effatum

Cl. GUENÉE: ubicumque aquae sulphureae scatur p. 365.

riant, ibi etiam lapides colore albo gaudere. Fuerunt, qui huic Cl. Viro persuaderent, in ruderibus p. 368.

obrutae urbis Pompeiae repertas fuisse fenestras ex vitro, non ex lapide speculati, quo veteres usos fuisse constat, confectas: inque variis huius urbis subterraneis locis esse vaporem lethiferum similem illi, quem notissima cauerna canum emittit. Puteolis templum olim Serapidi sacratum per longum p. 370.

tempus ad altitudinem quandam mari immersum fuisse putandum est, cum columnae eiusdem foraminibus rotundis perforatae conspiciantur, quae Cl. GUENÉE opus pholadum existimat. Copiose

variae formae ac texturae lanae describuntur, qua-

rum memoratu dignissimae etiam iconibus expres-

tae sistuntur. Ea species, quae coloris pallide sul-

phurei est, quamquam teste Cl. NOLLET ex ea

dem sulphur praeparatur; tamen eius praesentiam nec prunis iniecta, nec in puluerem redacta, probat: quare sine dubio ad hoc inde eliciendum constantiore et fortiore ignis gradu opus est. Via Appia et Latina, ex lapidibus nigris confectae, eandem p. 377.

adhuc perfectionem obtinent, quam olim, cum exstruerentur; quod iam Cl. GROSLEY miratus est.

Copiosa est descriptio fodinarum aluminis prope p. 382.

Tolfam, et officinarum, in quibus idem excoquitur. Inuentionem harum fodinarum tribuunt cuidam ex seruitute Turcorum profugo. Cauernam serpentum prope Centumcellas Cl. GUENÉE con-

spexit, et virtutes medicas non linctui serpentum in ea

hab-

Tab.

XVII.

XVIII.

- habitantium, sed vaporibus sulphureis adscribendas
- P. 387. esse monet. Montem Soracte perpetua niue obtegi, ex propria obseruatione negat. Ciuitatem Cap.
- P. 388. stellanam, quamquam sufficienti copia aquae instructam, tamen aquae ductum construere septem vel octo miliarium (italicorum) longitudine, qui 30000 imperiales romanos constet, obstupuit.
- P. 391. Cataractam Velini prope Interamniam prolixè describit, cui forte labori superfedere potuisset, si, quae KEYSLERUS \*) iam tradidit, ipsi innotuissent.
- P. 397. Prope Rauennam vitis copiose inculta crescit, in regione humida; quam vero olim cultam fuisse, antequam inundaretur, probabile est. Cl.
- P. 399. SPADA non, nisi triginta quinque species marmorum Veronensium numerat; Cl. GUENÉE autem eas ad ducentas et quinquaginta ascendere affirmat. Ingens in montibus huius regionis est copia corporum marinorum fossilium, quorum collectionem asseruat Cl. MORANI, pharmacopoeus Veronensis.
- P. 407. Inter Allam et Roboretum horrenda est facies faxorum ingentis molis, quae ex marmoribus, granitis et schistis a sole exustis, vel ab aeris efficacitate fatiscentibus et in puluerem versis, et omnis generis lapidibus huc delatis compacta sunt, ita, vt quoddam illorum 50 ad 60 pedes altitudine aequet. Quae de insulis Italiae ex supra memoratis Auctoribus adducuntur, nunc mittimus. Neque ea ita comparata esse, vt inde completa cognitio mineralogica harum regionum peti queat, ipse Cl. GUETTARD fatetur.

Ex his autem omnibus concludit, quamuis difficile sit certi quidquam hac in re inuenire, quum montium igniuomorum eruptiones tellurisque motus mirum quantum solum Italiae mutauerint; vero

P. 435. simile tamen esse, totum hunc tractum generatim in

\*) *Neueste Reisen* etc. Tom. II. p. 880. seq.



in tres zonas diuisum esse ; quarum prima lapides calcareos communes seu margaceos, secunda marmora, tertia granitas, schistos et metalla contineat. Prima fere totum tractum Apenninorum complectitur : extenditur nempe per totum fere Pedemontium, per Maurianam, et forte communicat cum regione margacea Heluetiae prope lacum Lemanium, et cum montibus Delphinatus et Occitaniae similis vtpote indolis : protenditur per totam Italiae longitudinem, per Siciliam et Capreas ; excludendae tamen sunt partes quaedam, v. c. Calabriae, Vicentini, Bergamensis, Taruifini, Foroiulienfis et Idrienfis territorii, quae metallicae sunt, et mons *Ciario* duodecim milliaribus Italicis a Placentia distans, qui petroleum continet : ac denique tractus quidam Pedemontii, in quibus schisti vel metalla inueniuntur. Secunda zona, per Albaniam, Dalmatiam, Morlachiam et Istriam, forte quoque vsque ad Tyrolensem comitatum extenditur ; in eius confiniis sunt aquae minerales et fodinae salis. Ex altera Italiae parte huc spectare videntur littora prope Genuam et Carraram, quibus intercedat communio cum montibus prouinciarum Galliae, supra dictarum. Tertia, montes sistit pone marmoreos sitos : itaque per Albaniam, Dalmatiam, Morlachiam, Istriam, Foroiulensem ditionem, Tyrolensem comitatum, Alpes, Occitaniam, Delphinatum extenditur, in schistis et granitis plurima genera metallorum fouens.

---

CAR. a LINNE', Termini Botanici explicati.  
Edit. noua auctior. Lipsiae, 1767. 8. pagg.  
39. cum praefatione.

**E**ditionem huius libelli Cl. SCHREBERUS curauit, primamque in multis locis emendauit, et auxit; quod et ordo hic obseruatus, et botanicum iudicii acumen manifeste docent. Cum omnes artis terminos ex Ill. LINNAEI operibus colligere studuerit, tironibus botanicis lexicon quasi quoddam, quo in herbationibus statim vtantur, ita tradit. Omnes breuiter et naturae rei conuenienter definit, atque a radice incipiens, omnes plantae partes, truncum, folia, fulcra, inflorescentiam, fructificationem, et alias quasdam ad vitam plantarum et definitionem earundem certiore pertinentes mutationes describit, numerumque terminorum septingentorum et duorum constituit.

Quamquam vero multi reperiuntur, a LINNAEO in philosophia botanica non definiti, quosdam tamen illic descriptos, neque hic recensitos, inuenimus. Quales sunt: radix horizontalis, perpendicularis; folium strictum, articulate pinnatum, seta glandulifera; folliculus, quatenus ad pubescentiam pertinet; spica secunda, disticha; et propago. Qui tamen omnes et alii in definiendis plantis et legendis libris tironi difficultatem parere possunt.

In nonnullis quoque a LINNAEO recessit Cl.

- p. 8. SCHREBERVS. Sic nudum et aphyllum truncum inter
- p. 13. se distinguit, vti quoque folium ellipticum et ouale,
- p. 12. quae tamen LINNAEUS coniungit. Folium *ad-*
- p. 20. *uersum* LINNAEI verticale dicit. Petiolum et pedunculum, quos LINNAEUS species trunci esse
- p. 34. proponit, ad fulcra refert. Conceptaculum LIN-



NAEI nomine folliculi insignit ; et bracteas folia p. 24.  
sequentis anni dicit, quod tamen nec LINNAEUS  
dixit, nec nobis ita videtur.

XXIII.

Nomenclator ex historia plantarum indigenarum Helvetiae excerptus. Auctore ALBERTO de HALLER. Bernae sumptibus societ. Typogr. 1769. 8. pagg. 216. praeter praefationem.

Vt etiam ii, qui historiam stirpium Helueticarum non possideant, nec sibi comparare velint, tirones potissimum, enumerationem plantarum Helvetiae promptam et succinctam accipiant, hanc magni illius, splendidi, et magnopere laudandi operis epitomen Ill. Auctor tradit, et nomina solum sua proponit, additque boni auctoris vel iconem, vel descriptionem. Nos vero, cum amplissimam et accuratam egregii illius libri recensionem supra \*) iam tradiderimus, hic breuiiores sumus, atque, ordine numeroque plantarum manente eodem, qui est in magno opere, ea tantum, quae vel passim emendata, vel addita, vel omissa sunt, notamus. Praeter ea enim, quod, quae in magno opere in appendice adiunctae fuerint plantae, hic suo quaeque loco inserta sit : in descriptionibus quaedam emendauit, locum in nonnullis natalem certiore indicauit, et nonnullas, de quibus prius iam dubitabat, hic certius definiuit.

Sic *Hypochoerin* (*Hypochoeris glabra* LINN.), n. 3. \*.  
quae nominata tantum est in historia stirpium, definit foliis glabris, semipinnatis, eamque in agris  
rarius

\*) vid. comm. nostr. Vol. XVI. p. 625.

- n. 77. rarius nasci affirmat. *Asterem*, (*Inula ensifolia* L.) de quo in priori opere dubitabat, non veram esse ciuem Heluetiae pronunciat. *Cardaminem*, quam 472 β. *tetrastemonem* in appendice prius dixerat, quatuor manifestissima et longa stamina, duo breuiora, et petala parua, longe petiolata habere nunc asserit.
- n. 720. *Galium*, misso Sibi a Cl. SCOPOLI specimine florente, quod Ille galium vernum \*) nominat, aliter, atque in historia stirpium Helu. definit; foliolis quaternis, glabris, ouato lanceolatis, racemis brevissimis, reflexis, aequalibus; et monet LINNAEI synonymum huius numeri ex historia stirpium eiciendum, florisque colorem album corrigendum, n. 745. et flauum substituendum esse. *Libanotidem* (n. 744. magni operis) foliis triplicato pinnatis, pinnulis primis decussatis, umbellis globosis, cum planta n. 801. quam in historia *selinum* esse ratus est, coniungit, eamque ligusticum, seruata priori definitione, ob calycem proprium et seminis figuram, nominat et post n. 757 ponit.
- n. 737.\* Nouae sunt: *Sanicula* (*Astrantia Epipactis* \*\*) SCOP.) inuolucris maximis, quinquefoliis, seminibus tuberculosis, quam rarissimam plantam, a Cl. SCOPOLI Sibi missam, in nota addita curate describit; denique ad finem addit zoophyton, spongiam ramosam fluuiatilem, polyspermam. Omissa 2487. n. 43. sine addita ratione inuenimus, *hieracium*, caule multifloro, foliis amplexicaulibus, pilosis, rariter n. 474. dentatis. *Cardamine* (*pratensis* L.) foliis pinnatis, n. 565. radicalibus subrotundis, caulinis linearibus. *Viola* (cenisia L.) radice multicauli, foliis petiolatis, ouatis, integerrimis. *Anagallis* (*aruenfis* L.) caule pro-

cum-

\*) vid. EIUUSD. Flor. Carniol. Ed. II. p. 99. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 619.

\*\*) vid. ib. p. 185. comm. nostr. ib.



cumbente, foliis ouato lineatis, petalis ferratis, calycis foliolis subulatis. *Rosa* (alpina L.) inermis n.  
foliis septenis, glabris, calycis segmentis indiuisis. 1107.  
Computatis igitur et emendatis omnibus ab Ill.  
Auctore, verus numerus plantarum, Heluetiae nascentium, constituitur duarum millium quadringentarum et nonaginta.

#### XXIV.

*Mineralogische Belustigungen zum Behuf der Chemie und Naturgeschichte des Mineralreichs. Erster Band. Leipzig, bey Joh. Friedr. Heineck und Faber, Buchhändler in Copenhagen, 1768. 8. Seit. 544. Zweyter Theil, 1768. 8. Seit. 547. ohne Vorrede und Registern, mit 4. Kupfert.*

i. e.

*Deliciae mineralogicae, ad augendam chemiam et historiam naturalem regni mineralis collectae. Vol. I. et II.*

**O**fferimus hic Lectoribus nostris librum, qui, etsi maximam partem commentationes, alibi iam propositas, continet; dignus tamen est, quem Germani, potissimum mineralogiae studiosi, diligenter legant, cum tractationes in eo collectas reparias, quae in variis Academiarum Regiarum aliarumque commentariis a viris, huius doctrinae peritissimis, conscriptae inueniuntur: quae quidem, cum diuersarum doctrinarum complectantur commentationes, vix ab omnibus emuntur. Praeterea editor huius libri se curaturum in praefatione primi voluminis promittit, vt quasdam, nullibi propositas, ad hanc doctrinam spectantes, tractationes sequen-

sequentibus inferat partibus. De collectione harum commentationum, nihil, quod nobis displiceat, habemus, nisi, quod optaremus, ut libri, ex quibus desumptae sunt, curatius indicati essent. Iam eas, quae a nobis nondum recensitae sunt, breviter perlustremus.

Vol. I. 1) *Tentamen de origine et generatione metallorum.* Auctore Cl. ELLERO. ex actor. Berol. Tom. IX. \*).

p. 63. 2) *Annotatio de ratione, qua lapis fissilis nascatur.* Sententia, quae lapidem fissilem ex humo paludosa, indurata et combusta enatum esse, affirmat, ex eo probatur, quoniam, praeter quod pisces indurati in eo inueniantur, Cl. Auctor possideat frustum lapidis fissilis, in quo annulus metallicus conspiciatur, qui fragilis igne quasi factus sit, neque aliter, quam vi, existere potuerit.

p. 65. 3) *Relatio de fossilibus, quae circa urbem Scheppenstedt inueniuntur.* Auctore C. F. MEYER. ex Brunsvigicis relationibus, anni 1756. Quae et in monte rubro, et Sampleberensi (Sampleberberg), circa urbem Scheppenstedt Brunsvigicam sitis, reperiuntur fossilia, ea esse refert, cum *silices*, martem continentes, tum varia et *phytolitha*, et *zoolitha*. Silices non quidem tantum martis praebent, ut operae sit pretium eos eapropter praeparare; adsunt vero simul ochrae partes, cuius usus in arte pictoria locus relinquitur. Ex phytolithis sunt, primo

p. 66. lignum petrefactum, (*Lithoxylon silicinum* L.), quod, quale fuerit, non plane pateat; deinde fungos, eosque varios, et varii nominis in petram mutatos, quos *fungitas* dicit: ex zoolithis corallia petrificata

p. 67. (Hel-

\*) vid. comm. nostr. Vol. V. p. 193.



(*Helmintholithum spongitem* L.) enumerat, et vermes, p. 72. cateruatim in petram mutatos, *polypilitas*, cum coralliorum incolae viderentur, ab Eo dictos: deinde *echinitas*, et eos, qui *chelenitae* vel *loricati echinitae*, et *echinitae ouarii* nominantur, et aculeum *echinitae* petrificatum; tum *nautilitas* (*Helmintholithum hammonitem* L.) et *hammonitas*, quos prioribus similes, et multitudine sulcorum tantum differre dicit: denique *cochlitas*, illosque, qui ex concha spirali nati sint, atque *turbinitas* (*Helminth. Madreporum turbinatum* LINN.)

4) *Examen chemicum terrae sulphureae singularis* p. 85. circa Tarnowiz in Silesia reperiundae. Auctore Cl. LEHMANNO; ex act. Berol. T. XIII. \*).

5) *Relatio de terra ardente circa Chrzanow*, p. 115. quod praedium est Comitis DE TENCZYN OSSO-LINSKY, Domini de Sendomir, d. 9. sept. 1755. ex relationibus Dresdensibus 1756. Terra, quae, cum casu accensa esset, ulterius flagrauit, describitur: eamque, si accendatur, flammam spargere; sique eidem ignis propinquus sit, iam accendi: locum denique, ubi haec terra inueniatur, prius paludem fuisse asseritur.

6) *Relatio de specu Harzburgica*, ex relat. p. 117. Brunsvigicis 1756. Auctore C. F. MEYERO. Reiectis caeteris huius specus descriptionibus, eandem esse dicit ductum subterraneum, quem veteres, cum Harzburgum oppugnarent, effosserint, eumque, propter montis naturam, apertum remansisse. Cum, ex defectu solaris caloris, frigus in ea magnum sit, nominari ab incolis *cellam glaciale*; fossilia vero in ea reperiri negat.

7) EIUS-

\*) v. comm. nostr. Vol. VIII. p. 636.

Sec. Dec. Suppl. II.

Z

- p. 121. 7) *EIUSDEM de fossilibus Harzburgicis relatio.*  
In Harzburgica regione non quidem mineras diuites, alia tamen multa mineralia inueniri refert, vti sunt: ochra martialis, marmor perpulchre figuratum, filices martiales adeo perlucidi, vt granatis Bohemicis similes videantur, variaque et phytolitha, et helmintholitha: ex quibus duo pectinitas, quos nullibi descriptos se reperisse dicit, tantum afferamus, alterum habere dicit testas planas, fere circinnatas, illumque in *cardine* obtusum rostrum solum offerre, atque ad musculitas pertinere; alterum esse punctatum, atque ad familiam *Chamarum* referendum. His subiungit repertas casu conchas marcasiticas, quae et ad testacea vniualuia, et biualvia pertineant, et sint insignis magnitudinis.

- p. 131. 8) *De fluuiis regionum Lyonnisii, Forensis et Belloiouiensis, qui grana aurea argenteaque secum ferunt; ex actis DULACI Lyonnensibus.* Quamquam in quibusdam fluuiis auri quaedam vestigia reperiuntur; Rhodanum tamen solum esse affirmatur, qui grana auri argentique, idque tam parca, vt vix inquiri mereatur, copia secum ferat: atque ratio aurum separandi ostenditur, quae fit, si immissa in saccum coriaceum arena concutiat, ac deinde mercurio aurum eliciatur.

- p. 135. 9) *Descriptio montis Pilae.* Celebritate huius montis Auctor commotus, eum adiit, vt, quae reperisset, proponeret. Inueniuntur vero in eodem fodinae lithanthracum et venae stanneae, atque in quibusdam locis, praesertim in vna summitate, acerui lapidum, variae magnitudinis, viridisque coloris, quos incolae *Chirats* dicunt, conspiciuntur. Deinde planities eiusdem, situm, vicinias, fontemque, ibi inueniendum, praeterea figuram, altitudinem obser-



obſervationeſque, barometro et thermometro inſtitutas, atque amoenum ab eo proſpectum, roburque incolarum deſcribit.

10) *Tentamina chemica cum Saxoniciſ Topaziis* p. 153.  
*inſtituta.* Auſtore Cl. POTT, *ex aſtor. Berolin.*  
 Tom. III. Inſtituit Noſter experimenta cum topazio, ex montibus Varifciae, qui dicuntur *Schnecken-gebürge* deſumto, ita, vt eum, cum lapidibus teraque ſiccata commixtum, igni forti immitteret, ſicque diſquireret: quo effectum putat, vt, qui fuſioni gemmarum operam dant, commoda aliqua accipiant. Duriffimum lapidem, poſt adamantem, p. 158.  
 ſaphirum et rubinum eſſe affirmat, neque, ſi ſolus ſit, fundi, ſed ſummo igne ita tantum mutari poſſe, vt foliola dimittat atque in puluerem, praefertim ſi crebrius aquae frigidae immittatur, iterumque igne candefiat, comminuatur. Alkali, varia copia addito, ſi vel decem eius ad vnā topazii partem eſſent, non plane fundi; ſi vero huic mixturae borax varia quidem in proportione adderetur, fuſionem ſequi vidit, coloris, pro varia partium additarum natura et inter ſe ratione, varii. Idem obtineri affirmat, ſi nitrum addatur; non tamen in vitrum mutari maſſam. p. 159.

Praeterea boracem ſolum, ſal fuſile microcoſmi, cui etiam zaſſera addatur, calcem plumbi, cineres cupri, cretae triplam portionem, ſpathum vitreſcens, eaque vel ſola, vel vario modo ſibi inuicem immixta fuſionem attuliſſe topazii, eamque varii et coloris, et conſiſtentiae; non vero eandem ſecutam eſſe contendit, additis vel ſale mirabili GLAUBERI, vel antimonio, quod potius illum in maſſam, ſpumae ſpecie aſcendentem, duriffimamque factam mutaret; vel luna cornua, vel ipſo argento, vel cretae portione ad topazium dupla. Haec



omnia et singula cum euentis distincte et egregie hic enarrata inuenies.

- p. 171. 11) *Notatu dignas et ad historiam naturalem pertinentes res, in praefectura Hohensteinensi Comitum STOLLBERG reperiundas*, describit F. C. LESSER. ex relat. Hannou. 1751. Situm, regiones, et loca singula, in quibus quaeque reperiantur corpora, cum eorum pretio atque usu describit Cl. Auctor, iisque addit varios fontes, specus, et fodinas cupreas; nobis vero sufficiet, nomina praecipua illorum atque peculiare qualitates hic referre. Quae sunt sequentia: lithanthraces maiori, quam communes, sulphuris copia praediti; argentum, quod tamen Ipse non inuenit; alabastri (*Gypsum alabastrum* LINN.) variae species, lufum alabastrinum, alabastrum stellare, et glaciale vel matris perlarum, atque varium, illudque quod, ob duritiem, ad marmora referri meretur, diciturque ab incolis lapis *formosae puellae*, aliusque lapis, qui, propter odorem foedum lapis *suillus* appellatur. His subiungit varios fontes, ubi corpora iniecta crusta lapidea obducuntur, aliosque, qui alias habent proprietates variaeque nomina, ut *lacus saltatorius*, *foramen inexhaustum*, aliaque. Praeterea multas et diuersas species alabastri atque selenitem ibidem reperiri dicit, quae omnia cum notabili quadam, circa pagum *Urbach* posita, specu descripta leguntur.
- p. 191. 12) *Annotatio de mutatione cuiusdam conchae in mineram cinnabaris*, ex libro, cui titulus est *Patriota physico oeconomicus* T. II. Paruam, eamque omnes naturales impressiones ostendentem ostream se possidere dicit Auctor, quae, cum grauitate magna praedita esset, metallisationem indicabat. Re diligentius disquisita, apparuit, interius adesse mineram



ram cinnabaris, cuius etiam vestigia in ipsa conchae substantia conspicerentur. Metalla sensim generari, atque in terra crescere, hinc confirmari putat Auctor.

13) *Experimenta chemica, cum steatite instituta.* p. 192.

Auctore Cl. POTT. ex act. Berol. T. III. Disquisita huius petrae, quam LINNAEUS iam *talcum smectin* nominat, etymologia, atque enumeratis variorum et veterum et recentiorum de ea opinionibus, eiusque denominationibus, indicatisque variis regionibus, in quibus reperiatur, atque usu eiusdem, cum ad fornaces a nonnullis adhibeatur, declarato: ad eius naturam describendam accedit. Relatis et partim refutatis aliorum de ea opinionibus, putat esse eandem ad *argillas* referendum, cum ad ignem dure scat, neque differre ab iis, nisi, quod in aqua non dilabatur: hinc *serpentinum*, *nephriticumque lapidem* ad idem genus pertinere, qua in re Ill. LINNAEUS iam cum eo consentit. Praeterea odorem steatitis esse pinguedinosum refert; sique frangatur, splendere, nec, nisi duritie, per aërem mutari, atque, quando aquae immittatur, per fufurum aliquid amittere, igne adeo durum fieri, ut, chalybis instar, scintillae inde proueniant, et colorem plerumque album nancisci.

Quae sequuntur experimenta Cl. Auctor cum p. 217.

steatite Baruthensi instituit, iisque vidit: acidus spiritus eum parum mutare; terram tamen eiusdem, quae colorata sit, iis solui, indeque, per aquam regis, ex steatite flauo coloris, obtineri solutionem flauam, terra albicante remanente; atque aquam fortem ex nephritico coloris viridis fieri, pulueremque, alcali praecipitatum, flauum residuum manere. Deinde, si sextam salis alcalini partem steatiti adde- p. 218.

ret, igni forti dura, extensa tamen massa producebatur;

batur; si vero partes eius anaticae fuerint fluidam albamque, vel dupla pars, brunam massam enatam vidit. Hepar sulphuris in massam, nigro ahati similem, scintillantemque eum mutabat. Nitri pars vna, cum duabus stearitis partibus fundebatur, vitrumque praebebat flauum, non tamen perlucidum. Arsenicum, pari quantitate ei admixtum, massam obscure flauam, striis subalbis, additis duabus arsenici partibus, ferene flauam efficiebat. Sal fusile microcosmicum, partibus anaticis, ahati similem, obscuram obtulerat massam; cui si tantundem boracis calcinati adderetur, massa berillo similis oriebatur. Nephriticus lapis cum alcali non fundebatur, sed obscuram; cum borace vero fundebatur, rubramque effecit materiam. Serpentinus cum borace in fusionem redigebatur et colorem nigro brunum induebat; addita vero huic massae eadem cretae rubrae copia, massa vitrescens, et nigra enascebatur.

p. 220. Praeterea commiscuit Noster cum variis vitri speciebus stearitem, nephriticumque, nec non cum terris calcareis, et gypseis, argillaseisque, atque vitrescentibus; eosque mox vel fusos esse, vel contra; mox alium aliumque colorem induisse vidit; quae vero hic, cum propter rei nexum iam longius immorati simus, reticere conuenit. Denique, ne haec sine fructu proposita videantur, Cl. Auctor vsum proponit, qui sit, vt varia vasa, praecipue chemicalia inde parari possint; maculisque deliniendis lanaeque purgandae conueniat, atque variae statuae, imagines, aliaque parentur.

p. 229. 14) *De generatione nitri*, Auctore Cl. IUSTI  
ex relation. Politic. Gotting. 1756. Enumeratis  
nitri principiis, ostenduntur incommoda, quae ex  
communi nitrum parandi ratione sequantur. Cum  
enim ex acido aeris nitroso et alcali fixo, addito  
parum



parum alcali volatilis, nitrum nascatur ; apparet, terram requiri mollem, quam aer facile transeat : quae, quoniam in communibus, ad nitrum generandum paratis parietibus non sit, sed terra argillasea : praetereaue solares radii alcali volatile dissipent, pluuiaque nitrum in terra distribuatur eamque duram reddat : suadet, ut humus, salibus acidis alcalinis et fixis, et volatilibus impraegnata, adhibeatur. Hanc humum, additis his salibus, facile obtineri posse ex variis rebus oeconomicis asserit, ut vitriolo, sale communi, cineribus, calce extincta, fimo, vrina, aliisque. Ab aestu solari pluuiaque ope aedificii est defendenda, quod ex octo columnis, tectoque stramineo vel scandulari tectum conficiatur, cuiusque latera ad terram ex lapidibus sint exstructa, his vero asseres, foraminibus ad aerem immittendum praediti, superimponantur. p. 237.

15) *Ratio vera, cur ferrum frigidum fragile fiat*, p. 240. ad quaestionem, ab Academia Holmieniensi super hac repropositam, hic ex indiciis Brunsvigensibus 1758 proponitur. Etsi haec tractatio nonnullis alchemicis obscurisque terminis repleta est; id tamen inde intelleximus, ponere Auctorem eiusdem causam fragilitatis ferri in crassis salibus terrestribusque particulis; eamque corrigi putare, si minera ferri puluerisata, furno reuerberatorio immissa, ita igne forti tractetur, ut bruno rubra fiat, sicque lebeti cupreo, superfusa aqua, immittatur, quo, dum massa continuo agitur, per decem horas coquatur; quod eatenus repetatur, donec crystalli concrecant. Multam operam, quae adhibenda sit, compensari dicit inde, quod ligno carbonibusque paratur, ferrum melius obtineatur, deinde separatione aurum eliciatur, atque aqua sit medicina vniuersalis ;

Z 4

salis ; quae tamen, quam vere dicantur, aliorum iudicio submittimus.

p. 248. 16) *De regeneratione aluminis ex terra sibi propria, aliisque artificialibus illud ex aliis terris, acidi vitrioli ope, obtinendi methodis tentamina*, a Cl. MARGGRAF instituta; ex act. Berolin. T. X. huc relata \*).

p. 260. 17 et 18) *Experimenta de terra aluminis*, Auctore EODEM. ex iisd. \*\*).

p. 291. 19) CAROLI SAUNDER *litterae de celebri crypta in insula Antiparos*; ex Anglico sermone huc relatae. Post longum periculofumque iter se venisse refert in cryptam, splendidam amoenamque, quae glacie, sensim in varias figuras mutata, ornata sit ; atque in fundo habeat crystallos varii coloris, glacie interspersa ; cuiusque sub terra profunditas sit, circiter vlnas septingentas et viginti octo, centum et viginti eius amplitudo ; longitudo vero centum et sexaginta nouem, et altitudo nonaginta vlnas habeat.

p. 297. 20) *De ratione, qua marmor tingatur* ; ex Patriota physico oeconomico. Ostenditur non omne marmor, sed durum tantum tingi posse, idque eum calorem accipere debere, vt quidem non candeat, aqua tamen, si superfundatur, ebulliat : varia deinde, pro varia, qua colorem induere velis, re, menstrua requiri : sic lapidem lazuli et sanguinem draconis spiritu vini, radicem alkannae oleo therebinthinae, aliaque aliis esse soluenda ; alia nullis menstruis egere, qualia sint, sanguinis draconis purissima

\*) vid. comm. nostr. Vol. VI. p. 328. seq.

\*\*) vid. ibid. p. 330.



fima species, gamboga, cera viridis, sulphur aliaque. Sic marmor vel flauum, vel rubro flauoque mixtum, vel coeruleum reddi posse. Praeterea figuras eminentes in marmore effingi, si eae marmori creta impingantur, verniceque obducantur, reliquum postea marmoris spiritus falis acetique destillati partibus anaticis macerandum esse.

21) Cl. AEPINI nouae observationes, quae ele- p. 302.  
*tricitatem Turmalini attinent*; ex act. Berol. T. XII \*).

22) *De petrificatis figuratis, quae circa Salzthal* p. 323.  
*reperiuntur.* Auctore C. F. MEYERO, ex relation. Brunsvigicis 1756. Non adeo diu esse affirmat, quo haec petrificata illic inueniantur, cum BRÜCKMANNUS, in sua historia naturali eorum nullam fecerit mentionem: deinde eorum figuram externam describit, quae obscure bruna crusta, coniuncta cum materia spathacea, albi coloris, cincta est, et inaequalis, collectaeque ex terra, herbis animalibusque debilibus massae, aquae vi inter se coniunctae, similis conspicitur: tum interna substantia, colore vel bruno, vel sulphureo, raro cinereo, vel fusco praedita dicitur, quam diuersitatem coloris Cl. Auctor in *phytolithis* a succo plantarum, massae terreae communicato, deriuat. Praeter hos adesse refert *helmintholithos*, *hammonitas* nimirum, qui concamerationes variis crystallis, quibus teneri *dendritae* iterum insint, amoeno aspectu refertas offerant; atque *belemnitas*, cum his coniunctos, similes succino, atque minores.

23) Ill. LINNAEI de generatione crystallorum, p. 331.  
*Resp. Martino Kaehler, dissertatio, ex amoenit. Academ. Vol. I. \*\*).*

Z 5

24) Cl.

\*) v. comm. nostr. Vol. VII. p. 711.

\*\*) v. comm. nostr. Dec. I. Suppl. I. p. 85.

P. 367. 24) Cl. LEHMANNI *historia naturalis de Chrysopraso Chosemizenfi. ex aëtor. Berolin. T. XI. \**).

P. 385. 25) Cl. BLASII GARYOPHILI *tractatio de tempore, quo lapidicinae inuentae sint, earum inventoribus, iisque, qui eas tamquam supplicium colere debuerint; de inspectoribus fodinarum marmorearum, de machinis, morbis, et instrumentis lithotomorum, atque de arte marmor tingendi, macerandi et litteras incidendi: ex eius libro de marmoribus antiquis. Et si hac docte conscripta, et ex veteribus Hebraeis, Graecis Romanisque demonstrata tractatione magnopere delectati sumus; non possumus tamen omnia afferre, sed praecipua tantum recenseamus. Primos fuisse Graecos, deinde Aegyptios, a quibus CADMUS, primus, de quo quid certi dici queat, hanc artem accepisset, arti lapidariae operam dedisse, affirmat. Marmor Tyrium omnium antiquissimum esse; Ephesini autem tempus non certum, sed a PIXIDORO fodinam eius inuentam credi: marmor Pentelicum a BYZA esse inuentum: Syracusanum multo antiquius habendum, nec solum has lapidicinas in montibus, sed etiam in planitie cultas fuisse.*

P. 397. Deinde demonstrat, omnes maleficos, quales etiam christiani habebantur, huic operi vacare debuisse: lapicidas lychnos frontibus alligasse, propriisque vestibus, quae saccis instructae essent, sese induisse, et vas, quod *περίodos* diceretur, secum tulisse. Machinas atque instrumenta fuisse columnas, quibus tellus suspenderetur, vasaque, malleosque, cuneos, ferras, quibus marmora dissecarentur, aliaque plura. Deinde, ne aqua scaturiens operarios laederet, *cochleam*, quae vocabatur, ab ARCHIMEDE inuentam fuisse, qua aquam extraxissent. Prae-

\*) v. comm. nostr. Vol. VI. p. 633.



Praeterea iis fuisse artem, qua ferrum, si durum cuperent, in aquam; si molle, in oleum tingerent, Laconicumque ferrum optimum habitum fuisse.

CLAUDII caesaris tempore, marmor pingi coepisse: NERONE imperante, maculas illi inferi, quae ars, ALEXANDRO regnante, sit appellata *opus Alexandrinum*. Varias fuisse marmora conglutinandi rationes: Graecos lithocollam fecisse ex lapide Pario et glutine coriorum bouinorum; alios vncis ferreis frustra marmoris coniunxisse, plumboque in compages illiquato expleuisse. Fuisse denique addit consuetudinem, qua pacta, leges, mortes principium et facinora praeclara marmori vel celte, vel scalp pro inciderent. Hinc CICERONEM dixisse *incisas litteras diuinae virtutis testes sempiternas*.

26) ComitIS MARSHALL *de fodinis adamantinis, in regno Golconda et Visiapur inueniendis, relatio*; ex Philosop. Transact. Historice omnes fodinae, quae in his regnis inueniuntur, nominibus locorum indicatis, enarrantur; atque natura soli in iisdem, adamantumque figura, praestantiaque coloris, aliaque plura subiunguntur; quae tamen hic fusius referre nequimus.

27) *Tentamina cum nouo corpore minerali, quod Platina del Pinto dicitur*. Auctore Cl. MARGGRAF. ex act. Berol. T. XIII. \*).

28) Cl. DE BLUMENSTEIN *tractatio de metallis minerisque: cui addita est DULACI descriptio fodinarum mineralium prouinciarum Lyonnensis, Forensis et Belloiouiensis* e Gallico sermone. Traditur hic BLUMENSTEINII de metallis minerisque sententia, quam solam hic breuiter recensemus:

\*) vid. comm. nostr. Vol. VIII, p. 632.

mus: cum, quae de ratione qua metalla in tellure posita sint, et detegi queant, dicantur, iam alibi Lectoribus retulerimus \*), atque ad enumerationem fodinarum Lectores ipsam legendam remittere debeamus.

p. 480. Partes principes metallorum, terram nempe vitrescentem, sal et phlogiston, ante unionem earundem fluidas fuisse, et metallorum proprietates ex varia earundem proportionem nasci varias. Me-

p. 487. talla quidem ab initio iam formata fuisse non improbabile existimat; posse tamen eadem etiam-num generari, exaltari atque augeri, nec repugnare, si quis statuatur metalla regenerari, quamvis certe

p. 490. affirmari non possit. Deinde apparenter tantum loca quaedam esse, ubi metalla minus vel magis nascentur, affirmat, cum principia eorum ubique sint dispersa, nihilque, quo minus tandem aliquando metalla reperiantur, impediat. Denique lapidem philosophorum possibilem esse statuit; an vero quis inuenerit, nec ne, dubium esse, neque aliter concedi posse, quam ut viliora tantum in nobiliora metalla sint mutata.

p. 519. 29) Cl. MARGGRAFII *tractatio de ratione, qua stannum in acidis vegetabilibus solvatur, atque de arsenico, quod illic contineatur*, ex act. Berolin. T. III. Continentur hic experimenta Cl. Auctoris, quorum in sequenti tractatione continuatio, a nobis iam indicata \*\*), traditur; quae itaque breuiter repetamus. Purissimum stannum ab acidis salibus arrodi et solui, magnamque arsenici copiam continere experimentis demonstrat. Primo vasis, ex tali stanno confectis, acetum vini vel simplex, vel destil-

\*) vid. WALLERII *Elem. metallurg. comm. nostr.* Vol. XVI. p. 31. seq. et supra p. 283. seq.

\*\*) vid. comm. nostr. Vol. VII. p. 714.



stillatum, vel alia acida vegetabilia acria, successu temporis, immisit: atque tum his acidis particulas metallicas solutas cognouit, ex sapore, atque aceto turbido facto, vel acidis colore mutatis, et praecipitato, quod arrosus stannum continebat.

Deinde stannum Malaccense cum aceto et vino, p. 524. a phlegmate depurato, digessit, coxit, colauit, destillauitque in retorta; eumque laborem, addito nouo aceto, octies repetiit. Solutione stanni remanente, in retorta ad siccitatem destillata, eius residuum minori indidit retortae, et destillatione omne acidum eduxit. His peractis, vidit in collo retortae, praeter oleosum aceti, paruam sublimati portionem, quam arsenicum fuisse affirmat; in retorta autem remansit cinis stanni metallicus. Stannum, quod post solutionem remaneret, puluere albo aspersum vidit, qui vltiorem eiusdem solutionem impedire ab Eo dicitur. His addit tertium, cum minera stanni purissima, additaque fuligine institutum experimentum, quod idem demonstraret.

Experimenta, quae sequuntur, primo demon- P. 527. strant, arsenicum difficile, etiam fortissimo igne, a stanno separari. Cum enim stannum Malaccense, arsenici parte eadem admista, igne, qui sensim eo augetur, quo vitrea retorta perferret, destillaretur: arsenicum regulina forma in collum retortae ascendit, atque in retorta cinis subalbus, in quo arsenicum adhuc continebatur, remansit metallicus: atque, quum eundem laborem, addita etiam maiori stanni copia, continuaret Cl. Auctor, remanere semper arsenicum expertus est, adeo, vt duas vncias stanni dimidiam arsenici vnciam continere posse inde colligeret: quae etiam, experimento alio, in quo phlogiston additum esset, Cl. Auctori comprobari visa sunt. Deinde, quo ipsa praesentia p. 531. arse-

arsenici clarius appareret HENKELII experimentum \*) repetiit, magisque determinauit, et, quae obseruandae cautelae, hic cum euentis proponit. Soluit nimirum in aqua regis, a se ipso ex vitriolo, nitroque depurato destillatione, addito vnciae vni huius destillatae mixturae scrupulo dimidio salis ammoniaci, in hunc finem parata, purissimum stannum: quod, quando ad quatuor aquae regis vncias scrupulus stanni dimidius sumeretur, statim solui, atque in fundo arsenicum praecipitari vidit; addita vero alia stanni parte, solutio clara obtinebatur, atque arsenicum solutioni pulueris in forma supernatabat. Denique, si haec solutio ad crystallisationem reponatur, arsenicum in crystallis obtineri ostendit: atque, addito aquae regis, loco salis ammoniaci, spiritu salis, impediri, ne in operatione euaporationis liquor ex vase fluat, difficilius autem crystallisationem sequi: his subiuncta est affinitas stanni cum sale ammoniaco et mercurio, quae corpora ad separationem arsenici maxime conuenire dicuntur, atque periculum ex usu vasorum stanneorum ex his colligitur.

p. 539. 30) EIUSDEM *disquisitio stanni chemica continuata*, ex act. Berol. T. XII. \*\*).

Vol. II. In volumine secundo hae continentur tractationes:

p. 3. 1) Cl. POTT *chemica experimenta, super commixtione acidi vitriolici cum sale ammoniaco instituta*, ex act. Berol. T. VIII. \*\*\*).

2) Vni-

\*) v. RESPURS *Mineralgeist*. p. 211.

\*\*) v. comm. nostr. Vol. VII. p. 714.

\*\*\*) v. comm. nostr. Vol. III. p. 681.



2) *Vniuersalis historia naturalis lithanthracum*, ex p. 42.  
*libro, cui titulus Dictionaire de l'encyclopedie huc*  
*relata.* Traditur hic ex collectis variorum Aucto-  
rum sententiis de natura lithanthracum, modo ea  
inueniendi et colendi, situque atque stratorum di-  
rectione, sic quoque de vaporibus et usu eorum,  
conscripta breuis et concinna tractatio, ex qua ii,  
qui breuem huius rei cognitionem cupiunt, satis  
instrui poterunt. Vnam, quoniam nos pluries iam  
de hac re Lectoribus retulimus, Auctoris senten-  
tiam afferamus, qua lithanthraces vegetabilis esse  
originis existimat, idque patere et ex stratis eorum,  
lapide fissili tectis, vbi impressiones vegetabilium  
conspiciantur, et ex contextu, qui illi lignorum si-  
milis sit.

3) *Historia naturalis de fodinis lithanthra-* p. 64.  
*cum, quae in prouinciis Lyonnifio, Forenfi, Bel-*  
*loioiufi inueniunturque; ex actis Cl. D U L A C*  
*Lyonnensibus, quae historiae naturali inferuiant.* Si-  
gnis, quibus lithanthracum praesentia cognoscatur,  
expositis, terebraque, tanquam certissimum strata  
lithanthracum detegendi instrumentum laudata,  
terram, quando mollis sit, suffulciendam esse prae-  
cipitur trabibus in lateribus ita positis, vt in ipso  
ductu machinae libere agere queant. Deinde pro-  
funditas varia, vt plurimum ad 70 vel 105 vlnas sub  
terra extensa; atque diuersitas lithanthracum, ex  
profunditate, cum medii optimi sint: laboresque  
varii monticularum circa lithanthraces describun-  
tur. Tum pericula in his fodinis, ex aquis, vapo-  
ribus, quibus ventilatore optime occurratur, aliis-  
que enarrantur, nomina locorum, in quibus his in  
prouinciis fodinae lithanthracum sint, indicantur,  
earumque varietates, praestantia, et singularis ipso-  
rum lithanthracum natura, commodaque atque incom-

incommoda monticularum referuntur. Sic, ut exemplum addamus, narrat in fodina, quae circa regionem *Rive de Gier* reperitur, lithanthraces semper flagrare, idque pendere et a vaporibus eorum, et ab alumine: aliasque aliis magis esse diuites, eam, quae Caluomontii (*Saint Chaumont*) posita sit, aliis notatu digniorem esse, quod pulcherrima sit omnium, offeratque in introitu fodinae stratum lapideum, quod rima sit fissum, atque, praeter alia commoda, facillimum descensum ostenderet, ideoque eam icone depinxit.

p. 95. 4) Cl. POTT *examen chemicum salis acidi volatilis succini*. ex act. Berol. T. IX. \*).

p. 124. 5) *Tractatio de quibusdam notatu dignis, circa Gabian in Occitania inueniendis rebus, praesertim de petroleo illic scaturiente*; Auctore Cl. RIVIERE, ex act. Monsp. T. I. Praemissa, quae tractationis summam, occasionem, aliaque continet, introductione, ipsa Cl. RIVIERII proponitur commentatio: cuius summam, cum iam a nobis recensita sit \*\*), hic repetere non opus est.

6) *Typus historiae naturalis in regno Iaponico*; ex Cl. V. CHARLEROIX *historiae Iapanicae cap. 2.* Praetermissis, quae ex aliis iam nota sunt, soli et p. 136. maris vicini notabilia tantum afferamus. Conspiciuntur circa regnum Iapanicum turbones aquei, qui naues ipsas in fundum detrudent, atque vortices periculosissimi duo, quorum alter *Amakusa*, alter *Faisuki* dicatur. Lapideum montosumque est solum, industria incolarum fertile redditum, multis fluuiis, iisque magnis et singularibus praeditum: ter-

\*) v. comm. nostr. Vol. V. p. 197.

\*\*) v. ibid. Vol. XV. p. 210.



terrae motibus valde subditum, montibusque igni-  
vomis abundans, ex quorum vno, *Vngen* nomine,  
aquae exstillent, quibus potissimum balneis ad luem  
veneream curandam vtantur incolae; aliaeque plu-  
res aquae foteriae. Magna illic inuenitur sulphu- p. 164.  
ris copia, omninoque est auro diues hoc regnum:  
praeterea adsunt fodinae argenti, cupri, stanni, mar-  
tis et lithanthracum. Sal etiam parari refert, modo,  
ex aqua singulari: multas gemmas pretiosas, naph-  
tham, coloris rubicundi, quam incolae *rubicundam*  
*terram* nominant, ambramque gryseam ibidem re-  
periri, atque plantas marinas circumcirca conspici.  
His reliquas Iapanensium merces, praesertim por-  
cellanam subiungit.

7) *Tractatio physico chemica, de separatione auri* p. 177.  
*argentique praecipitatione, quae separatio sicca dici*  
*solet*: Auctore Cl. ELLERO. ex act. Berol. T. III.  
Cum spiritu nitri aurum ab argento separare ope-  
ratio esset nimis sumtuosa: cogitabatur de breuiori  
et faciliori, quam *Pfannenschmied*, aurifaber Qued-  
linburgensis, primus inuenisse, deinde *Stolle*,  
Lipsiensis, vltius perfecisse a Cl. Auctore dicuntur.  
Quibus eam arcanam habentibus, Noster praecipi-  
tatione perfici debere suspicatus est: quapropter  
sulphur cum fusa massa argenteo aurea coniunxit,  
atque ita argentum cum sulphure combinari, au-  
rumque remanere vidit: cuius rei rationes, modum  
procedendi, atque effecta, fusa et eleganter describit.

8) *Tentamen mineralogiae atque hydrographiae*  
*tractus Bernensis*; Auctore Cl. BERTRAND ex ten- p. 218.  
tamine de vsu montium (*Essai sur les usages des*  
*montagnes*) depromptum. Postquam traditae fue-  
runt notiones de qualitatibus naturae indagatoris,  
vsibusque, qui ex historia naturali, relationibusque  
*Sec. Dec. Suppl. II.* A a cor-

corporum, in singularibus regionibus reperiundo-  
rum, redundant : mineralium et corporum, et a-  
quarum nomina, earumque diuersitates, indice al-  
phabetico proponit, atque ostendit, quae in quo-  
que loco reperiantur.

- p. 249. 9) *De aerugine aeris tractatio*, Auctore Cl. S E-  
R A N E. ex act. Monspeff. T. I. \*).
- p. 260. 10) Cl. LEHMANNI *tractatio de floribus aste-  
ris montani, floribus coeruleis, et foliis salicis, schistis  
impressis*; ex act. Berol. T. XII \*\*).
- p. 283. 11) *Comparatio inter dentes piscium variorum pe-  
trificatos atque naturales*, Auctore Cl. R I V I E R E  
ex actor. Monspeff. T. I \*\*\*).
- p. 294. 12) Cl. B R A N D E S *disquisitio chemica terrae  
Beuthniensis*; ex actor. Berol. T. XIII \*\*\*\*).
- p. 315. 13) *Tractatio de natura aquae communis, si tan-  
quam medicamentum resoluens consideratur*; Auctores  
Cl. E L L E R O. ex act. Berol. T. VI. \*\*\*\*\*).
- p. 337. 14) *Descriptio lapicidarum marmorariarumque  
quae in prouinciis Lyonnensi, Forensi et Belloiouiensi in-  
veniuntur*. ex Cl. D U L A C act. Lyonn. T. II. Galliam,  
praesertim Lyonnisium multis, iisque vtilissimis, la-  
picidinis praeditam esse affirmat: quas ideo hac  
tractatione, praemissa veterum lapides adhibendi  
ratione, omnes, vicinasque Forensis Belloiouiensis  
que agri, ex ordine describit, atque praecipue cal-  
careos, lapidem fissilem, silices, marmora, lapides  
cry-

\*) v. comm. nostr. Vol. VII. p. 714.

\*\*) v. ibid. Vol. XV. p. 208.

\*\*\*) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 204.

\*\*\*\*) v. comm. nostr. Vol. VIII. p. 638.

\*\*\*\*\*) v. ib. Vol. II. p. 427.



crystallifatos, cum eorum natura, vfu, modo tractandi aliisque obferuationibus enumerat.

15) *Tractatio de fossilibus, petrificatis potissimum*, p. 401. in iisdem prouinciis, ex iisdem actis. Reperiri illic refertur copiose fossilia, qualia sint, talcitae, aetitae duplicis generis, alii nigri, duri et glabri; alii flauicantes et lamellati tenuesque; praeterea alius aetites, ferruginei coloris, figurae rotundae, cauusque, cui ab incolis variae vires, grauidas inprimis iuuantes, adscribuntur; quare etiam *lapis praegnans* nominetur; porro belemnitae, bucarditae, gryphitae, ammonitae, quorum duas icones addit, aliaque plura et petrificata, et mineralia: quae vero, cum satis communia sint, ne nominibus quidem referre possumus.

16) LEHMANNI *tractatio de loco Pliniano \*)super* p. 448. *gemma veterum Asteria dicta*; ex act. Berol. T. X. \*\*).

17) Cl. ASTRUCI *tractatio petrificatorum Vultonnensium circa Montempeffulanum inueniendorum*; ex act. Monspess. T. I. \*\*\*).

18) Cl. ELLERI *disquisitio usus domestici vasorum cupreorum, qui noxius habetur*; ex actor. Berol. T. XI \*\*\*\*).

19) *De virgula diuinatoria*. Anonymus huius p. 579. tractatus Auctor, ironice et facete satis vim virgulae diuinariae omnem negat, eamque, auctore CAMPIO, senatore Gottingensi, qui sibi arcanum hoc detexerit, non, nisi a spiritu, animo nempe investigatoris, eam dirigi statuit: neque intelligi ait, quo modo

A a 2

\*) v. PLINII H. N. lib. XXXVII. cap. 47.

\*\*) v. comm. nostr. Vol. VI. p. 333.

\*\*\*) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 404.

\*\*\*\*) v. comm. nostr. Vol. VI. p. 324. seq.

modo exhalatio tam multarum, ad quas inueniendas adhibeatur, rerum motum illius queat excitare. Describit bifurcatam virgulam, partesque eiusdem litteris denotat, vnde icon deesse nobis videtur: deinde, quo modo ea sit dirigenda, praecipit, atque casu tantum euenire, vt res quaesita inueniatur, affirmat; qua tamen in re plures mineralogi Ei repugnant, cum, illam non omnino esse reiiciendam, neque, nisi in fortuitis rebus, Auctoris opinionem valere, statuant \*).

p. 534. 18) Cl. ELLERI *examen de formatione calculi f. sabuli in corpore humano. ex act. Berol. T. XI. \*\*).*

## XXV.

Ontleed en Heelkundige Verhandeling over de uitzakkingen en uitwassen der lyfmoeder en schedee; uitgegeeven door eene gezelschap van Vtrechtsche Heelmeesters. Te Vtrecht by Gisb. Tiemon van Paddenburg en Abraham van Paddenburg 1767. 8. mai. pl. 11. absque dedicatione et prooemio.

h. e.

Tractatio anatomico chirurgica super procidentia et fungis vteri vaginaeque, a societate chirurgorum Traiectinorum edita.

In descriptione partium mulierum, quae generationi inferuiant, anatomica, ex Cel. WINSLOWIO translata, hoc annotabimus, quod in collo vteri ad vtrumque eius parietem duo obseruentur  
stra-

\*) c. f. WALLERII Metallurgia; vid. comm. nostr. Vol. XVI. p. 36.

\*\*) vid. comm. nostr. Vol. VI, p. 628. seq.



strata, valuulis praedita, quae semen, in vterum immis-  
sum, exinde redeundum impedian.

Iam de procidentia vteri ipsa videbimus, cuius p. 22.  
caussa interna partium, vterum continentium, relaxatio ; externa vero omnia ea, quae vim et resistentiam earum partium soluant, motus vehementiores, pressio, partus difficilis, tussis, equitatio, nixus fortiores, saltus cet. defenduntur. Proximam vero causam in ligamentis sacro ischiadicis, et constrictore cunni relaxatis, Auctore Cel. CAMPER, qui et hunc prolapsum veram herniam dicit \*) constituunt. p. 36.

Ex allatis itaque exemplis patet, prolapsum p. 40.  
vteri omni aetati, infantibus, adultioribus, grauidis cet. communem esse. Causae diuersae varium prolapsum vteri ostendunt, vnde quoque signa petuntur. Quam diu collum tantum vteri extra orificium vaginae propendet, tumor oblongus, facile reponendus; sin fundus simul conspiciatur, tumor rotundus, vesicae inflatae ad instar, et admodum difficile reprimendus in conspectum venit, quem inueteratum dicunt. Symptomata consueta, inflammatio, gangraena cum sphacelo, si iusto tempore auxilia adferuntur, praecaueri possunt: leuiores, quae interdum accedunt, fluor albus, continuae haemorrhagiae vteri, hernia vesicae cet. non, nisi causa sublata, tolluntur. Malum hoc, si leuius est, in iunioribus conspicuum, vel ex causa externa oriundum, iusta methodo statim tractatum, breui tollitur; rarissime vero, vel nulla curationis spes affulget, si iam inueteratum est, ex causis internis prouenit, vel in aetate prouectiore conspicitur. p. 49. p. 57.

A a 3

Indi-

\*) Verhandeling voor FRANCOIS MAURICEAU  
tractaat van de ziekten der zwangere vrouwen cet.  
door PETRUS CAMPER uit het Fransch vertaald,  
tweede druk. Te Amsterdam 1759. 4. p. 64.

**p. 62.** Indicatio curatoria sic abscluitur, vt primo pars procidens in suum reponatur locum, et secundo ibi aptis auxiliis seruetur. Repositione vteri prolapsus exposita, adminiculisque et instrumentis, quibus in situ seruetur, definitis, in pessaria, quale in Commentt. Harlemenf. \*) et apud Cel. CAMPER \*\*) depictum legimus, a variis auctoribus diuersimode mutata vel emendata, eorumque applicationem fusius inquiritur.

**p. 88.** Agitur tunc in capite tertio de inuersione vteri: hanc vero non, nisi fundo vteri procedente, et orificio eius dilatato, euenire posse; in grauida autem, fetum maturum gerente, facillime fieri demonstratur. Efficitur hic, vel ex peruersa secundinarum extractione, praesertim, cum placenta fundo firmiter adhaereat; vel ex doloribus post partum: hinc eo respiciatur, vtrum placenta adhuc cum prolapso fundo coniuncta sit, an fundi tantummodo pars, in vagina delitescens, descenderit, vel maior eius portio altius propendeat, et tumida appareat? numne denique inuersa pars per vteri orificium admodum compressa sit, vt sphacelus vereatur; vel compressio paulo minor, maior vero haemorrhagia, lipothymia crebrior cet. appareant?

**p. 100.** Medela nulla locum habet, nisi, vt repositio quam citissime fiat; hac vero impossibili, prolapsus naturae committatur, nec temere culter, vel ligatura adhibeantur.

**p. 110.** Exponitur in capite quarto procidentia vaginae, quae tunc adest, si tunica interna rugosa ex causis in

\*) Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der wetenschappen te Haarlem V. Deel, p. 206. vid. comm. nostr. Vol. XI. p. 127.

\*\*) l. c. tab. II. fig. 3. 4. 5.



internis vel externis, supra iam descriptis, ita laxa fit, et a cellulosa subsequente separatur, ut extra pudenda propendeat. Oritur itaque primo a laxa tunica interna, secundo partu difficili, tertio progressa vehementi pressione, quarto tunica vaginae interna vel ad partem tantum relaxata cet.

Probe ad ea attendatur, cum signa ex his eruantur, et methodus medendi definiatur: alia enim requiritur, si procidentia vaginae ex causa interna deriuetur; alia, si vi quadam vagina cum ecchymosi propenderit. In priori casu vagina reponatur, iustis adminiculis retineatur, et laxae partes vaporibus aromaticis et fomentationibus roborentur; in posteriore sanguis, extra vasa missus, incisione effluat, vulnus iuste tractetur, et repositio turunda seruetur; repositio vero vaginae procidentis ante partum non possibilis est, et rarissime post partum, cum vagina admodum compressa et liuida appareat.

Inquiritur capite quinto in fungum vaginae, p. 116. quem ex membrana vaginae cellulosa deriuatum legimus; sed datur differentia: fungus etiam oritur post excoriationes, vulnera et ulcera; sed et sarcoma, tunica inclusum, exiguo initio ad insignem magnitudinem excreescens, conspicitur. Hinc probe p. 125. dispiciendum est, utrum verum sit sarcoma, vel ex laxiore quadam vaginae parte prolapsa, iam tumida, dura cet. oriundum? an sedes eius sit in anteriore vel posteriore vaginae parte, vel ad ipsum vteri orificium? quomodo facies fungi sit comparata, utrum is parvus sit, et in vagina haecenus occultus, vel iam magnitudine insignior, et propendens, an superficie plana, vel inaequali, basi lata, vel collo angusto? quomodo denique aetas sit, habitus corporis, an cacochymicus cet.? si sarcoma in cellulosa p. 130.

radices profundius egerit, facillime, si etiam exstirpetur, recrudescit.

p. 136. Curatur primo exstirpatione, secundo distorsione, et tertio ligatura, vbi instrumento Cel. LEVRETI, quo per filum argenteum fungus ligatur, haud parum tribuitur.

p. 151. Sexto demum capite de fungo vteri sermo est. Conspicitur is in fundo, collo, vel ad orificium vteri: distinguitur quoque ex natura et symptomaticis; signa vero obscura sunt et fallacia \*). Quibus omnibus methodum curandi accommodatam videmus; quam tamen in exemplo adiecto, vbi fungus compositus, quem dicunt, magnus, ad fundum vteri, quid? quod per maximam fere vteri partem diffusus erat, frustra adhibitam dolent Auctores.

## XXVI.

Les singularités de la nature. Par Mr. DE VOLTAIRE à Geneve 1769. 12mo. mai. pl. 5.

Singularia naturae. Auctore Cl. DE VOLTAIRE.

**E**ssē in physicis multa, quae ignorentur, confundantur, ridiculisque subinde et inanibus coniecturis obscurentur potius, quam explicentur, copiosis Cl. Auctor exemplis probare studet. Quemadmodum vero huius mali, non doctrinarum solum artiumque incremento, verum etiam rerum publicarum saluti quandoque perniciosi, fontes in credulitate, hypothesium amore, iudicii praecipitan-

\*) VAN GESSCHER Proeve over de langwierige gezwellen p. 130. vid. comm. nostr. secund. Decad. Suppl. I. p. 185.



tantia, regularum obseruandi inscitia et contentu, mathematicumque neglectu recte quaerit: ita obseruationem diligentem ac scitam, prudenti suffultam dubitatione, maximopere commendat. Quum autem cuncta, quae affert, percurrere non liceat, speciminis loco pauca hinc inde delibata proponamus.

Corallia ab insecto inhabitante structa credere p. 7.  
aeque ridiculum aestimat, ac si quis arbores murosque vermium incolarum opus esse statuatur.

Polypi forte non sunt animalia, sed parui iunci, mimosae sensitiuae similes. Brachia, quae videntur, p. 8.  
rami, capita gemmae, ventriculus cauarum fibrarum congeries, motus fibrarum undulationes, ovula semina esse possunt. Insecta, deglutiri visa, forte sponte intrant polypum plantam, ut ibi nutriantur et pereant, quum etiam sine his diu polypus subsistat.

Apum rempublicam gynaecocraticam, reginam p. 13.  
polygamam et polytocam, operariasque apes spadones aequae fabulosas esse dicit, quam anguillulas NEDHAMII corruptae farinae, iurique ouillo innatantes. Elementorum naturam latere, quatuor vul- p. 56.  
garia falso ita dici, aeremque forte, praeter congeriem exhalationum telluris nihil esse, contendit. Perceptionum, idearum, memoriae motuumque voluntariorum rationes nunquam non ignoratum iri arbitratur. Multa in anatome superesse monet incerta; verum exempla prolata non tam anatomen, quam physiologiam spectant. Elucent ubique Cl. Auctoris eruditio et acumen; sed, quod dolendum est, ne ab hisce quidem pauculis pagellis improbae diuinos libros cauillandi libidinis vestigia absunt.

FRANCISCI XAVERII CASPARI TRZEBICZKY, Bohemi Rokyczanensis Dissertatio de irritabilitate et sensibilitate partium corporis animalis, Prag. Typis Hochenbergianis. 8. plag. 3 $\frac{1}{4}$ .

**O**mne Cl. Auctoris studium in eo positum est, ut in libello hoc satisfaciat duabus illis quaestionibus, videlicet motus cordis naturalis pendeatne a nervis, an nerui, ut sunt sensibilitatis, ita forsitan irritabilitatis quoque fontes sint? Quum cordis musculosa fabrica, etsi Ill. HALLERUS repugnat, utique nata sit nervos numerosos, qui neque sensui, neque nutritioni inserviunt, quum absque nervis nunquam, et pro vario illorum statu varie agat: quum denique nervis irritatis deperditus cordis motus restituatur, languens excitetur, laesis vero illis et destructis minuatur atque quiescat; Cl. Auctor nervorum virtuti omnia in motu cordis naturali tribuit, nixus iis phaenomenis, quae ab animi commotionibus proveniunt, dein ENSII et KAAUV BOERHAAVII, propriisque experimentis.

P. 13. Cor robusti canis, quod, thorace aperto et pericardio discisso, debilius semper pulsabat, tandemque et ad manus attactum languidissime micabat, per duo minuta prima pristino cum vigore sese contraxit; cum Cl. Auctor stylo quadrangularem occiput pertudisset, irritassetque cerebellum et medullam oblongatam. Idem eodem successu tentavit in duabus felibus, tribus catulis ranisque multis. HALLERI irritationem octavi nervorum paris irritam fuisse propterea censet, quod vel tarda nimis, non sufficiens fuerit, vel proprios cordis nervos non tetigerit. Et licet cordis exsecti dissectique continuatus



tus motus nervorum vim excludere videatur; non tamen excludit recte, quum in animalibus, capite truncatis, motus muscularis artuum aliquantisper soleat superesse, quem a nervis omnes derivant; quumque eodem modo negari possit vis sanguinis influentis in cordis excitatione, cuius stimulus a corde exsecto, et tamen adhuc mobili, prorsus absit. Monet insuper Cl. Auctor, quod, quamvis vno alteroue nervo destructo quies cordis non statim subsequatur, vigor tamen cordis utique pereat. p. 19.

Quod ad alteram attinet quaestionem, non adeo absurdum esse docet, fibras musculares haberi pro nervorum propaginibus, quod ipse non assumit, fortiter tamen defendit. Fieri enim posse iudicat, ut, quemadmodum nervus acusticus a distributione in auribus habeat vim audiendi, visurus in oculo, ita etiam nervi, non irritabiles, irritabiles fiant distributione sua per musculos. p. 26.

Quum vero constet irritabilitatem esse absque nervis nullam, affectisque nervis deleri, immo evanescere, principium eius in nervis adesse concludit; verum non in parte solida, sed potius, ligatura monstrante, in fluida, quam continent. Quoniam vero non omnes partes, quae nervos acceperunt, irritabiles sunt, nervorum fibras in musculis aliam structuram, vel per aliud fibrarum genus peculiarem dispositionem acquirere coniicit. Iam patere dicit, cur partes, nervis destitutae, irritabiles non sint; cur iuniores, teneri, vegeti, feminaeque pulsu, sensu et irritabilitate excellant; cuncta vero, quae nervorum vigorem minuunt, minuant etiam irritabilitatem; id quod opii exemplo illustrat, cuius solutio aquosa, cordibus animalium frigidorum calidorumque affusa, intra minuta octo, ad summum viginti septem, omnem cordis motum penitus extinxit. p. 32.

Vlti-

p. 40. Ultimo ostendit Cl. Auctor, perennem cordis motum constantioremque deberi perpetuo influxui fluidi neruei, inprimis vero maiori cordis irritabilitati.

XXVIII.

Kort Vertoog over' t gebruick der Hulpmid-  
delen dienende tot redding der drenkelin-  
gen; uitgegeeven door enee gezelschap van  
Utrechtsche Heelmeesters. Te Utrecht by  
Gisbert. Tim. en Abraham van Paddenburg  
1769. 8. 5. pll. c. dedic.

i. e.

Breuis commentatio de vsu remediorum in sa-  
lutem submersorum.

**C**um mors submersorum, quorum vitae resuscita-  
tio iam a medicis et magistratibus variis modis  
tentata est \*) sit valde dubia, vt nec satis determinari  
queat: submersum, nisi putredinis signa iam appa-  
reant, pro mortuo nondum haberi debere Nostri  
contendunt, cum praesertim actiones ita interdum  
lateant, vt etiam lipothymicus verum mortuum  
p. 11. haud raro mentiatur. Causam mortis submerso-  
rum veteres in abundantia aquae, in ventriculum  
ingestae ex intumescencia abdominis statuerunt.

p. 12. Suffocationem recentiores accusant, ita quidem,  
vt alii eam ex expiratione declarare velint, alii ex  
inspiratione. In aquam enim delapsum terrore per-  
cuti, quem plena exspiratio sequatur, vt adeo ne  
particula quidem aeris in bronchiis supersit, pul-  
mones collabantur, circuitus humorum impedia-  
tur, homo tandem pereat, illi asserunt; hi vero  
terro-

\*) v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 147.



terrore perculsum inspirare malunt, quod ex aspersa in faciem aqua probant. Pulmones ergo ex tanta inspiratione valde expanduntur, vt, cum epiglottis glottidi arctissime agglutinata sit, aer ne minimus quidem exspirari queat, pulmo expansus maneat et vera inde suffocatio subsequatur.

Ex recentissimorum hypothefi mors sic se habet: submersus ex nisu, quem in vitae periculo tentat, simul ac superficiem aquae superauerit, inspirat, vbi cum aere magna simul aquae copia in bronchia et vasa aerea intrat, vt pulmo, spuma expansus, sese contrahere non possit, nisi, quod pars quaedam aeris, vim et resistantiam aquae superans, magno cum impetu prorumpat et bullulas aereas in superficie ostendat. Ex actione hinc pulmonum laesa, circuloque sanguinis impedito stases in pulmonibus exoriantur necesse est, ita, vt parum vel nihil sanguinis in cauum cordis sinistrum transire possit, et, quicquid accipit cum magna vi et celeritate ad arterias, venas et cor dextrum propellat: in ventriculo ergo dextro, et venis cauis, ex systole cordis iam cessante, accumulatus ad veram stasim peruenit, vt libera tandem cordis actio plane cesset. Quia vero magna, sub ipso temporis statu, sanguinis copia ad encephalum defertur ibique augeatur, non improbabile videtur, submersum, cum actiones encephali et neruorum his obstaculis impediuntur, ex suffocatione et apoplexia perire. Ad foramen ouale, quod in adultis interdum reperitur, et quo circulus humorum iuuetur, hic non respiciendum est.

Veterum modum, quo submersos vel inuertarent, vel pedibus erectis arbori affigerent, vel super vase denique cylindrico torquerent, ob varias causas reiiciunt Nostri; sed in auxiliis solum ad actiones vitales restituendas acquiescunt.

Cor-

- p. 26. Corpus, aqua extractum, facie paulo deorsum ad locum aptum, quo iuste possit tractari, ferunt, et sub regimine subcalido, vestimentis madidis ex-utis, aliis siccioribus obducunt: ad bronchotomiam deinde, contra quam alii inflationem aeris per os eligunt, quae vario modo instituenda esse ostenditur, accedunt. Nunc clysmate ex fumo tabaci vtuntur, explicant eiusdem remedii vsum, a variis Auctoribus valde commendatum, et descriptionem
- p. 34. peculiaris instrumenti, quo fumum in intestinum rectum immittunt, adiiciunt: sub qua operatione spirituosae volatilia naribus applicant, quibus deinde vsum analepticorum subiungunt, et venaesec-
- p. 39. tionem postmodum in vena iugulari externa instituunt.
- p. 43. His vero omnibus, clysmate etiam ex fumo tabaci iterum frustra tentatis, ad vltimum, incalescentiam nimirum totius corporis, confugiunt, ubi corpus cinere subcalido obtegunt, vel spinam dorsi sale calidiore fricant, vel corpus continuo motu et fri-
- p. 50. ctione exercent. Iam ad methodum, qua submersus resuscitatus summa cura tractandus sit, ne reuiuiscens iterum obeat, transeunt. Exemplum, cuius euentus non respondit, addunt. Hanc submersam, omnibus fere auxiliis frustra tentatis, absque vlla salutis spe dereliquissent, nisi flumen sanguinis, ex vena iugulari pertusa copiose effluxum, restitutionem obtulisset.
-



Contenta in hac parte.

	Pag.
I Acta Heluetica. Vol. VI.	195
II MEDICUS Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft 1ter und 2ter Band	204
III EIUDEM Brief an den Herrn ZIMMERMANN über einige Erfahrungen aus der Arzneywissenschaft	227
IV A treatise on the hydrocele. By POTT	229
V A new practical essay on cancers. By BURROWS	239
VI An essay of the medical virtues of acids By FARR	241
VII Physiological essays and obseruations By STEDMANN	245
VIII SCOPOLI Annus historico naturalis I. II. III.	251
IX SPIELMANNI diss. inaug. sistens experimenta circa naturam bilis	259
X SCHENKBECHER Bericht von den heilsamen Würckungen der Kinkina etc.	264
XI Lettre de DELISLE ABERTRAND sur les polypes d' eau douce	270
XII Nouvelle methode facile et curieuse pour connoitre le pouls par les notes de la musique par feu MARQUET	271
XIII HARTMANN cautiones de liquore mercuriali Plenckiano	274
XIV Abhandlungen der Churfürstlich Bayerischen Academie der Wissenschaften. 1ter - 6ter Band	280
XV OBERREIDII vniuersalis confortatiua medendi methodus	305
XVI VOGEL practisches Mineralsystem	307
	XVII

	Pag.
XVII GRAEBNERS <i>Gedancken über das Hervorkommen u. Wechſeln der Zähne etc.</i>	313
XVIII Ontleed en heekundige verhandeling van het waaterhoofd door SWAGERMANN	316
XIX BÜTTNER <i>aufrichtiger Unterricht vor neuangehende Aerzte und Wundärzte</i>	323
XX HERRMANN diff. de modo cauendae corruptionis corporum naturalium in muſeis	326
XXI Mémoires ſur différentes parties des ſciences et arts. Tom. I. Par M. GUETTARD	331
XXII LINNAEI termini botanici	348
XXIII HALLER nomenclator ex hiſtoria plantarum Helvetiae etc.	349
XXIV <i>Mineralogiſche Beluſtigungen etc. 1ter und 2ter Theil</i>	351
XXV Ontleed en heekundige verhandeling overde uitzakkingen der lyfmoeder en ſcheede	372
XXVI Les ſingularités de la nature. Par M. VOLTAIRE	376
XXVII TRZEBICZKY diff. de irritabilitate et ſenſibilitate partium corporis animalis	378
XXVIII Kort vertoog over't gebruick der hulpmiddelen tot redding der drenkelingen	380

